

This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

<https://books.google.com>





A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation



Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>



154068

CONTRIBUTO

ALLA

FLORA DELL'ARMENIA

DI

AUGUSTO BÉGUINOT E P. NERSÈS DIRATZOUYAN

Lib. Doc. di Botanica presso la R. Università
di Padova

Dott. in Scienze Nat., Professore nei Collegi
Mechitaristi

CON 12 TAVOLE FUORI TESTO

E

9 FIGURE INTERCALATE NEL TESTO

VENEZIA

Tipografia Armena di S. Lazzaro
1912

**CONTRIBUTO
ALLA
FLORA DELL' ARMENIA**

CONTRIBUTO
ALLA
FLORA DELL'ARMENIA
DI

AUGUSTO BÉGUINOT E P. NERSÈS DIRATZOUYAN

Lib. Doc. di Botanica presso la R. Univ.
di Padova

Dott. in Scienze Nat., Professore nei Collegi
Mechitaristi



VENEZIA
Tipografia Armena di S. Lazzaro
1912

P R E F A Z I O N E

Quando ad un popolo si sopprime la patria, si devia il corso della sua storia, si straziano a quando a quando i corpi e si imbarbariscono le menti non gli resta che l'una o l'altra di queste vie di scampo: o di emigrare *patria altrui cercando*, o di assimilarsi ai dominatori dell' oggi assumendone lingua e costumi o, fermo restando nella terra dei padri, nelle memorie e nel linguaggio nazionale, attendere gli eventi della storia.

A quest' ultima risoluzione si attennero gli Armeni.

Perduta l'indipendenza, scissi in triplice dominazione, turca, russa e persiana, dimenticati dall' Europa, essi non emigrarono completamente, non si assimilarono con gli attuali padroni, mantennero inalterati il tesoro della lingua e delle tradizioni avite, non disperano in un domani migliore dell' oggi. Quelli che, per ragioni di studio o per esigenze di commercio e di industrie, furono costretti ad allontanarsi dalla patria, non dimenticarono i lontani fratelli della sventura e ne tengono desta la loro giusta causa.

Date queste condizioni storiche e psicologiche, agevolmente si comprende come l'appello da me rivolto nel 1907, ancora allievo interno dell' Istituto Botanico della R. Università di Padova, di essere aiutato nella compilazione di un lavoro sulla vegetazione dell' Armenia, non sia caduto su suolo sterile. L' idea di riunire in un' unica opera, mai prima d' ora tentata, la somma delle conoscenze sulla ricca e poco nota Flora di un così vasto e smembrato paese, rivesti alle menti dei miei connazionali, non solo un valore scientifico, ma anche un alto significato patriottico. Le molte circolari da me inviate ad amici e corrispondenti trovarono, là dove giunsero a destinazione, il plauso incondizionato dei fratelli della mia terra natale. Molti risposero inviando materiale che già si trovavano a possedere, altri scrissero che, non appena l' epoca propizia, si sarebbero accinti all' opera e cioè alla raccolta del materiale desiderato. Potei così ricevere sin dal primo biennio dacchè iniziai la ricerca parrecchie centinaia di specie che, studiate con i larghi mezzi bibliografici e di confronto con gli Erbari posseduti dal R. Orto Botanico di Padova, abbastanza ricchi di piante orientali, formarono oggetto della mia Tesi di Laurea in Scienze Naturali conseguita nel Luglio del 1908.

Da quell' epoca sono decorsi quattro anni e nel frattempo altri materiali mi pervennero ed incrementarono il primo nucleo della raccolta. Dal mio canto durante la permanenza a Trebisonda nell' anno scolastico 1909 - 1910 non mancai di compiere numerose escursioni nei dintorni della città e non

L 571.351 366228
LOC 162391

appena ebbi, con sicurezza personale, libero passaggio attraverso i confini dell' Armenia russo-turca, rivedi il mio paese natio e cioè Artwin dove feci pure copiose raccolte.

Tornato in Italia ripresi la mia Dissertazione di Laurea e, grazie all' ospitalità di nuovo concessami dal Direttore dell' Istituto botanico di Padova, l' illustre prof. P. A. SACCARDO ed alla sapiente e disinteressata collaborazione del suo primo aiuto, il prof. A. BÉGUINOT, sottoposi a nuovo esame le determinazioni già eseguite e le misi al corrente con i posteriori invii ricevuti e col materiale da me riunito.


Tale è la genesi di questo primo saggio, qui avvertendo che esso non comprende se non lo studio di una parte del materiale a mia disposizione, il resto rimandando a successivi contributi non appena ne avrò tempo ed agio. Contributi i quali sono da interpretare, da una parte come preparazione e prodromi del lavoro maggiore, cui sopra ho accennato, e dall' altra come stimolo a che i miei connazionali, persuasi dell' importanza dell' opera, del suo indirizzo critico e scientifico e dei miei intenti patriottici, siano spronati a largirmi quegli aiuti prodigatemi sin dall' inizio della ricerca. Che anzi, fatti edotti dello scrupolo posto in questo primo saggio, esprimo loro il desiderio che le ulteriori raccolte, oltre che incrementare l' Erbario Armeno, siano fatte in territori poco esplorati o del tutto ignoti nei riguardi della loro flora e siano muniti delle più dettagliate e complete indicazioni di *habitat* rispondenti alle attuali esigenze della scienza.

Qui aggiungo che una copia delle raccolte studiate o da studiarsi entra a fare parte dell' «HERBARIUM ARMENIACUM» che si conserva, a disposizione degli studiosi, nel Gabinetto di Storia Naturale del Convento Armeno dei RR. PP. Mechitaristi di S. Lazzaro presso Venezia ed i duplicati (quando esistenti) nell' Erbario generale presso il R. Istituto botanico di Padova.

Vadano a tutti i miei connazionali, noti ed ignoti ma sempre validi collaboratori, con l' augurio di giorni migliori per la diletta Patria, l' espressione dei miei cordiali ringraziamenti. Uno speciale ringraziamento debbo pure al mio maestro Prof. P. A. Saccardo per l' ospitalità accordatami nel suo Istituto e per i consigli ed aiuti di cui mi fu largo.

Ed, in ultimo, mi sento il dovere di rivolgere un caloroso senso di gratitudine a Sua Ecc. Illma. Mgr. IGNATZIO Dr. GHIUREKIAN, Arciv. ed Abate Gen. del mio Ordine, che non solo con paterna premura mi fu sempre largo Mecenate e sapiente guida nei miei studi Universitari, ma anche è il sostenitore e l' incoraggiatore di questo primo Contributo alla Flora dell' Armenia.

*P. Nersès Diratzouyan
Mechitarista*



GENERALITÀ



L’ ARMENIA, come è a tutti noto, non ha attualmente esistenza politica vale quanto a dire non è uno stato a sè. Turchi, Persiani e Russi smembrarono il paese, che ebbe un tempo unità ed indipendenza: sicchè oggidì, dal nome degli attuali dominatori, possiamo distinguere un’ Armenia Turca o *Ermenistan*, che è la più vasta di tutte, un’ Armenia persiana o *Aderbegian* ed un’ Armenia russa o *Transcaucasia*. Geograficamente l’ Armenia non ha confini ben determinati e scolpiti dalla natura e non ha veri confini storici, perchè nei tempi della sua grandezza politica, ha più volte spostato i suoi limiti, spostando il centro politico della nazione. È un incrocio di monti e di valli, una *Berg-Insel*, come con frase scultoria la chiamò Carlo Ritter. Intesa nel senso più ampio è un paese dell’ Asia Occidentale a sud della catena del Caucaso fra il Mar Caspio ed il Mar Nero confinante ad oriente con la Persia, a sud con la Mesopotamia, Siria e il Mare Mediterraneo, ed all’ occidente con l’ Asia Minore. I geografi armeni antichi vi sogliono aggiungere la Cilicia, perchè al tempo delle Crociate in Cilicia fu fondato un regno armeno indipendente.

L’ Armenia turca, fra il bacino dell’ Eufrate, del lago di Van e la parte occidentale dell’ Asia Minore, comprende 5 *vilayet* (di Erzerum, Diarbekir, Mamuret-ul-Aziz, Van e Bitlis) – parte di quella che gli antichi geografi designarono col nome di « Grande Armenia » – cui si aggiungono altri (i *vilayet* di Sivas, Enkare, Koniah, Adana, Aleppo e Trebizonda), che erano compresi nella così detta « Piccola Armenia ». L’ Armenia russa, fra il fiume Rion che si getta nel Mar Nero ed il fiume Kura o Gur che confluisce nel Caspio, e l’ Armenia turca, comprende le provincie di Kars, Erivan, Kanzag e Baku. Finalmente l’ Armenia persiana abbraccia la parte occidentale della provincia di Aderbegian dell’ alta Persia e già fece parte della grande Armenia.

CENNI STORICI-BIBLIOGRAFICI

L' Armenia non è un paese floristicamente ignoto ed inesplorato. Le ricerche nel campo della botanica scientifica s'iniziarono nella seconda metà del secolo XVI con **Rauwolf** che nel 1573-75 ne visitò i distretti più meridionali ai confini con la Siria e Mesopotamia. Dati e notizie ancora più interessanti raccolse sulla fine del secolo successivo **Tournefort** che da Trebisonda si spinse fino ad Erzerum, ascese l' Ararat e presa la via di Kars, passò nell' Asia Minore. La relazione che egli pubblicò nel 1717 è un modello del genere che si legge tuttora con interesse. Fra i botanici del periodo preboissieriano ricordiamo specialmente **Buxbaum**, nonchè i monumentali lavori iconografici di **Pallas**, **Labillardière**, **Delessert**, **Sibthorp** e **Smith** che illustrarono anche piante armene o riscontrate in seguito nella regione.

Il periodo che abbiamo chiamato « boissieriano » si apre con le accurate e ripetute esplorazioni di **Carlo Koch** nel dominio della Flora orientale e che investirono anche l' Armenia specialmente russa. A lui dobbiamo preziose indicazioni di *habitat* di un grande numero di specie ed i primi tentativi di una distribuzione geografica. Scoprì pure un ragguardevole numero di entità nuove ma, soverchiamente analista, molte di esse caddero, sotto i colpi bene aggiustati del Boissier, in sinonimia: nè i recenti monografi gli resero in generale maggiore giustizia.

Suo contemporaneo e grandemente benemerito della Flora Orientale fu **Teodoro Kotschy**, che nel 1836 esplorò il Tauro di Cilicia, dove poi tornò nel 1855: nella primavera del 1859 visitò i distretti della Cilicia orientale e nell' estate ed autunno il Bingöl-Dagh e tutte le regioni che si stendono a sud del lago di Van. Raccolse molto e le raccolte distribuì in classiche Essicate quasi tutte possedute dall' Erbario generale dell' Istituto botanico di Padova (¹). A differenza del Koch, quasi restio al lavoro di tavolino,

(1) Hanno per noi uno speciale interesse le seguenti: *Iter Cilicum in Tauri Alpes « Bulgar Dagh »; Iter cilicum - kurdicum 1859:* e che comprende: *Plantæ in montibus Kassan Oghlu ad pagum Gorumse lectæ; Plantæ in prov. Musch ad radices australes Bingöll montis ad Gumgum in districtu Warto lectæ; Plantæ in montibus vulcanicis Palandöken ad Erzerum lectæ; Plantæ ex montibus calcariis Karduchiæ; Plantæ in monte Lokmanni « Dschebel - Nur » lectæ. Plantæ Syriæ borealis ex Amano prope Beilan 1862, ecc.*

il Kotschy scrisce relativamente poco e generosamente lasciò che delle sue Essiccate si avvalessero Fenzl, Jaubert Tchihatcheff, Boissier e sono tuttavia consultate con interesse dai monografi moderni. La sua monografia delle Quercie europee ed orientali resta, accanto ad altri scritti minori che riguardano solo in parte la Flora armena, solenne documento della sua vasta preparazione scientifica e della coscienziosità che egli metteva nei suoi lavori.

Al nome del Kotschy vanno congiunti quelli dello **Szovitz** e dell' **Aucher - Eloy**, pure autori di pregevoli Essiccate. La relazione dei viaggi e delle scoperte di quest' ultimo fu pubblicata nel



Teodoro Kotschy

1843 a cura del conte **Jaubert** ed a questi, in collaborazione dello **Spach**, siamo debitori di una grandiosa illustrazione in 5 volumi e 500 tavole di piante nuove o critiche, tra cui parecchie armene. Viaggiarono il paese riportandone più o meno ricca messe di piante e di notizie. **Ainsworth**, **Abich**, **Wagner**, **Nordmann**, **Buhse**, **Haussknecht**, **Tchihatcheff**, **Calvert**, **Bourgeau**, **Balansa** e nella nostra bibliografia sono riferiti i titoli delle opere da alcuni di essi rese di pubblica ragione.

Nel 1842 vide la luce il primo fascicolo della «*Diagnoses planitarum orientalium novarum*» di **Edmondo Boissier**, l'ultimo porta la data del 1859. Il Boissier viaggiò con il **Buhse** la Transcaucasia e la Persia, ma non si inoltrò mai nell' Armenia propriamente detta: tuttavia a lui dobbiamo le diagnosi di molte specie del paese fondate su saggi a lui comunicati dai botanici contemporanei.

ranei e specialmente dal Kotschy. Otto anni dopo l'ultimo fascicolo delle Diagnosi vide la luce il primo volume della monumentale «Flora orientalis», l'ultimo nel 1884 (il Supplemento postumo edito a cura del Buhser porta la data del 1888), nella quale l'Autore ha criticamente riassunto tutta l'opera propria ed, insieme agli inediti, tutti i dati acquisiti alla scienza. Fra i paesi compresi nel territorio della Flora vi è naturalmente l'Armenia ed anche attualmente resta senza contrasto la fonte più attendibile della sua ricca vegetazione.

Attorno al 1867 si iniziano le esplorazioni di **Gustavo Radde** nei paesi caucasici, in parecchie delle quali toccò vari settori dell'Armenia, stendendone pregevoli relazioni, mentre le specie raccolte venivano illustrate specialmente dal **Trautvetter**.

Il periodo (posthoissieriano), che comprende gli ultimi venticinque anni, è caratterizzato da ricerche critiche, da lavori monografici e da indagini fitogeografiche condotte su base e con criteri più larghi di quelli fino allora seguiti. Relativamente pochi e poco importanti i viaggi di esplorazione nell'Armenia propriamente detta laddove qualche eccellente esplorazione non manca nelle regioni confinanti.

La Transcaucasia e quindi una parte dell'Armenia russa trovò il più insigne suo illustratore in **Nicola Albow**. La memoria sulla flore alpina dei calcari della Transcaucasia, sulle foreste della regione, la Flora Colchica, sono modelli di analisi e di sintesi fitogeografica, mentre con la scoperta di generi e specie ad affinità remote richiamò l'attenzione degli studiosi su tale imponente avanzo della vegetazione prequaternaria. Sciaguratamente ricerche così promettenti furono troncate dal fato avverso che perseguitò inesorabilmente il compianto botanico, lo costrinse ad abbandonare l'Europa, e la morte a soli 32 anni lo raggiunse nell'estrema America del sud dopo avere preparato il manoscritto sulla Flora della Terra del Fuoco che, pubblicato a cura del Museo della Plata, stupì il mondo dei botanici per la forte sua originalità. Documento eloquente di quanto la fortuna asseconda il merito vero!

Della Persia e quindi dell'Armenia confinante con questo paese buoni saggi floristici hanno dato **Wettstein**, **Bornmüller** e della Siria sono importanti le lunghe ed accurate ricerche del **Post** riassunte nella pregevole flora della Siria, Palestina e Sinai che vide la luce nel 1896. La vegetazione pontica fu oggetto di studio da parte di **Albow**, **Levier** e **Sommier** e di **Handel-Mazzetti**, quella mesopotamica da parte di **Stapf**, **Chiovenda** e **Cecchettani**.

Le esplorazioni fitogeografiche del Radde, proseguite per circa un trentennio, furono riassunte in un lavoro di vasta sintesi che interessa anche una parte dell' Armenia (quella russa), riprese ed approfondite specialmente dal **Kusnezow**. È in corso di stampa una «Flora caucasica critica» di quest' ultimo in collaborazione con **Busch** e **Fomin**, nella quale sono comprese e diffusamente illustrate tutte le specie sin qui segnalate per l' Armenia russa. I rapporti fitogeografici fra la flora colchica e pontica con quella steppica e l' influenza che esse esercitarono in Europa furono oggetto di memorie da parte del **Kusnezow**, del **Palibine** ed un critico riassunto ne stese l' **Handel - Mazzetti** nel citato lavoro sulla vegetazione dei «Randgebirge» del *rilayet* di Trebisonda.

Un contributo preziosissimo per la Flora Armena danno pure le opere storico-gografiche del sommo **P. Leone Alishan**.

Fra i lavori ad indirizzo monografico più specialmente dedicati a generi della Flora orientale ricordiamo quelli di **Kuznezow** (*Gentiana*), **Crépin** (*Rosa*), **Winkler** e **Bornmüller** (*Corsinia*), **Fedschenko** ed **Handel - Mazzetti** (*Hedysarum*), **Terracciano** (*Gagea*), **Buser** (*Alchemilla*), **Pampanini** (*Cheilanthes Szovitsii* ed *Astragalus alopecuroides*), **Petrak** (*Cirsium*), **Kousnezow** (*Sympithium*), **Fomin** (*Cystopteris* e *Dryopteris*) ecc. Importanti osservazioni su svariati gruppi critici e descrizioni di molte specie nuove - parecchie delle quali armene - dobbiamo ad un modesto, ma valoroso conoscitore della Flora orientale, **Giulio Freyn**, col quale chiudiamo questo sommario riassunto storico-bibliografico.

NOTIZIE SULLE LOCALITÀ D' ONDE PROVENGONO LE PIANTE STUDIATE

I materiali illustrati nel presente contributo furono in parte raccolti dall' uno di noi (*N. Diratz*.), in parte comunicati da vari settori dall' Armenia da corrispondenti od amici.


Crediamo opportuno, ad intelligenza della enumerazione sistematica, dare brevi notizie sulle località di provenienza.

ARMENIA RUSSA O TRANSCAUASICA

Artwin — Piccola città nella provincia di Kars, situata sulla riva sinistra del fiume Tchorok o Giorogh, che si getta nel Mar Nero, presso Batum.

Artwin vecchia possiede un' antica fortezza Genovese che s' inalza sopra uno scoglio inespugnabile ed alto, dall' alveo del fiume, circa 80 metri.

La città relativamente nuova si estende nella vallata molto inclinata formata da diversi gruppi di montagne. Il centro del paese è alto circa 350 m., e le alture circostanti raggiungono i 560 metri sul livello del mare. La cima la più alta sopra Artwin, chiamata Salalet, raggiunge 1830 metri sul mare.



Veduta parziale di Artwin, il quartiere Golordo

Nei dintorni di Artwin vi sono molti villaggi, abbondanti acque sorgive, estese foreste di conifere e cupulifere e le vallate sono ricchissime di vegetazione spontanea.

Le prime indicazioni di piante dei dintorni della città devonsi al Koch e parecchie sono consacrate nella classica « Flora orientalis » del Boissier. La vallata del fiume Tchorok fu oggetto di accurata esplorazione da parte di Gustavo Radde che nel suo « Grundzüge der Pflanzenverbr. in den Kaukasusländern » diede l' elenco delle piante che si possono raccogliere tra 180 e 1830 metri (sommità del Salalet). In basso e cioè sotto Artwin *Pinus Pinea*, *Ar-*

butus Andachne rappresentano insieme a *Juniperus Oxycedrus*, *Rhus Coriaria*, *Teucrium Polium*, *Paliurus aculeatus*, *Cistus salicifolius*, gli ultimi avamposti della flora mediterranea, costituendo nel loro complesso una vera isola mediterranea in mezzo al dominio della flora colchica. In alto si stendono praterie subalpine con *Gentiana verna* var. *alata*, *Viola altaica*, *Gagea Loddardi*, *Ornithogalum Balansæ*, *Veronica gentianoides*, *Primula Pallasii* e boschi di Conifere con *Picea orientalis* ed *Abies Nordmanniana* con sottobosco di *Rhododendron flavum*, *Ungernii*, *Smyrnovi* e *Rh. ponticum* (questo più in basso). Quà e là, specialmente nelle anfrattuosità delle rupi, non manca qualche rappresentante delle alte steppe dell'Armenia e particolarmente alcuni Astragali a tipo erinaceo che ne sono gli avamposti. E ne conclude che (pag. 121) «raramente è dato di trovare una località nei riguardi della flora così variata ed istruttiva». Ciò che sorprende, poichè «in linea retta si tratta di una distanza di circa 8 km. dalla zona arida con prevalenti xerofile e rupicole, oliveti, vigneti e cipressi fino al limite dei boschi e da questi ai prati umidi subalpini». Prova eloquente quanto sia efficace, l'influenza dei fattori attuali nella ricchezza e nella zonazione di questa flora! Piante dei dintorni d'Artwin si trovano pure ricordate nei lavori dell'Alboff e di Freyn e più di recente in quelli di Woronow e di Schawrow.

Nel 1910 e precisamente nei mesi di Luglio ed Agosto uno degli autori del presente contributo (P. N. Diratzouyan,) raccolse, parecchie specie nei dintorni immediati della città spingendosi fino sulle basse pendici del Salalet, che ne è la cima più elevata.


Ardanutsch. — È un borgo situato sul fiumicello omonimo che si getta nel Tchorok. Seguendo la nuova via carrozzabile, che fiancheggia le montagne di Kartchkhal lungo la riva destra del Tchorok, uno di noi si spinse da Artwin sino a questo borgo dopo un viaggio a cavallo di circa 6 ore. Durante il percorso ebbe occasione di raccogliere nell'Agosto del 1910 perecchie specie ed altre ne collezionò sull'antica fortezza armena che si erge imponente sopra una rupe alta oltre 50 m. sulle case del villaggio.

Qualche anno fa Schawrow illustrò alcune specie del paese.

Ani. — Antica capitale in rovina dell'Armenia storica. È situata sul fiume Arpa Tchaï, all'Est di Kars: la sua altezza sul livello del mare si calcola 1500 metri.

Nel 1900 il Sr. Garabed Pr. Basmadgian raccolse una dozzina di specie, che ci regalò nel 1907.

Mamanelis (borgo): **Satlel** (borghetto): **Pkhikur** (villaggio), ecc. — Si trovano nella provincia di Kars, nella Piccola Caucasia, nel distretto di Sciavsgett, presso il fiumicello Sciavsgett-su, che si getta nel fiume Tchorok. I monti di questi luoghi appartengono alla catena di Kartchhal, le colline e le vallate sono abbondanti di acque e per conseguenza di vegetazione rigogliosa.



Ardanutsch

Il Ro. *Don Simeone Rostomian* raccolse nel 1911, dal Maggio al Settembre, una sessantina di specie che, con le relative annotazioni, ci spedì nel 1912.

Sarikamish. — È un borgo a circa 2000 m. sul mare ed a Sud-ovest di Kars, situato sul fiumicello Kars-Tchai. Le montagne e le foreste di Soghanlu sono di una imponente bellezza.

Nel 1907 il Sr. *Gregorio Sabundgiantz* ci spediti una ventina di piante della regione.

Ak - Killesse. — È un piccolo villaggio di 420 abitanti. Verso Nord dista da Sarikamish per 61 *verst* di strada, all' Est il borgo di Gaghzvan dista per ben 8 ore di viaggio. Ak-killesse, trovandosi vicino il confine russo-turco, appartiene alla provincia di Kars ed al distretto di Passen inferiore. L' altezza sul livello del mare si calcola 1500 metri.

Diverse catene di montagne, la cima di Sugaved, colline, foreste, la vallata del fiume Arasse, e le acque sorgive rendono assai variato il paesaggio e determinano una grande ricchezza nel suo ammanto vegetale.

Nella primavera del 1908 il *Ro. Don Basilio Minassian* raccolse una cinquantina di specie, ed accompagnandole di notizie assai interessanti, ci inviò come contributo alla «*Flora Armena*».

ARMENIA CENTRALE TURCA

Erzerum. — È la capitale dell' Armenia Turca, alta 1950 m. sul mare. I monti dei dintorni sono coperti di nevi perpetue, dal dissolvimento delle quali si originano ruscelli e l' Eufrate Occidentale o Kara-su.

Delle vicinanze di Erzerum nella primavera del 1908 il *Sr. Sempad Partamian* raccolse e spedì una quarantina di piante.

Dai monti **Palandöken** ed **Egerli** di Erzerum il *Sr. Antranigh Pr. Essayan* nel 1907-08 raccolse parecchie specie indigene.

I dintorni di Erzerum furono visitati ed esplorati da parecchi botanici e ricorrono di frequente nella «*Flora orientalis*» di Boissier.

Musch. — Città nel centro dell' Armenia Turca, nel *vilayet* di Bitlis. Si calcola la sua altezza sul livello del mare 1414 metri. È addossata alla montagna Zir-Gadar, alta 2000 metri. Dirimpetto alla città si estende la pianura di Musch, fertilissima in cereali. La città e la pianura sono bagnate dal fiume Musch-Tchai.

Nel 1908 abbiamo ricevuto diverse piante dal *Ro. P. Antonio Gindoian*.

Gumgum. — È un piccolo villaggio nel **Distretto di Warto** in vicinanza del monte Bingöl-Dagh alto 3200 metri nel *vilayet* di Bitlis, e verso il Nord di Musch.

Il distretto di Warto possiede molte acque sorgive, laghetti e fiumicelli, e perciò il suolo è fertilissimo di piante spontanee.

Dai dintorni di Gumgum, cioè dal distretto di Warto, il Sr. Basilio Surmaghian nel 1908 e nel 1911 raccolse parecchie centinaia di piante. La sua collezione dedicò al Ro. P. Anania Kondakian, Missionario Mechitarista e questi gentilmente la portò a noi onde contribuire alla Flora Armena.

Il distretto di Warto e specialmente l'eccelso Bingöl-Dagh furono esplorati dal Kotschy, che ne distribuì le piante in classiche Essicate.

ARMENIA PERSIANA

Urmia. — Khoy. — Ardag. — Urmia è una città vicina al lago omonimo nella provincia Aderbegian. In questa provincia trovasi pure Khoy, borgo situato verso il Nord di Urmia; ed Ardag distretto vicino al confine russo-turco. Queste tre località ricorrono di frequente in contribuzioni alla flora del Nord della Persia e di cui i saggi più notevoli devonsi al Bornmüller.

Un centinaio di specie con tali provenienze furono raccolte nel 1908 dal Sr. Hamp. Der Minassian, per l'iniziativa del dotto Sr. Mgrditch Eremian.

ARMENIA CILICICA

Elbistan. — È un villaggio situato nella parte boreale del *vilayet* di Aleppo, sul fiumicello Sögüllü, che si getta nel fiume Sihun, che sbocca nel Mediterraneo.

Elbistan è alto sul livello del mare 1170 m. situato sull'Altopiano del monte Palanga la cui cima è alta 2000 metri.

Questa regione, quasi inesplorata pei botanici, fu accuratamente visitata dal Ro. Don Clemente Asdurian, il quale raccolse nel 1907 e 1908 parecchie centinaia di piante spontanee onde contribuire al nostro lavoro.

Beryt - Dagh. — È la montagna più alta sulla città di Zeitun, ergendosi a 2130 metri sul livello del mare, nella parte boreale del *vilayet* di Aleppo. Fu visitata da molti botanici, come Bafansa, Kotschy, ma il suo principale esploratore è forse l'Haussknecht che vi si recò nel 1865, comunicando il materiale raccolto al Boissier che ne fece tesoro nella sua «Flora orientalis». I nomi di *Astra-*

galus Berytius, di *Johrenia Berytra* ed altri consacraroni nella scienza il nome della celebre montagna. Alla pagina 195 del lavoro sull' Armenia cilicica (Sissouan) del Rev. Padre Alishan è riportato un elenco di piante del Beryt-Dagh.

Per iniziativa del Ro. D. C. Asdurian il Sr. G. Mergiandishian raccolse nel 1908 parecchie specie che ebbe la cortesia di comunicarei.

Kabak - Tépé. — È una regione montuosa presso Zeitun, situata sul fiume Sihun, con un'altezza media di circa 1050 metri. Dista da Elbistan per un giorno a cavallo.

Nel 1908 il Sr. Mergiandishian (sempre per iniziativa del Ro. Asdurian) raccolse diverse piante per il nostro lavoro.

Aintab. — Città compresa attualmente nel *vilayet* di Aleppo e quindi nella Siria boreale, della cui flora manifestamente partecipa come abbiam potuto convincerci dalle molte indicazioni di piante dei suoi dintorni riportate nella «Flora of Syria, ecc.» del Rev. G. E. Post. Il Freyn ne ha pure illustrata qualche specie comunicatagli dal Sr. Manissadjian.

Il Sr. A. Khatciadurian ci fece invio di una cospicua serie di piante raccolte nel 1906 e che abbiam finito per includere nel presente contributo nel quale l' Armenia fu intesa nel suo più largo significato.

PONTO

Trebizonda. — Città sul Mar Nero, antica capitale del Ponto nel *vilayet* omonimo. La sua flora, che ha spiccati caratteri mediterranei, si può ritenere abbastanza nota, e l' ultimo e più completo contributo dell' Handel-Mazzetti, se non esaurisce l' argomento, rappresenta per certo uno dei saggi più poderosi ed interessanti comparsi negli ultimi tempi sulla flora e sulla fitogeografia dei paesi orientali. Trebisonda e il suo *vilayet* sono un po' al di fuori dei confini dell' Armenia propriamente detta, tuttavia abbiam creduto includerla nel lavoro anche per le evidenti analogie floristiche che la collegano a quella.

Nel 1889 il Sr. Pietro Marimian ed il Pr. Hmaiak Khushbnlian avevano regalato al Padre L. Alishan una collezione di 45 specie, che noi abbiam potuto utilizzare per il nostro saggio. Nel 1908 il Sr. Vahan Shabanian ci spedi gentilmente una cinquantina di specie. Nel 1910 uno degli autori del presente contributo (Diratzouyan), durante la sua permanenza nella città, ebbe occasione in numerose erborazioni di mettere assieme un cospicuo materiale, solo in piccola parte determinato.

Grom. — Villaggio situato sulle pendici delle montagne Pontico-Armene. Grom è alto sul livello del mare circa 1000 metri e



Veduta in Cilicia
Monte Anascia (alto 4000 m.) e le cascate di Anascia

dista da Trebisonda, verso Sud, circa due giorni a cavallo. I dintorni sono ricchi di acque e di vegetazione.

Il Sr. Antonio Pr. Parghentanian nel 1910 raccolse e ci inviò una trentina di piante rare delle alture sovrastanti a Grom, la cui flora ha spiccati caratteri armeni.

Sicchè, riassumendo, le località ed i raccoglitori compresi nel presente contributo sono i seguenti:

ARMENIA RUSSA

Artwin	<i>(Distr. di Batum)</i>	Ro. Pr. N. Dr. Diratzouyan.
Ardanutsch	» » » » »	
Ani	<i>(Prov. di Kars)</i>	Sr. Garabed Pr. Basmadgian.
Mamanelis	<i>(Piccolo Caucaso)</i>	Ro. D. Simon Rostomian.
Satdel	» » » » »	
Pkhikur	» » » » »	
Sarikamish	<i>(Prov. di Kars)</i>	Sr. Gregorio Sabundgiantz.
Ak - Kilisse	» »	Ro. D. Basilio Minassian.

ARMENIA TURCA

Erzerum	<i>(Dintorni della città)</i>	Sr. Sempad Partamian.
»	<i>(M.i Palandöken, Egerli)</i>	Sr. Antranigh Pr. Essayan.
Musch	<i>(Villayet di Bitlis)</i>	Ro. P. Antonio Gindoian.
Gumgum	<i>(Vil. di Bitlis, distr. di Warto)</i>	Sr. Bas. Surmaghian.

ARMENIA PERSIANA

Urmia	<i>(Prov. di Aderbegian)</i>	Sr. H. Der Minassian.
Khoy	» » » » »	
Ardaz	» » » » »	

ARMENIA CILICICA

Elbistan	<i>(Siria boreale)</i>	Ro. D. Clemente Asdurian.
Beryt - Dagh	»	Sr. G. Mergiandishian.
Tabak - Tépé	»	»
Aintab.	»	Sr. A. Khatciadurian.

PONTO

Trebizonda.	<i>(Dintor. della città e rill.)</i>	Sr. Pietro Marimian.
»	»	Pr. Hmaiagh Khushbulian.
»	»	Sr. Vahan Shabanian.
»	»	Ro. Pr. N. Dr. Diratzouyan.
Grom.	<i>(Ponto-Arm.)</i>	Sr. Antonio Pr. Parghentanian

BIBLIOGRAFIA⁽¹⁾



(1583-1846 = PERIODO PREBOISSIERIANO)

1583. **Rauwolf L.** — Eigentliche Beschreibung der Reise.... in die Morgenländer, fürnehmlich Syriam, Judæam, Arabiam, Mesopotamiam, Babiloniam, Assyriam, Armeniam etc. Laugingen, 1583.
1717. **Tournefort J.** — Relation d'un voyage du Levant etc. - Cfr. tomo II p. 240-420. Paris, 1717.
- 1728-1740. **Buxbaum J. C.** — Plantarum minus cognitarum centuriæ, complectens plantas circa Byzantium et in Oriente observatas. — Cent. I-V. Petropoli, 1728-1740.
1756. **Russel A.** — The natural history of Aleppo and parts adjacent etc. London (1856 pr. err.) 1756: 2^a ediz. 1794.
- 1784-1788. **Pallas P. S.** — Flora rossica, seu stirpium imperii rossici per Europam et Asiam indigenarum descriptiones et icones. Petropoli, 1784-88.
- 1791-1812. **La Billardière J. J.** — Icones plantarum Syriæ rariorū. Lutetiae Parisiorum. 1791-1812.
- 1801-1804. **Olivier G. A.** — Voyage dans l'Empire Ottoman, l'Égypte et la Perse etc. - Paris, a. I-XII. (1801-1804).
- 1806-1840. **Sibthorp J. et Smith J. E.** — Flora græca. Londini, vol. I-X (1806-1840).
- 1808-1843. **Marschall v. Bieberstein F. A.** — Flora tauro-caucasica. Charkoviæ, 1808. Supplementum, 1819.
- Id.** — Centuria plantarum rariorū Rossiæ meridionalis, præsertim Tauriæ et Caucasi iconibus descriptionibusque illustrata. Pars I Charkoviæ, 1810; Pars II Petropoli, Lipsiæ, 1832-43.
- 1820-1846. **Delessert B.** — Icones selectæ plantarum etc. Parisiis I (1820), II (1823), III (1837), IV (1839), V (1846).

(1) In questo saggio bibliografico cercammo di riuscire il più possibilmente completi per quanto concerne l'Armenia p. d. Per le regioni contermini (Transcaucasia, Persia, Siria, Ponto, ecc.) ci siamo limitati a ricordare i lavori più importanti, rimandando per gli altri alle ricche bibliografie redatte dal Trautvetter, Lipsky, Radde, ecc.

1831. **Meyer K. A.** — Verzeichnis der Pflanzen, während der 1829–1830 unternommen Reise im Caucasus und in den Provinzen am westlichen Ufer des Kaspische Meeres gefunden etc. St. Petersbourg, 1831.
- 1831–33. **Eichwald E.** — Plantarum novarum vel minus cognitarum quas in itinere Caspio-caucasico observavit fasc. duo. — Vilnæ, Lipsiæ, 1831–33.
1843. **Ainsworth W.** — Recherches in Asia Minore, Mesopotamia, Chaldea and Armenia. London, 1843.

(1841-1888 = PERIODO BOISSIERIANO)

- 1841–51. **Koch C.** — Catalogus plantarum quas in itinere per Caucasum, Georgiam Armeniamque annis 1836–1837 collegit Dr. C. Koch. — *Linnæa*, XV (1841), p. 243 e 705, XVI (1842), p. 347 e XVII (1843), p. 31 e 273.
- Id.** — Reise durch Russland nach dem Kaukasischen Isthmus in den Jahren 1836, 1837 u. 1838. — Stuttgart u. Tübingen, 1842–43.
- Id.** — Wanderungen im Oriente während der Jahre 1843 u. 1844. Weimar, 1846–47.
- Id.** — Beiträge zu einer Flora des Orientes. — *Linnæa*, XXI (1848), p. 289 e 609; XXII (1849), p. 177 e 597; XXIII (1850), p. 577 e XXIV (1851), p. 305.
- Id.** — Karte von dem kauk. Isthmus und von Armenien. Berlin, 1850.
- 1842–1888. **Boissier Edm.** — Diagnoses plantarum orientalium novarum. Parisiis, Lipsiæ, 1842–1859.
- Id.** — Flora orientalis. Genevæ et Basileæ, 1867–1884. Supplementum, 1888.
- 1842–1850. **Jaubert C. et Spach E.** — Illustrationes plantarum Orientalium etc. Paris, 1842–50.
- 1842–1853. **Lebedour K. F. v.** — Flora rossica. Stuttgartiæ, 1842–53.
1843. **Aucher - Eloy P. M. R.** — Relations des voyages en Orient de 1830 à 1838 etc. Paris, 1843.
- 1843–1862. **Kotschy Th.** — Abbildungen und Beschreibungen neuer und seltner Thiere und Pflanzen, in Syrien und im westlichen Taurus von ihm gesammelt etc. Stuttgart, 1843.
- Id.** — Reise in den Cilicischen Taurus über Tarsus. — Gotha, 1858.
- Id.** — Die Eichen Europa's und des Orients. — Wien u. Ollmütz (1858) – 1862.
1847. **Abich H.** — Geognostiche Wanderungen durch den Kaukasus und zum Ararat. — *Verhandl. d. Gesellsch. f. Erdk. in Berlin*. IV (1847). Cfr. Baumgrenze.
- 1848–1851. **Wagner M.** — Reise nach dem Ararat. Stuttgart, 1848; — Reise nach dem Persien. Stuttgart, 1851.

- 1849-1860. **Buhse Fr.** — Vorläufiger botan. Bericht über meine Reise durch einen Teile Armeniens etc. - *Bull. ph. math. de l' Acad. d. sc. de St. Petersbourg*, VII (1849).
- Id.** — Eine Reise durch Transkaukasien und Persien in den Jahren 1847-49. - *Bull. Soc. Nat. de Moscou*, III (1885).
- Id.** — Aufzählung der auf einer Reise durch Transkaukasien und Persien gesammelten Pflanzen in Gemeinschaft von Dr. E. Boissier. - *Nouv. Mém. de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou*. Tom. XII (XVIII!). Moscou, 1860.
1851. **Fischer Fr.** — Notice sur les Anoplantus de l' ancien monde. - *Bull. Soc. des Nat. de Moscou*, 1851, I (1852).
- 1857-1861. **Tchihatcheff P.** — Etudes sur la végétation des hautes montagnes de l' Asie-Mineure et de l' Arménie. - *Bull. Soc. Bot. de France*, IV (1857).
- Id.** — Botanique de l' Asie Mineure, de l' Arménie et des Iles de l' Archipel grec. - Paris 1860-66.
- 1842-60. **Fenzl E.** — *Pugillus plantarum novarum Syriæ et Tauri occidentalis. Vindobonæ*, 1842.
- Id.** — *Illustrationes et descriptiones plantarum novarum Syriæ et Tauri occidentalis*. Stuttgart, 1843.
- Id.** — *Diagnoses plantarum orientalium et observationes botanicæ*. Paris, 1860.
- » **Fenzl, Heckel u. Redtenbacher.** — Abbildungen u. Beschreibungen neuer und seltener Thiere u. Pflanzen in Syrien und im westlichen Taurus gesammelt von Th. Kotschy. 1843-49. (Cfr. Kotschy s. c.)
1863. **Reichard H. W.** — Ueber Zwei neue Arten von *Centaurea* aus Kurdistan. - *Verh. d. K. K. zool.-bot. Ges. in Wien*, 1863, p. 1039.
- 1867-1899. **Radde G.** — Reisen in Kaukasien etc. - *Geogr. Mittheilung*. 1867, p. 12; 1876, p. 139; 1878, p. 246; 1884, p. 413.
- Id.** — Aus den Dagestanischen Hochalpen. - *Ibid.*, Erg. n. 85 (1887).
- Id.** — Reisen in Armenien Talysch, Ararat, Bingöl-Dagh. *Ibid.* 1868, p. 55; 1872, p. 206; 1875, p. 56; 1877, p. 411; 1881, p. 47.
- Id. e G. Sievers.** — Reise in Hoch-Armenien im Sommer 1874 - *Ibid.*, 1875.
- Id.** — Vorläufiger Bericht über die Jahre 1875 ausgeführten Reise in Kaukasien und dem armenischen Hochlande. - *Ibid.*, 1876, p. 139.
- » **Radde.** — Der Bin-göl-dagh, der Tausend Seen Berg, das Quellgebirge des Aras. - *Ibid.*, 1877, p. 411.
- Id.** — Reise nach Talysch, Aderbeidshan und zum Savalan 1879-80. *Ibid.*, 1881, p. 49.
- Id.** — Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Kaukasusländer von der unteren Wolga über den Manytsch-Schneider bis zur Scheitelfläche Hoch-Armeniens. - *Die Vegetation der Erde*, III. Leipzig, 1899.

- 1875-1887. **Trautvetter Rud. v.** — Enumeratio plantarum a Dr. G. Radde in Armenia rossica et Turciæ districtu Kars lectarum. — *Act. Hort. bot. Petrop.*, IV, 2 (1875).
- Id.** — Plantarum messes a. 1874 in Armenia a Dr. G. Radde et in Daghestania ab A. Becker factas commentatus est. — *Ibid.*, IV, 1 (1875).
- Id.** — Plantas a Dr. G. Radde in isthmo caucasico a. 1875 lectas enumeravit. — *Ibid.*, IV, 2, p. 341 (1876).
- Id.** — Plantas caspio – caucasicas a Dr. G. Radde et Becker a. 1876 lectas delucidavit. — *Ibid.*, V, 2, p. 329 (1879).
- Id.** — Contributionem ad floram Daghestaniæ ex herbario Raddeano a. 1885 eruit. — *Ibid.*, XI (1887), p. 79.
- 1879-1910. **Medwiedew J.** — Ueber die Höheverbreitung einiger Pflanzen im Transkaukasien. — *Schrift. d. Kank. Gesellsch. d. Liebhaber d. Naturw. u. d. Alpenclubs*. I (1879).
- Id.** — Bäume und Sträucher der Kaukasus. Tiflis, 1883.
- Id.** — Über die pflanzengeographischen Gebiete des Kaukasus. — *Mon. du Jard. bot. de Tiflis*. Livr. 8 (1907).
- Id.** — Fagus, Alnus et Betula des Kaukasus. — *Mon. du Jard. bot. de Tiflis*. Livr. XVII (1910).
1882. **Petersen W.** — Reise aus Transkaukasien und Armenien. — *St. Petersb. Zeit.*, 1882 p. 206 etc.
- 1883-1885. **Celakowsky L.** — Ueber einige Stipen. — *Oesterr. bot. Zeitschr.*, XXXIII (1883), p. 313 e 349.
- Id.** — Ueber einige verkannte orientalische Carthamus Arten — *Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Classe Jahrg. 1885*.
- Id.** — Ueber einige neue orientalische Pflanzenarten. — *Oesterr. bot. Zeitschr.*, XXVII (1887), p. 265 e 337.
- 1885-86. **Stapf O.** — Beiträge zur Flora von Lycien, Carien und Mesopotamien. Plantæ collectæ a Dre. F. Luschan a. 1881-82-83. I Theil. *Deutsch. d. K. Akad. etc.* Bd. L (1885); Bd. LI (1886).
1887. **Smirnow M.** — Enumération des espèces des plantes vascu-laires du Caucase. — *Bull. Soc. Nat. de Moscou*, LXI (1885).
- **Forster M.** — Some new Irises. — *Garden Chronicle*, ser. 3a, vol. I, p. 611, 672 e 783.
- 1887-89. **Köppen Th. v.** — Die Geographische Verbreitung der Hölz-gewächse Russland u. Kaukasus (non visto).

(1888-1911 = PERÍODO POSTBOISSIERIANO)

- 1888-1896. **Post G. E.** — Diagnoses plantarum novarum orientalium. — *Journ. Linn. Soc. London*, XIV (1888), p. 419.
- Id.** — Flora of Syria, Palestine, and Sinai from the Taurus to Ras Muhammad, and from the Mediterranean Sea to the Syrian Desert. Beirut, 1896.

- 1888-1900. **Freyn J.** — Beitrag zur Flora von Syrien und der Cilischen Taurus. — *Deutsch Bot. Monatsschrift*, VI (1888), p. 81.
- Id.** — Plantæ novæ orientales. — *Oesterr. bot. Zeitschr.* XL (1890), p. 399 e 441; XLI (1891), p. 9, 54 ecc.; XLII (1892), p. 8, 46 ecc.; LXIII (1893), p. 372 e 413 e XLIV (1894), p. 27, 61 ecc.
- Id.** — Ueber neue und bemerkenswerth orientalische Pflanzenarten. — *Bull. Herb. Boiss.*, III (1895), V (1897), VI (1898); 2a. ser. I (1901) e *Mem. Hb. Boissier* n. 13 (a. 1900).
1889. **Wettstein R. v.** — Beitrag zur Flora von Persien. Bearbeitung der von J. A. Knapp im Jahre 1884 in der Prov. Aderbeidschan gesamm. Pflanzen etc. — *Verh. d. k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien*, 1889.
- 1891-1909. **Kusnezow N. J.** — Die Elemente des Mittelmeergebietes im westlichen Transkaukasiens etc. — *Sep. - Abdr. aus den Memoir. d. K. Russ. Geogr. Gesellsch.* XXIII (1891).
- Id.** — Das Subgenus Eugentiana Kusnez. d. Genus Gentiana Tourn. — *Schrift. d. Gesellsch. d. Naturforsch. von St. Petersbourg*, 1894.
- Id.** — Principes de la division du Caucase en régions phytogéographiques. — *Mem. de l' Acad. Impér. d. Sc. d. St. Petersb.* 8a. ser. cl. phys. - math., XXIV (1909).
- 1901-1911. **Kusnezow N. J., Busch N. e Fomin A.** — Flora caucasica critica. Materialien zur kaukasischen Flora. Lief. I - 32. Juriew, 1901 - 1911 (cont.).
1891. **Dieck G.** — Ein Ausflug ins armenische Hochlande. — *Zeitschr. für Garten- und Blumenkunde*. Jahrg. 40 (1891).
- 1892-1911. **Bornmüller J.** — Phlomis Russeliana Lay u. Ph. Samia L. — *Oesterr. bot. Zeitschr.*, XLII (1892) p. 113.
- Id.** — Vinca Haussknechtii Born. et Sint. — *Ibid.*, LVIII (1898), p. 453.
- Id.** — Ein Beitrag zur Kenntniß der Flora von Syrien und Palästine. — *Verh. d. K. K. zool.-bot. Gesellschaft in Wien*, XLVIII (1898), p. 544.
- Id.** — Zwölf neue Nepeta - Arten aus Persien, Kurdistan und Kleinasien. — *Bull. Herb. Boiss.*, VII (1899), p. 229.
- Id.** — Ein Beitrag zur Kenntniß der Orobanchenflora Vorderasiens. — *Ibid.*, 2a ser., IV (1904), p. 673.
- Id.** — Zwei neue Scrophularien aus Persien und Kurdistan. — *Fedde's Rep. spec. nov.* VII (1909), p. 202.
- Id.** — Neue Onosma - Arten aus Persien u. Kurdistan. — *Ibid.*, VIII (1910), p. 539.
- Id.** — Bearbeitung der von J. A. Knapp im nordwestlichen Persien gesamm. Pflanzen. — *Verh. d. K. K. zool.-bot. Gesellschaft in Wien*, LV (1910), p. 61.
- Id.** — Ueber einige unbeschriebene Aethionema - Arten der orientalischen Flora. — *Fedde's Rep. spec. nov.*, X (1911) p. 174.
- 1893-1895. **Albow N.** — Verzeichnis der in Vilayet Trapezunt 1891 gesamm. Pflanzen. — *Acta Hort. bot. Petrop.* XIII (1893).

- Id.** — Contributions à la Flore de la Transcaucasie. — *Bull. Herb. Boiss.*, I (1893), p. 237.
- Id.** — Nouvelle contributions à la Flore de la Transcaucasie. — *Ibid.*, II (1894), p. 114, 247, 448 e 639 e III (1895), p. 89 e 228.
- Id.** — La Flore alpine des calcaires de la Transcaucasie occidentale. — *Ibid.*, III (1895), p. 512.
- Id.** — Les Forêts de la Transcaucasie occidentale. — *Ibid.*, IV (1896) p. 61.
- Id.** — *Prodromus Floræ Colchicæ*. Genève, 1895.
1893. **Crépin Fr.** — Les roses recueillies en Anatolie (1890 e 1892) et dans l' Arménie Turque (1890), par P. Sintenis et J. Bornmüller. — *Bull. Herb. Boiss.*, I (1893), p. 159.
1894. **Levier E.** — A travers le Caucase. — Paris, 1894.
1895. **Alishan L. M.** — Հայրուսակ կամ Հայկական բուսաբառութիւն Haipussag gam Haigagan Pussaparutiun (Flora armena o nomenclatura fitologica armena¹). Venezia, S. Lazzaro, 1895.
- » **Winkler C. u. Bornmüller J.** — Neue Cousinien des Orients. — *Bull. Herb. Boiss.*, III (1895), p. 56 e 61, V (1897), p. 164.
1899. **Fedschenko B.** — Liste provisoire du genre *Hedysarum*. — *Ibid.*, VII (1899), p. 252.
- » **Lomakine A.** — Materialen zur Flora des Karabagh. — *Act. Hort. bot. Tiflis*, III (1899).
- » **Lipsky W.** — Flora caucasica. — S. — Petersbourg, 1899.
- » **Radde G.** — Cfr. pag. 22.
1900. **Chioveuda E.** — Contributo alla Flora mesopotamica. — *Malpighia*, a. XIV (1900), p. 3.
- » **Sommier S. e Levier E.** — Enumeratio plantarum a. 1890 in Caucaso lectarum — *Act. Hort. Petrop.*: Petrop. et Florentiæ, 1900.
1903. **Levier E. e Sommier S.** — Una erborazione a Trebisonda. — *Bull. Soc. Bot. Ital.*, 1903, p. 142.
1904. **Grynevetsky B.** — Compte rendu préliminaire du voyage en Arménie et au Karabagh en 1903. — *Bull. Soc. Imp. Géogr. Russe*, XL (1904), p. 355.
- Id.** — Verzeichniss der selteneren, während der Sommereise in Transkaukasien im Jahre 1903 gesamm. Pflanzen. — *Act. Hort. bot. Un. Imp. Jurjewensis*, V (1904), p. 84.
1905. **Cecchettani Ad.** — Contribuzione alla Flora della Mesopotamia. — *Ann. di bot. di R. Pirolta*, II (1905), p. 478.
- 1905-06. **Terraciano A.** — Gagearum species Floræ orientalis ad exemplaria imprimis in herbariis Boissier et Barbey. — *Bull. Herb. Boiss.*, 2a ser. V (1905) e VI (1906).

1. Altre notizie su piante coltivate o spontanee trovansi in altre opere dell' A. sulle varie provincie armene e tra queste ricordiamo: Shirag (1881), Airarad (1890), Sissagan (1893) e Sissouan (1899), quest' ultima tradotta in francese e recante elenchi di piante desunti dalle opere di Boissier, Kotschy, ecc.

1906. **Buser R.** — Alchimillæ nonnullæ Caucasicæ et Ponticæ. — *Mon. du Jard. bot. de Tiflis. 1906.*
- » **Fedde F.** — Pflanzen, die in den Bänden 1 – VI (1900 – 1905) der Acta Hort. botanici Jurjevensis neu beschrieben wurden — *Fedde's Repert.*, II (1900), p. 134.
- 1906-07. **Pampanini R.** — La Cheilanthes Szovitsii F. et M. e la sua presenza in Italia. — *Nuov. Giorn. Bot. Ital.*, n. ser. XIII (1906), p. 139.
- Id.** — *Astragalus alopecuroides L.* (em. Pamp.). — *Ibid.*, XIV (1907), p. 327.
1908. **Palibine J. W.** — Contributions à l'histoire de la Flore de la Transcaucasie occidentale. — *Bull. Herb. Boiss.*, 2a ser., VIII (1908), p. 445.
- » **Woronow G.** — Kurzer Bericht über pflanzengeographische Untersuchungen im Kreise Artwin. — *Mon. du Jard. bot. de Tiflis. Livr. 9* (1908).
- Id.** — Beiträge zur Flora Artwins. — *Ibid. Livr. 10* (1908), p. 33.
1908. **Schawrow N.** — Description brève des itinéraires de Batoum jusqu'à Benara et Ordjokh et d'Artwin jusqu'à Ardanoudje. — Cfr. Ref. in *Mon. du Jard. bot. de Tiflis. Livr. 9* (1908), p. 38.
- Id.** — Ueber die Verbreitung einiger Pflanzen in den Thälern von Czoroch und Imercheni. Cfr. Ref. in *Mon. du Jard. bot. de Tiflis. Livr. XII* (1908), p. 23.
- 1909-11. **Fomin A.** — Einige neue Pflanzenarten aus Transkaukasien. — *Mon. du Jard. bot. de Tiflis. Livr. XIV* (1909), p. 43.
- Id.** — Uebersicht der Arten der Gattung *Cystopteris* im Caucasus. — *Mon. du Jard. bot. de Tiflis. Livr. 18* (1910), p. 3.
- Id.** — Uebersicht der *Dryopteris* — Arten in Caucase. — *Ibid. Livr. 20* (1911), p. 20.
1909. **Handel-Mazzetti H. F. v.** — Ergebnisse einer botan. Reise in das Pontische Randgebirge im Sandschak Trapezunt, etc. — *Sep. — Abdr. aus d. XXIII Bd. d. Ann. d. K. K. Naturhistor. Hofmuseums*, Wien, 1909.
- » **Id.** — Revision der balkanischen und vorderasiatischen Onobrychis — Arten aus der Sektion Eubrychys. — *Oesterr. Bot. Zeitschr.*, LIX (1909), p. 369, 424 e 479.
1910. **Petrak Fr.** — Über neue oder wenig bekannte Cirsien aus den Orienten. — *Ibid.*, LX (1910), p. 351, 393, 436 e 459.
- Id.** — Über den Formenkreis des *Cirsium Sintenisii* Freyn. — *Ibid.*, — LX (1910), p. 463.
- » **Medwedew J.** — Cfr. pag. 23.
1911. Cfr. Kusnezow e Bornmüller (p. 24) e Fomin (p. 26).

AGGIUNTA

1858-1877. **Bunge A.** — Plantas Abichianas in itineribus per Caucasum regionesque transcaucasicas collectas enumeravit. — *Mém. de l' Acad. d. sc. de St. - Petersbourg*, 1858-59.

Id. — Über die Gattung Echinops. — *Bull. de l' Acad. c. s.* VI (1865).

Id. — Generis Astragali, species gerontogeæ. — *Mém. de l' Acad. c. s.*, 1868-69.

Id. — Über die Heliotropien der mittelländisch - orientalischen Flora. — *Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc.*, II (1869).

Id. — Die Gattung Acantholimon. — *Mém. de l' Acad. c. s.* XVIII (1872).

Id. — Species generis Oxytropis Dl. — *Ibid.*, XXII (1877).



*Opere utilizzabili per la nomenclatura floristica armena,
oltre le pubblicazioni del P. L. Alishan, sono:*

Dizionario di Scienze ed Arti, del **P. M. Katciuni**, Mechit. **Venezia**.

» Franc. - Arm. del Prof. **Norayr Püsantatzi**. **Cospoli**.

» » » Sr. **Mes. Nubarian**. **Costantinopoli**.

» » » Sr. **Guy de Lusignan**. **Parigi**.

Testo di Botanica del **P. G. Meneviscian**. Mech. di **Vienna**.

Piante e loro nomi. opuse. di p. 46 del **Dr. J. Artignan**. **Parigi**.

Piante utili della Prov. di Erivan di **Atanassiantz**. **Tiflis**.

Piante che danno colori. **Sarukhanian**. **Tiflis**.

Rivista «Arevelian Mamul» di **M. Mamurian**. **Smirne**.

Rivista mensile «Van Dosp». Si pubblica a **Van**.

Rivista, «Azgagrakan Handess» del Prof. **I. Lalayantz**. **Tiflis**.

Riviste «Murdge», «Luma», «Keghadendess», ecc. di **Tiflis**.

Rivista «Pazmaveb» dei **P. P. Mechitaristi** di **Venezia**.

Giornali «Arevelk», «Hairenik», «Püsantion». **Costantinopoli**.

Dizion. di ling. arm. di **St. Roshkian**. *Manosc. in S. Laz. Venezia*.

«Աղեղեայ ժանտախտի» di **St. Sheriman**. » » » »

Nomencl. flor. nella lett. Arm. di **N. Püsantatzi**, Manoscritto presso i PP. Mech. di **Vienna**, e manoscritto più completo presso l' **Autore**, in **Venezia**, ecc. ecc.

ENUMERAZIONE SISTEMATICA DELLE SPECIE¹

* * *

EMBRYOPHYTA ASIPHONOGAMA

* * * * *

FILICES

1. **Ceterach officinarum** W. — Boiss. Fl. or., V, p. 722.
Arm. transcauc.: sui muri dell'antica fortezza di Ardanutsch (8 VIII 1910: leg. Diratz.); Arm. cilic.: sul Kabak - Tépé di Zeitun, (23 VIII 1907, leg. Mergiand.). Essiccata n. 1.
2. **Polypodium vulgare** L. — Boiss. Fl. or., V, p. 723.
Mamanelis nel distr. Shavshett del Piccolo Caucaso, (14 IX 1911: leg. Ro. S. Rostom.); Ess. n. 334.
Nome volgare in armeno, secondo l' Hai. Pussag, Կամոթ - si pronuncia *Kaint*; sec. St. Roshkian. Կամուռնի - pr. *sciadodni* = polypodium.
3. **Cystopteris fragilis** (L. sub *Polyptilio*) Bernh. — Boiss. Fl. or., V, p. 739 α **genuina**.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 335 (20. VI 1907, leg. Asdurian.); sul Beryt-Dagh, (20. VII. 1908, leg. G. Mergiand.). Ess. n. 335.
4. **Notochlaena Marantae** (L. sub *Acrosticho*) R. Br. — Boiss. Fl. or., V, p. 725; S. et Sm. Fl. græc. icon. 904.
Arm. cilic.: sul Kabak - Tépé di Zeitun, (23 VIII 1907: leg. Mergiand.!) - Quivi già raccolta dall' Haussknecht ed indicata dal Boissier). Ess. n. 3.

1. Tranne che per l' ordinamento generale della nostra enumerazione per il quale seguimmo recenti schemi di classificazione, abbiamo cercato di attenerci il più fedelmente possibile alla classica «Flora orientalis» di Edm. Boissier, giustificando con apposite osservazioni i luoghi dove ce ne siano allontanati o rimandando a fonti più recenti ed a lavori pubblicati da uno di noi (Béguinot). Naturalmente la Flora dei paesi orientali e quindi dell' Armenia non ha sfuggito per parecchi suoi generi e gruppi di specie a quel lavoro critico - monografico che caratterizza le attuali ricerche e di cui è giuoco-forza tenere conto, se vogliamo sul serio cooperare ai progressi delle sue conoscenze. Tale lavoro di revisione è pochissimo avanzato per l' Armenia p. d. e crediamo perciò che qualunque contributo condotto con sicuro metodo morfo - geografico raggiunga lo scopo cui abbiamo sopra accennato.

5. **Pteris aquilina L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 728.
 Ponto: dintorni di Trebizonda (8 VIII 1859: leg. Marim.!) e presso Zefanoss (2 VIII 1907: leg. Shaban.!), n. 4.
 Nom. volg. in Trebizonda, secondo P. Marimian, Խմիռ — pr. impr. sec. Hai Pss. Արծուածանկ — pr. arzuagiank.
6. **Scolopendrium vulgare Sm.** — Boiss. Fl. or., V, p. 729 [sub *S. officinalis*].
 Pont.: villaggio Mala presso Trebizonda, (3 VII 1889: leg. Khushb.), n. 5.
 Nom. volg. in Trebizonda, sec. Khushb. Կողեզուր pr. Gorlesù = [lingua di vacca] sec. il libro di P. G. Meneviscian. Ցողենի — pr. tzoghkeni.
7. **Asplenium Trichomanes L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 731.
 Arm. transcauc.: Artwin nell' altura detta Imara Tagara (30 VII 1910 leg. Diratz.!) e Mamanelis nel Piccolo Caucaso, (14. IX. 1911. leg. S. Rostom !), n. 336.
 Nom. volg. nel dist. Shavshett, sec. D. S. Rostom. Էջեր — pr. Ezer, sec. Hai Pss. Խճճուր — pr. Khdud.
8. **A. Filix - foemina** (L. sub *Polypodio*) **Bernh.** — Boiss. Fl. or., V, p. 735 (sub *Athyrio*).
 Pont.: Mala presso Trebizonda, (29 VII 1889, leg. Khushb.!), n. 6. dintorni di questa città, (Primavera 1908, leg. V. Shabanian), n. 337.
 Nom. volg. in Treb. sec. Khushb. Եղափիլունց — pr. Ieghapiluntz ; sec. Hai Pss. Պլու ձար — pr. Teru zar = capello del diavolo.
9. **Aspidium aculeatum** (L. sub *Polypodio*) **Sw.** — Boiss. Fl. or., V, p. 736.
 Ponto: Mala presso Trebizonda, (25 VIII 1889, leg. Khushb.!), n. 7.
 Arm. transc. a Mamanelis nel Piccolo Caucaso, (14 IX. 1911 leg. S. Rostom.!) n. 337 e dintorni di Artwin, (VII - VIII 1910, leg. Diratz.!), n. 338.
 Nom. volg. nel distr. Shavshett. sec. S. Rostom. Էջեր — pr. Ezer ; in Treb. sec. Khushb. Փիլունց — pr. piluntz.
10. **Nephrodium Filix - mas** (L. sub *Polypodio*) **Rich.** — Boiss. Fl. or., V, p. 737.
 Ponto: Mala presso Trebizonda, (30 - VII - 1889. leg. Khushb.!) n. 8.
 Nom. volg. in Treb. sec. Khushb. Արչիլունց — pr. arcipiluntz.

EQUISETACEAE

11. **Equisetum arvense L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 741.
 Ponto: Grom presso i Ponti armeni, (1910, leg. Pargent.!), n. 339.
 Arm. centr. presso Musch, (1908, leg. Gindoian!), n. 340 Persarm. presso Ardaz, (1908, leg. Der Minass.!), n. 341.
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Ջու աղի օ շան աղի (ածւնց) — pr. tziu aki, o shan aki = coda di cane. sec. Surmaghian Կղկղուկ — pr. Gtzgtzuk o իշու շաքար — pr. isciù shakar = zucchero di Asino.
12. **E. ramosissimum Defs.** — Boiss. Fl. or., V, p. 742 [sub *E. ramoso Schl.*].
 Ponto: Grom presso i Ponti arm. (1910, leg. Pargent.!), n. 342.

EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA



GYMNOSPERMÆ

CONIFERAE

13. ***Juniperus macrocarpa*** S. et Sm. — Boiss. Fl. or., V, p. 706.
Arm. centr.: dintorni di Musch, (1908, leg. Gind.!), n. 343.
e distr di Warto, (1911, leg. Surmagh.!), n. 344.
Nom volg. sec. Hai. Pss. Կի o գիշի - pr. *ki* o *kishi*; sec. Surmagh. Ճեղթեսի - pr. *gerteni* o Ճեղթեսի - pr. *tzerteni*.
14. **J. *Oxycedrus*** L. — Boiss. Fl. or., V, p. 707.
Arm. transcauc.: Ardanutsch nell' antica fortezza armena, n. 593 (10 VIII 1910 leg. Diratz.!).
Sec. Hai Pss. si trova sull' Ararat, all' altezza di 8000 piedi.
Nom. volg. Ցրդի! o Ցրդկեսի! - pr. *tzrdi* o *tzrdkeni*.
15. ***Taxus baccata*** L. — Boiss. Fl. or., V, p. 711.
Arm. transcauc.: dint. di Artwin, n. 345 (12 VII 1910, Diratz.!).
Nom. volg. Կեղզի - pr. *keghzi*.

GNETACEAE

16. ***Ephedra distachya*** L. — Boiss. Fl. or., V, p. 713.
Arm. transcauc.: Artwin nella fortezza, n. 346 (10 VII 1910, leg. Diratz.!).

ANGIOSPERMÆ

MONOCOTYLEDONES

GRAMINACEAE

- ✓ 17. ***Sorghum halepense* (L. sub *Holco*) Pers.** — Boiss. Fl. or., V, p. 459.
Arm. centr.: distr. di Warto, n. 347 (1911, leg. Surmagh.!).
Nom volg. sec. Hai Pss. Տուրռա o զուռռայ - pr. *durra* o *surra*.
18. ***Setaria italica* (L. sub *Panico*) P. B.** — Boiss. Fl. or., V, p. 443.
Arm. centr.: dintorni di Musch, n. 348 (1908 leg. Gindo!); arm. cilie.: dintorni di Elbistan, n. 349 (26 VII 1907, leg. Asdurian!).
Probabilmente sfuggita alla coltura. Secondo Asdur. in turco == Գոնազ սարըսը - pr. *Conac darissi*.
19. ***S. glauca* (L. sub *Panico*) P. B.** — Boiss. Fl. or., V, p. 442.
Pont.: dintorni di Trebizonda, n. 350 (20. V. 1910. Diratz !).

20. **Oryza sativa L.** Non esiste nel Boissier. ✓
 Arm. centr.: distr. di Warto, n. 391 (1911, leg. Surmagh!). Certamente coltivato.
 Nom. volg. **Arbq** o **pprbq** - pr. **Voriz, printz.**
21. **Phleum exaratum Hochst.** in Ky. — Boiss. Fl. or., V, p. 480; ✓
 Ky. It. cil. in Tauri Alp. «Bulgar-Dagh», n. 82 [sub *Ph. græco!*].
 Arm. cilic.: dintorni di Elbistan, n. 9 (6 VI 1907, leg. Asdurian!). ✓
22. **Stipa barbata Desf.** — Boiss. Fl. or., V, p. 503.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 20 (VI 1907, leg. Asdurian!).
 Nom. volg. sec. il libro Menevian, **Փերփառ** - pr. **pedrkhod.**
23. **Agrostis alba L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 514.. ✓
 Ponto: dintorni di Trebisonda, n. 352 (1908, leg. Shabanian!).
 Arm. transcauc.: Artvin n. 353 (VII-VIII 1910, leg. Diratz!).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. **Ակուստիկ** - pr. *acrhodug*; sec. il racc. Shabanian (in turco) **սիմպիլ** - pr. *sümbül*.
24. **Calamagrostis pseudophragmites** (Hall. sub *Arundine*) Baumg. — Boiss. Fl. or., V, p. 524 [sub *C. litorea*]. ✓
 Arm. transcauc.: Pkhikur nel Picc. Cauc., n. 354 (1910, leg. Rost.).
25. **Holcus lanatus L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 532. ✓
 Ponto: dintorni di Trebisonda, n. 11 (leg. Marimian et Diratz!).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. **Սորեսկ** o **Գաւարս** - pr. *ssoriag* o *caravss.*
26. **Avena fatua L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 543. ✓
 Ponto: dintorni di Trebisonda, n. 355 (14 V 1908, leg. Shaban!) [= var. *glabrescens* Coss.]; Arm. transcauc.: Mamanelis nel Piccolo Caucaso, n. 356 (20 VII 1912, leg. Rostom!).
 Nom. volg. **Վարսակ** - pr. *varsag.*
27. **Cynodon Dactylon** (L. sub *Panico*) Pers. — Boiss. Fl. or., V, p. 533. ✓
 Arm. cilic.: Elbistan (10 VI 1907, leg. Asdurian) e Kabak - Tepé, (22 VIII 1907, leg. Mergian!), n. 12.
 Nom. volg. sec. St. Shehiman **Արանդակ?** - pr. *aruandag*; sec. Amirdovlat **Ահ** - pr. *ssil* o **Ակ** - pr. *sses.*
28. **Diplachne serotina** (L. sub *Festuca*) Lk. — Boiss. Fl. or., V, p. 562.
 Arm. cilie.: Elbistan, n. 13 (2 VI 1910, leg. Asdurian!).
29. **Cynosurus echinatus L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 571.
 Ponto: dintorni di Trebisonda, n. 357 (1912, leg. Diratz!).
30. **Dactylis glomerata L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 596.
 Arm. centr.: dintorni di Erzerum, n. 358 (1907, leg. Partam!).
 Nom. volg. **Արարոյս** (**կծկուս**) - pr. *molapuiss* - Cfr. Dizionario di P. M. Katciuni I, p. 622, fig. 322.
31. **Poa bulbosa L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 605.
 Arm. centr.: distr. di Warto, n. 359 (1908, leg. Surmagh!).
 È la var. *prolifera* Schm. pr. sp. su cui cfr. Fl. It. exsicc. n. 1216b.
 Nom. volg. sec. Diz. di Katciuni **Արօսածիլ** - pr. *arodadzil.*

32. **P. pratensis L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 601.
Arm. centr.: Elbistan, n. 15 (20 VII 1910, leg. Asdurian!).
33. **Glyceria plicata Fries.** — Boiss. Fl. or., V, p. 614.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 15 (10 VI 1907, leg. Asdurian!).
34. **Bromus arvensis L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 655.
Arm. transcauc.: dintorni di Artwin, n. 360 (VII - VIII 1910, leg. Diratz!).
Nom. volg. sec. Hai Pss. Յորենուկ, փատիսուկ — pr. *tzorenuk*, *psdpsduk*.
35. **B. tectorum L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 647.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 16 (4 VI 1907, leg. Asdurian!). Alcuni esemplari sono da riferire alla var. *longipilus* Borb. ed altri alla var. *nudus* Klett, et Richt.
36. **Festuca altissima All.** — Boiss. Fl. or., V, p. 627 [sub *F. silvatica* Vill.].
✓ Arm. transcauc.: Artwin sulla fortezza e nel luogo detto Peirret, n. 361 (3 VIII 1910, leg. Diratz!). — In nulla differisce dalla pianta italiana con cui fu da noi confrontata.
Nom. volg. sec. Hai Pss. Շիղ - pr. *shügh* od anche Բոշիկ - pr. *poshkh*, sec. P. Menev. Շիղիսս - pr. *shüghkhod*.
37. **Agropyrum caninum** (L. sub *Elymo*) R. et S. — Boiss. Fl. or., V, p. 662.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 16 (10 VI 1907, leg. Asdurian!).
38. **A. Triticum F. Gaertn.** (1770). — Boiss. Fl. or., V, p. 667 [sub *A. prostrato*].
Arm. cilic.: Elbistan, n. 18 (2 VI 1907, leg. Asdurian!). — Corrisponde ad esemplari di varie provenienze conservati nell'Erl. gen. di Padova.
39. **Secale cereale L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 671.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 19 (16 VI 1907, leg. Asdurian!).
Nom. volg. Կարի - pr. *cari*.
40. **Triticum aestivum L.** var. **turgidum L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 672.
✓ Arm. cilic.; Elbistan, n. 20 (19 VI 1907, leg. Asdurian!). Certamente coltivato questo, forse spontaneo il precedente.
Nom. volg. Յորեն - pr. *tzoren*.
41. **Aegilops ovata L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 673.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 21 (2 VI 1907, leg. Asdurian!).
Nom. volg. sec. St. Roshkian Աչակն - pr. *aitzakn* = occhio di capra.

CYPERACEAE

42. **Cyperus longus L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 375.
Arm. centr.: distretto di Warto, n. 362 (leg. Surmagh!).
Nom. volg. Կուկ - pr. *tun*, oppure Կիբռիք - pr. *Kiberiss*.

JUNCACEAE

43. **Juncus conglomeratus L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 352.
 Arm. transcauc.: Artwin presso il villaggio Scheba, n. 586 (20 VII 1910, leg. Diratz!).
44. **J. glaucus Ehrh.** — Boiss. Fl. or., V, p. 353.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 22 (3 VI 1907, leg. Asdurian!).
 Nom. volg. կնիւն - pr. *Gniun*; nello Hai Pss. anche չիւ, պրուռ
 pr. *Gil, brdù*.

ALISMACEAE

45. **Butomus umbellatus L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 12.
 Arm. centr.: Erzerum presso Palandöken, n. 363 (1907, leg. Essayan!). Arm. cilic.: Elbistan, n. 34 (14 VI 1907 leg. Asdurian!); già quivi raccolta dall' Haussknecht ed indicata dal Bois. (op. c.)
 Nom. volg. կնիւն - pr. *Knium*.

LILIACEAE

46. **Ornithogalum montanum Cyr.** in Ten. Fl. Nap. I, p. 176 et Ic. tab. 33. — Boiss. Fl. or., V, p. 216.
 Sir. bor.: Aintab, n. 23 (1906, leg. Khatciad.!).
 Da riferire probabilmente alla var. *platyphyllum* Boiss., che l' Hussknecht raccolse presso Aintab, ma l'esemplare comunitatoe manca di foglie e di bulbo.
 Nom. volg. sec. P. G. Menevishian Ասդղաշուշան - pr. *asdghasciu-scian*: — Hai Pss. Շնակհսծոր - pr. *scinakhsdor*.
47. **Allium cilicicum Boiss.** — Boiss. Fl. or., V, p. 242; Ky. Fl. cilic. in Tauri Alpes « Bulgar-Daph » n. 47d 182 *sub A. rotundo*.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 24. (10 VI 1907, leg. Asdurian!). Già noto per il Tauro cilicico, corrisponde agli esemplari di Kot-schy sopra ricordati e ad altri dell' Iter syriacum, n. 102» dello stesso raccoglitrice.
 Nom. volg. Խայր վայրի - pr. *khisdor vairi*, vedi Hai Pss. anche, Արջախսոր.
48. **Muscati comosum** (L. sub *Hyacintho*) Mill. — Boiss. Fl. or., V, p. 291.
 Arm. cilic.: Elbistan (4 VI 1907, leg. Asdurian!) e Siria bor. Aintab (1906 leg. Khatciad!), n. 25.
49. **M. racemosum** (L. sub *Hyacintho*) Mill. — Boiss. Fl. or., V, p. 295.
 Persarm.: pianura di Khoy, n. 26 (20 III 1907, leg. Der Minass.!); Arm. centr.: Warto, n. 364 (1912 leg. Surmagh.). — Questo secondo numero corrisponde alla var. *Brachyanthum* Boiss. e potrebbe a prima vista confondersi con il seguente sp. n. 89.
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Պակեպլոր - pr. *babkeblor*: sec. P. Menev. Ողկուզաւոր յակինի՞ - pr. *oghgusavor hakint*. Il raccogli-

tore Surmaghian lo nomina կղան կոսոր - pr. *iesan godosh* = corno di manzo.

50. **M. botryoides** (L. sub *Hyacintho*) **Mill.** — Boiss. Fl. or., V, p. 297.
Arm. centr.: dintorni di Musch. n. 361 (1909 leg. Gindoian!).
Nom. volg. sec. Surmaghian Վարդապետուկ - pr. *vartabeduk* = pretino. Nello Hai Pss. vedi Վարդապետիկ.
51. **Hyacinthus orientalis** L. — Boiss. Fl. or., V, p. 319.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 27 (6 VI 1907, leg. Asdurian!).
Nom. volg. Արևելի յանկինթ - pr. *arerelian hakint*. Vedi Hai Pss.
52. **Scilla bifolia** L. — Boiss. Fl. or., V, p. 227.
Arm. centr.: distr. di Warto, n. 366 (1911, leg. Surmagh.).
Nom. volg. sec. Hai Pss. Բծիծ - pr. *plzitz*, oppure Մկնսոխ - pr. *mgnssokh*. Il racc. Surmaghian lo chiama Չնծաղիկ - pr. *tzanza-ghik* = fior di neve.
53. **Asphodeline brevicaulis** (Bert. sub *Asphodelo*) **Gay.** — Boiss. Fl. or., V, p. 317.
Siria bor.: Aintab, n. 28 (1906 leg. Khatciad.).
54. **Paris incompleta** M. B. — Boiss. Fl. or., V, p. 331.
Arm. transcauc.: Artwin presso Mesre Kekedgi, n. 367 (23 VII 1910, leg. Diratz.).
Nom. volg. sec. Hai Pss. Աղռւկասիսկող - pr. *aghressakhaghogh* = uva di volpe.
55. **Smilax excelsa** L. — Boiss. Fl. or., V, p. 343.
Ponto: Trebisonda presso Zefanos, n. 29 (8 VIII 1907, leg. Shabanian!).
Nom. volg. sec. Hai Pss. Գեղճ բարձրածիկ - pr. *cheghtz part-zratzik*.

AMARYLLIDACEAE

56. **Narcissus Tazzetta** L. γ **orientalis** Boiss. Fl. or., V, p. 151.
= *N. orientalis* α Bot. Mag. ic. 940, an L.?
Persarm.: dintorni di Khoy, n. 368 (1908, leg. Der Minass.).
Nom. volg. Նարքս - pr. *narkess*.

DIOSCOREACEAE

57. **Tamus communis** L. — Boiss. Fl. or., V, p. 344
Ponto: dintorni di Trebisonda, n. 369 (3 VII 1908, leg. Shaban!);
Arm. transcauc.: presso la fortezza di Artwin, n. 370 (20 VII 1910, leg. Diratz!). Il num. 369 fa passaggio alla var. *cretica* (L.) collegata, come ebbe già ad osservare il Boissier, con intermediari al tipo.
Nom. volg. sec. Hai Pss. Գայլու ականջ - pr. *Cajlu akantch* = orecchio di lupo.

IRIDACEAE

58. **Iris caucasica Hoffm.** — Boiss. Fl. or., V, p. 121.
 Arm. transcauc.: Passen inf. ad Ak - kilisse (2 V 1907, leg. Minass.!); Sarikamish, n. 30 (15 - 22 VI 1907, leg. Sabund.!). Corrisponde ad esemplari armeni di Aucher - Eloy «Hb. d' Orient, n. 5345». Nom. volg. sec. Hai Pss. Հիրիկ կորկասան - pr. *hirik korkassaïn*.
59. **I. pseudoacorus L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 127.
 Arm. cilic.: Elbistan n. 32 (16 VI 1907, leg. Asdurian!).
60. **I. Iberica Hoffm.** — Boiss. Fl. or., V, p. 131.
 Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak - kilisse, n. 31 (2 V 1907, leg. Minass.!). Corrisponde a saggi di Orudgik (Aderbedgian) distribuiti da Aucher - Eloy nel n. 5343 dell' «Hb. d' Orient». Nom. volg. sec. Hai Pss. Հիրիկ զրացի - pr. *hirik vratzi*.
61. **Gladiolus illyricus Koch.** — Boiss. Fl. or., V, p. 140.
 Siria bor.: Aintab, n. 33 (1906, leg. Khatchad!). Da riferire probabilmente alla var. *anatolicus* Boiss. == *Gl. tenuiflorus* C. (Koch), ma l'esemplare incompleto non permette una precisa identificazione.
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Աղուտի թուր - pr. *acravi tur* = spada di corvo.

ORCHIDACEAE

62. **Orchis palustris Jacq.** — Boiss. Fl. or., V, p. 70; Rchb. Ic. Germ. 40.
 Arm. transcauc.: Sarikamish, n. 35 (17 VI 1907, leg. Sabundg!). Nom. volg. sec. Hai Pss. (per il nome generico Orchis) Շան - ձնք - pr. *shan - tzunk* = uova di cane; sec. i moderni Որձարմադ - pr. *ortzarmad*.
63. **O. laxiflora Lam.** — Boiss. Fl. or., V, p. 71; Rchb. Ic. Germ. 41.
 Arm. transcauc.: Sarikamish, n. 36 (15 VI 1907, leg. Sabundg!). — Trattasi di due specie affini provenienti dalla stessa località, tali però da essere riconosciute dallo stesso nostro corrispondente che le designa con dei nomi volgari diversi, Ղոլցի պլուր - pr. *Gholci blur* la prima e Խամաշորժ - շօբծու - pr. - *Khamashorza* la seconda che prolungherebbe il periodo antesico alcuni giorni dopo la fine della prima.
64. **O. latifolia L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 71.
 Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak - kilisse nei prati umidi, n. 37 (7 VI 1907, leg. Minassian!). Nom. volg. sec. P. Menev. Խոլորչ լայնաներեւ - pr. *Kholortz lainaderev*.
65. **O. sambucina L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 72.
 Arm. centr.: distr. di Warto, n. 371 (1911 leg. Surmagh!).
66. **Epipactis atrorubens Hoffm.** — Boiss. Fl. or., V, p. 38.
 Arm. transcauc.: Artwin nei luoghi boscosi, n. 587 (29 VII 1910, leg. Diratz!).

DICOTYLEDONES**JUGLANDACEAE**

67. **Juglans regia L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1185.
 Arm. transcauc.: Artwin dintorni della città e nelle foreste di Salalet, n. 372 (20 VII 1910, leg. Diratz!).
 Nom. volg. Աղոյի - pr. *enguis*. Nel distr. di Artwin lo chiamano կակալ - pr. *gagal*.

SALICACEAE

68. **Salix alba L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1185.
 Arm. transcauc.: Artwin a Mesire Kekedgian, n. 373 (12 VII 1901, leg. Diratz!).
 Nom. volg. Առենի սպիտակ - pr. *ureni sbidak*.
69. **S. fragilis L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1184; Rehb. Ic. Germ. 1264.
 Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 38 (20 V 1907, leg. Minass!).
 Nom. volg. Առենի դիրապէկ - pr. *ureni türapek*.
70. **S. viminalis L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1191; Rehb. Ic. Germ. 1248.
 Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 40 (20 V 1907, leg. Minass!).
71. **Populus nigra L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1194.
 Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 40 (20 V 1907, leg. Minass!).
 Nom. volg. Կաղամախ սև - pr. *Gaghamakh sser*.
72. **P. alba L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1193.
 Arm. centr.: dintorni di Musch, n. 374 (1918 leg. Gindoian!).
 Nom. volg. Կաղամախ սպիտակ - pr. *gaghamakh sbidak*.
73. **P. tremula L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1193.
 Arm. transcauc.: Artwin nei boschi di Salalet (24 VII 1910 leg. Diratz!); Arm. centr.: dint. di Musch, (1908 leg. Gindoian!), n. 375.
 Nom. volg. Կաղամախ դողդոջուն - pr. *gaghamakh toghlocium*.

CUPULIFERAE

74. **Carpinus orientalis Mill.** (1768) — Boiss. Fl. or., IV, p. 1177.
 [sub *C. duinensi* Scop. (1772)].
 Ponto: Trebiz. presso Mala, n. 44 (3 VIII 1889, leg. Khushb.).
 Nom. volg. nel Ponto sec. il raccoglitore Khushbulian Եհվարի - pr. *tzingari*; sec. P. Menev. Բոկի - pr. *pokhi*.
75. **Ostrya carpinifolia Scop.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1178.
 Arm. transcauc.: Artwin a Mesre Kekedgian, n. 376 (12 VII. 1910, leg. Diratz!).

76. **Corylus Avellana L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1176.
 Arm. cilic.: sul Beryth - Dagh, n. 377 (1908 leg. Mergiand.).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Արքակաղնի, կաղինի - pr. *arcagaghni*,
gaghini. Մանկեղ - pr. *manikegh*. sec. P. Menev. Բնսանի կաղ-
 նի - pr. *endani gaghni*.
77. **Fagus silvatica L.** var. **asiatica** DC. = *F. silratica* Boiss. Fl.
 or., IV, p. 1161, ex p. = *F. orientalis* Lipsky = *F. asiatica* (DC.)
 Winkl. Cfr. Medwedew *Fagus, Alnus et Betula in Kaukasus* in
 Mon. du Jard. bot. de Tiflis, XVII (1910, p. 1).
 Arm. transcauc.: boschi nei dintorni di Artwin, n. 378 (VII-
 VIII 1910, leg. Diratz.).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Ոփի - pr. *vopi*; sec. P. Menev. Փեկոն -
 pr. *pegon*.

BETULACEAE

78. **Alnus orientalis Dcsn.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1179.
 Arm. transcauc.: Artwin nei boschi di Mamatzminda, n. 581
 (27 VII, 1910 leg. Diratz.).
 Nom. volg. Լասդենի - pr. *lassdeni*.
79. **A. glutinosa Gaertn.** var. **barbata** Led. Pl. ross. III, p. 657 =
A. barbata C. A. Meyer. Cfr. Freyn *Pl. nov. orient.* in Bull. Herb.
 Boiss. ser. 2a, II (1902), p. 906 ed Handel - Mazzetti *Bot. Reis.
 Pont. Randgeb. in Sandschak Trapezunt.* in XXIII Bd., d. Ann.
 d. K. K. Naturhistor. Hofmus. Wien 1909, p. 145 (estr.).
 Arm. transcauc.: Artwin nei boschi di Salalet a m. 750. (24
 VII 1910 leg. Diratz.), Ponto: dintorni di Trebizonda (1908
 leg. Shaban.), n. 584.

PLATANACEAE

80. **Platanus orientalis L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1161.
 Arm. transcauc.: Pkhikur nel Piccolo Cauc. n. 379 (1911 leg.
 Rostom.).
 Nom. volg. Սուխ (սրբելեան) - pr. *ssosi (arevelian)*.

URTICACEAE

81. **Ulmus campestris L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1157.
 Arm. transcauc.: dintorni di Artwin, n. 380 (20 VII 1910, leg.
 Diratz.).
 Nom. volg. Կնձնի - pr. *kntzni*.
82. **U. montana Lm.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1158.
 Arm. transcauc.: Artwin, n. 381 (20. VII 1910, leg. Diratz.).
83. **Celtis Tournefortii Lam.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1157; Tourn.
 Voyage II, tab. 425.
 Arm. centr.: distr. di Warto, n. 382 (1911 leg. Surmagh.). Tutti
 i saggi comunicati vanno riferiti alla var. *glabrata* Boiss. (=
C. glabrata et *C. Kotschyana* Stev. sec. Boiss.).

Nom. volg. Բռնչենի - pr. *prnceni*, vedi Hai Pss. p. 101; in turco չեթէնպէջ - pr. *cettenbitch*.

84. **Parietaria officinalis L.** subsp. **judaica L.** (pr. sp.). — Cfr. Boiss. Fl. or., IV, 1149 e Fl. It. exsicc. n. 781 e 782.
Arm. cil.: Elbistan, n. 41 (1 VII 1907, leg. Asdur.!), Kabak - Tépè di Zeitun, n. 52 (22 VIII 1907 leg. Mergiand!). — I saggi di Elbistan ben poco differiscono dalla subsp. *judaica* var. *ramiflora* Mnch. (pr. sp.) dell' Europa: un po' se ne distaccano quelli comunicativi di Kabak - Tépè e da riferirsi alia var. *breripetala* Boiss. (n. coll. 41): forma microfilla ricollegantesi al tipo linneano con tutti i possibili intermediari!
Nom. volg. sec. Hai. Pss. Աղիկու խոռ - pr. *abigù khod*, sec i moderni Կոմինչ - pr. *gruinch*.
85. **Urtica dioica L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1146.
Arm. transeauc.: rovine di Ani (1900 leg. Basmadgi.!); Arm. centr.: dintorni di Erzerum, (1907, leg. Partam.!); Arm. cilic.: Beryt - dagh di Zeitun (30 1907, leg. Mergian.!), n. 43.
Nom. volg. Եղինչ - pr. *Jeghinge*.

ELAEAGNACEAE

86. **Elaeagnus angustifolia L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1056 [*sub E. hortensi* M. B.].
Arm. centr.: Erzerum (4 VIII 1907, leg. Partam.!) e Siria bor. ad Aintab (1906, leg. Khatchiad.!), n. 45.

THYMELAEACEAE

87. **Daphne oleoides Schreb.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1047.
Ponto: villaggio Grom, n. 383 (1910 leg. Parghent.!); Arm. cilic.: Kabat - Tépè di Zeitun, n. 334 (1908 leg. Mergiand.!).
Nom. volg. Կոճակ? - pr. *cogimak*, vedi Hai Pss.

LORANTHACEAE

88. **Viscum album L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1068.
Ponto: presso Trebizonda, n. 385 (1910 leg. Diratz!). Arm. transeauc.: Artwin, Mesre Kekedgian, n. 386 (12 VII 1910, leg. Diratz.!). — I saggi n. 385 sono tipicissimi, quelli corrispond. al n. 386 sono abbastanza angustifogliari, e fanno passaggio a *V. laxum* Boiss. et Reut.
Nom. volg. Ճաղում (*սպիտակ*) - pr. *Giacom*.

POLYGONACEAE

89. **Polygonum Bistorta L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1027.
Arm. centr.: dintorni di Erzerum, n. 46 (VII 1907, leg. Partam.!); Arm. cilic.: Kabak - Tépè di Zeitun, n. 46bis. e 47 (24 -

- 25 VIII 1907, leg. Mergiand.). — I saggi corrisp. al n. 47 riproducono la var. *angustifolium* Meisn. gli altri sono il tipo.
 Nom. volg. sec. Hai Pss. e Shehriman. **Մանգակ** – pr. *mantag*, ma il nome generico di *Polygonum* secondo P. Katciuni ed i moderni, **Մատիսեղ** – pr. *madidegh*.
90. **P. alpinum All.** — Boiss. Fl. or., V, p. 1031.
 Arm. centr.: monti sopra Erzerum, n. 387 (1908, leg. Essayan!).
 Nom. volg. sec. Essayan **Խոշօր գառնականչ** – pr. *khoshor karnaganch*., **աւելուկ** – pr. *areluk*.
91. **P. lapathifolium L.** — Boiss. Fl. or., V, p. 1030.
 Ponto: luoghi umidi presso la spiaggia del mare in Trebisonda, n. 48 (29 VI 1889, leg. Marimiam!).
 Nom. volg. sec. Marim. **Պղափղսոս** – *bghbeghkhod* = erba - pepe.
92. **P. aviculare L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1036.
 Arm. transcauc.: dintorni di Artwin, (14 - 18 VII 1910, leg. Dieratz.!) e rovine di Ani (1900 leg. Basmadgi.!); Arm. cilic.: Elbistan (10 VI 1907 leg. Asdurian!), n. 49.
 Nom. volg. sec. Hai Pss. **Արինձ (մատիսեղն թռչնոց)** – pr. *aringe*;
 sec. il racc. Basmadgian. **Ճնճղապաշար?** – pr. *gingeghabashar*.
93. **P. cognatum a alpestre Meisn.** — Boiss. Fl. or., V, p. 1037 [*sub P. alpestri Mey.*].
 Arm. cilic.: sul Beryt - Dagh di Zeitun, (1908 leg. Mergian!) e Sir. bor. ad Aintab (1906 leg. Khatchad.), n. 50.
94. **P. setosum Jacq** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1038; Ky. It. cil. - kurd. 1859, n. 309.
 Arm. cilic.: sul Kabak - Tépé di Zeitune e sul Beryt - Dagh, n. 338 (1908 leg. Asdur.!). Corrisponde perfettamente agli esemplari distribuiti dal Kotschy nell' Essiccata s. c. e pure provenienti dall' Armenia cilicica!
95. **Rumex crispus L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1009.
 Arm. transcauc.: Mamanelis nel Piccolo Caucaso, n. 51b. (17 VII 1911, leg. Rostom.!); Arm. cilic.: Elbistan. n. 51a (primav. 1907, leg. Asdurian!).
 Nom. volg. sec. il racc. Rostomian presso i giorgiani **Ղուվարյ** – pr. *ghuralo*, presso i turchi **Լուրուք** – pr. *ereluc*. Le semenze di questa specie fanno mangiare, a digiuno, ai cavalli affetti da costipazione; agisce come energico purgante.
96. **R. obtusifolius L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1011.
 Ponto: Trebisonda presso vill. Mala, n. 52 (5 VII 1889, leg. Khushb.!).
 Nom. volg. sec. il racc. Khushb. **Լափազս** – pr. *lapasa*, Il nome generico di Rumex in armeno è **աւելուկ** – pr. *areluk*.
97. **R. Acetosella L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1018.
 Ponto: distr. di Trebisonda, n. 389 (1908 leg. Shaban.!).
 Nom. volg. sec. lib. Menev. **Թթթնչուկ մանր** – pr. *trtnchuk manr*. Il racc. Shabanian scrive **Թթուաշ խոստ** – pr. *thuash khod*.
98. **R. Acetosa L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1015.
 Arm. centr.: distr. di Warto, n. 390 (1911, leg. Surmagh.!).

- Nom. volg. sec. Hai Pss. ԹԹԱԿԻ - pr. *trkice*. Il racc. Surmaghian scrive ԹԹԱՎՈՐԻ - pr. *ttvarosh*.
99. **R. scutatus L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1015.
 Arm. cilie.: sul Beryt - Dagh di Zeitun (1908 leg. Mergian!).
 Nom. volg. Asdurian ԹԹԱԳՈՒԿ - pr. *trtncing*, ed in turco ԳՈՒՂՈՒԿ - pr. *cuzù culaghi* = orecchio di pecora.
100. **Rheum Ribes Gron.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1003.
 Arm. centr.: distr. di Warto, n. 391 (1911 leg. Surmagh!).
 Nom. volg. sec. il racc. Surmag. ԽԱՐԴԻ - pr. *kharrzil*.
101. **Oxyria digyna** (L. sub *Rumice*) Hill. — Bois. Fl. or., IV, 1004.
 Arm. cilie.: sul Beryt - Dagh di Zeitun, n. 392 (1908 leg. Mergian!).

CHENOPODIACEAE

102. **Chenopodium Botrys L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 903.
 Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak - kilisse, n. 393 (1908 leg. Minassian!),
 Nom. volg. sec. il racc. Minassian Կոռ խոռ - pr. *shor khod* ;
 sec. il diz. Katciuni Առեղ - pr. *suegh*; sec. Hai Pss. con dubbio Պարսինա - pr. *barssina*.
103. **Ch. vulvaria L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 901.
 Arm. cilie.: Elbistan, n. 53 (6 VII 1907, leg. Asdurian!).
104. **Blitum virgatum L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 205.
 Arm. cilie.: sul Kabak - Tépé di Zeitun, n. 324 (1908 leg. Mergian!).
 Nom. vol. sec. Hai Pss. Վլիսօն, ծիմիլ - pr. *rlidon, tsimil*.
105. **Atriplex hastatum L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 909.
 Arm. pers.: Khoy, n. 54 (20 IV. 1907, leg. Der Minassian!).
 Nom. volg. Թայլ - pr. *tail*.
106. **Amarantus retroflexus L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 989.
 Arm. cilie.: sul Kabak - Tépé di Zeitun, n. 395 (1908 leg. Mergian!).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Տաճ - pr. *dage*.
107. **A. hypocondriacus L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 988.
 Arm. cilie.: sul Kabak - Tépé di Zeitun, n. 396 (1909 leg. c. s.).

PHYTOLACCACEAE

108. **Phytolacca decandra L.** -- Boiss. Fl. or., IV, p. 895.
 Ponto: dintorni di Trebisonda, n. 397 (1908, leg. Shaban!).
 Nom. volg. sec. Dizionario di P. Katciuni Լակոնի - pr. *laikuni*.

MOLLUGINACEAE

109. **Telephium Imperati L. var. orientalis** (Boiss.) Boiss. Fl. or., IV, p. 754.

Arm. cilic.: Elbistan, n. 55a (6 VI 1907, leg. Asdurian!) e sul Kabak - Tepé di Zeitun, n. 55b (1908 leg. Mergian!).
Nom. volg. sec. Hai Pss. Թակնիկ - pr. tantrnik.

PARONYCHIACEAE

110. **Paronychia Kurdica** Boiss. — Boiss Diagn. I, 3, p. 10 e Fl. or., I, p. 744.
Ponto: Grom, sui monti, n. 398 (1911 leg. Parghent.). — Corrisponde perfettamente agli esemplari di Haussknecht trasmessi all' Erb. Padovano.
Nom. volg. sec. Hai Pss. ed altri Քցիկ - pr. ktzmi.

CARYOPHYLLACEAE

111. **Sagina procumbens** L. — Boiss. Fl. or., I, p. 662.
Arm. transcauc.: Artwin sulle basse pendici del Monte Salalet a circa 850 m., n. 580 (24 VII 1910, leg. Diratz!).
Nom. volg. creato da P. M. Katciuni, Սակին - pr. sakin.
112. **Alsine juniperina** (L. sub *Arenaria*) Fenzl. — Boiss. Fl. or., I, p. 677.
Ponto: Grom nei monti, n. 399 (1911, leg. Parghent.).
Nom. volg. del genere Alsine, sec. Hai Pss. Բղուկ - pr. psrug.
113. **A. setacea** (Thuill. sub *Arenaria*) M. et K. — Boiss. Fl. or., I, p. 679.
Arm. transcauc.: Artwin sulle mura della fortezza genovese lungo il fiume Tchorok, n. 400 (13 VII 1910, leg. Diratz!).
114. **A. sclerantha** Fisch et Mey. — Boiss. Fl. or., I, p. 685.
Arm. cilic.: Elbistan n. 57 (6 IV 1907, leg. Asdurian!).
115. **Lepyrodiclis holosteoides** (Meyer. sub *Gouffea*) Fenzl. — Boiss. Fl. or., I, p. 668; Ky. It. cilic. - kurd. n. 294.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 57 (10 VI 1907, leg. Asdurian!). Corrisponde agli esemplari del Kotschy s. c. e ad altri distribuiti negli « Un. Itin., 1836 », ne differisce solo per le foglie fiorali strettamente lineari.
116. **Arenaria serpyllifolia** L. — Boiss. Fl. or., I, p. 701.
Arm. transcauc.: Artwin presso il villaggio Mamatzminda (26 VII 1910, leg. Diratz!); Arm. cilic.: Elbistan (3 VI 1907, leg. Asdurian!), n. 58. Corrisponde alla forma tipica della specie su cui cfr. Fl. It. exsicc. n. 253.
Nom. volg. adoperato dal P. Katciuni Առաքեստ (ուրշադեր) - pr. avashkod (urtzaderer). P. Menev. per il nome generico Arenaria, scrive Բղուկ - pr. psruk.
117. **Stellaria media** (L. sub *Alsine*) Cyr. — Boiss. Fl. or., I, p. 707.
Arm. pers.: Khoy, n. 59 (2 III 1907, leg. Der Minassian!) - È la var. **gymnocalyx** Trautv, su cui cfr. Béguinot *Ricerche int. al polimorf. della Stellaria media* in « Nuov. Giorn. Bot. Ital., ser. 2a, XVII (1910), p. 353 ».

- Nom. volg. adoperato dal P. Kateuni Ասդազաղիկ (*Asdazaraghik*) – pr. *asdghadzaghiq* (*mitciahassak*). P. Menev. mette Ասդիկ կոփկառ. – pr. *asdghik* (*gdikavor*).
118. **Holosteum liniflorum Stev.** ex F. et M. – Boiss. Fl. or., I, p. 710.
Arm. pers.: Khoy, n. 60 (10 IV 1907, leg. Der Minassian!).
Nom. volg. sec. il diz. Lusignan Խոբախաճին, հաւկոփկ - pr. *kho-bukhagin*, *hargdik*. Il P. Menev. per Holosteum mette Խաճի - pr. *khagi*.
119. **Cerastium manticum L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 712 [*sub Mænchia*].
Arm. centr.: dintorni di Gumgum distr. di Warto, n. 401 (1911 leg. Surmagh.).
Nom. volg. del genere Cerastium è Ճեմուկ - pr. *gergeruk*.
120. **C. dichotomum L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 721. Cfr. **Tabula nostra** I, fig. I.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 61 (10 VI 1907, leg. Asdurian!).
121. **C. inflatum Lk.** in Desf. — Boiss. Fl. or., I, p. 721. Cfr. **Tabula nostra** I, fig. 2.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 62 (8 VI 1907, leg. Asdurian!).
122. **CERASTIUM SACCARDOANUM** Diratz. n. sp. Cfr. **Tabula nostra** I, fig. 3–5.
Glandulosus pubescens, caule rigido dichotomo, ramis erecto-ascendentibus, foliis lanceolato-linearibus acutiusculis, cyma confertim corymbosa, pedunculis erectis calyce brevioribus vel subæqualibus, calyce non inflato, sepalis lanceolatis acutis, anguste marginatis, dorso villoso-glandulosis, petalis calyce duplo brevioribus, capsula cylindrico-conica calyce subæquali dentibus margine non revolutis neque circinnatis, seminibus grosse et crebre granulatis. Species annua, præinsignis a magistro meo P. A. Saccardo grato animo dicata.
Hab. Arm. cilic.: Elbistan, n. 63 (10 VI 1907, leg. Asdurian!).
- Questa nuova specie, secondo lo schema di classificazione adottato dalla «Flora Orientalis» rientra nella sez. *Orthodon* Ser. in DC. e precisamente nel gruppo * *annua* †† *Capsulæ dentes margine non revoluti*, al quale fanno parte *Cerastium dichotomum* L. e *C. inflatum* Lk. in Desf. pure inviatici dai nostri corrispondenti e con i quali, come pure coi materiali conservati nell' Erb. gen. Padovano, Centrale Fiorentino e Webb, l'abbiamo confrontata. Essa è certamente affine alle due citate differendo dalla prima per il fusto più debole, per i rami della pseudodicotomia non divaricati, il calice più piccolo ed a sepali più stretti e per i semi fortemente granulosi: dalla seconda per il calice non rigonfio e da ambedue per la cassula inclusa nel calice, mai sporgente].
123. **Agrostemma Githago L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 661 [= *Githago segetum*].

Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 64b (1908, leg. Minassian!); Arm. centr.: dintorni di Erzerum, n. 64 (14 VIII 1907, leg. Essayan e Partamian!).

Nom. volg. creato dal P. Katciuni Արտասակ - pr. *ardabsak*. sec. P. Menev. Արտեղ (սեռուկ հնդիկ) - pr. *arcenlegh* (*seruk hntik*). L'autore del libro intitolato Մանանյ, alla pagina 449, la nomina ՏԱԼԿ - pr. *gellek*, che basandoci sulla descrizione, crediamo esser A. Githago. Sec. il racc. Essayan Կովացնծուկ? - pr. *goratzndzuk*.

124. **Silene vulgaris** (March) Garck. var. **commutata** Guss. (pr. sp.). — Boiss. Fl. or., I, p. 629 [*sub S. commutata*].
Arm. cilic.: Elbistan, n. 67 (6 VI 1907, leg. Asdurian!) — A questa varietà vanno pure riferiti i saggi da uno di noi (Diratzouyan) raccolti presso Artwin e quelli comunicatici di Warto, ma essi sono rappresentati da sole sommità di fusti fioriferi.
Nom. volg. sec. il racc. Surmaghian (մհանկ մը) ՃՐԹԻԿ - pr. *getik*. Nel Sissuan e nello Hai Pss. del P. Alishan per il nome generico Silene troviamo ՃԻԿԻԿ - pr. *gelelek*. Nel Ponto vien chiamato ՃՐԴՅԱՆԿ - pr. *dzrdzeyk*.
125. **S. spargulifolia** (Desf. Corol. Tourn. p. 73, tab. 55, *sub Cucubalo*) Boiss. Fl. or., I, p. 612.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 66a (10 VI 1907, leg. Asdurian!) e sul Kabak-Tépé, n. 66b (1908, leg. Mergiand.).
126. **S. conoidea** L. — Boiss. Fl. or., I, p. 580. Cfr. Fl. It. exs. n. 1273.
Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 65b (1908 leg. Minassian!); Arm. cilic.: Elbistan, n. 66a (1907 leg. Asdurian!); Arm. pers.: Khoy, n. 66c (1908 leg. Der Minassian!).
Nom. volg. sec. il racc. H. Der Minassian ԳԵՂԻ Կանափ - pr. *Cheshi ganap*, e dice che, dissecata e fumata a guisa tabacco, diviene rimedio contro le emorroidi, ed è per questo che nel dialetto di Divrik viene chiamato Մայասիլի խոճ - pr. *maiassili khod* = erba contro emorroidi. Il racc. Don B. Minassian dice che nel Passen inf. si nomina Հարի կոռոց - pr. *hari kdutz* = becco di gallina, mentre nell' Alashkerd vien detto, Հոնդի փլաւ - pr. *hodghi plav*.
127. **S. Armeria** L. — Boiss. Fl. or., I, p. 583.
Arm. transcauc.: Artwin nei boschi di Salalet e di Imara Tagara a c. 650 m., n. 402 (24 e 30 VII 1910, leg. Diratz.).
128. **Saponaria Vaccaria** L. — Boiss. Fl. or., I, p. 525.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 68a (6 VI 1907, leg. Asdurian!); Arm. pers.: a Khoy, n. 68b (1908, leg. Der Minassian!).
Nom. volg. sec. Hai Pss. Օշնան - pr. *oshnan*; sec. i moderni Օ-ՃԱՆՔԻՆԱՆ - pr. *odgiarkhod* = erba-sapone.
129. **Tunica saxifraga** (L. *sub Diantha et Gypsophila*) Scop. — Boiss. Fl. or., I, p. 519.
Arm. transcauc.: sui muri della fortezza genovese di Artwin e di Ardanoutch, n. 403 (29 VII e VIII 1910, leg. Diratz.).

130. **Dianthus fimbriatus M. B.** — Boiss. Fl. or., I, p. 495; Bot. Mag. tab. 1069 (*sub D. orientalis*!); Ky. It. cil.-kurd. in Tauri Alpes « Bulgar-Dagh » n. 230a. 175b e n. 176. 242 e It. cil.-kurd. a. 1859, n. 527!
- Arm. transcauc.: Artwin sui vecchi muri della fortezza dei Genovesi, n. 404a (13 VII 1910, leg. Diratz!) e distr. Shavshot, borgo Mamanelis nel Picc. Cauc., n. 404b (1910, leg. Rostomian!). Nom. volg. pel genere **Dianthus** Շահօրմ - pr. *shahoram*.
131. **D. campestris M. B.** — Bois. Fl. or., I, p. 504; Rchb. Ic. Crit. tb. 520!
- Ponto: monti sopra Grom, n. 405 (1910, leg. Parghent!). Volgarmente si nomina Մեխաց վարի - pr. *Mekhag vairi*, ma è improprio.
132. **D. humilis W.** — Boiss. Fl. or., I, p. 505.
- Arm. Transcauc.: sui vecchi muri delle rovine di Ani, n. 69 (1900 leg. Basmadgian!).
133. **D. Carmelitarum Reut.** in Huet. — Boiss. Fl. or., I, p. 512.
- Arm. transcauc.: Artwin nei boschi di Salalet, a c. 900 m., n. 579 (24 VII 1910, leg. Diratz!). Affine a *D. Carthusianorum* da cui differisce per le fg. rigide, brevi, strettam. linearì, le infiorescenze meno dense, le squame insensibilim. attenuate subeguali al calice e per la forma dei petali. Non ne vedemmo esemplari nell' Erb. Padovano.

HYPERICACEAE

134. **Hypericum Androsænum L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 788.
- Ponto: Trebizonda, presso villaggio Mala (29 VII 1889, leg. Khushb.) e Zefanos (3 VIII 1907, leg. Shaban!), n. 70.
- Nom. volg. del genere Hypericum sec. Hai Pss. nel Ponto Արևորիկ - pr. *arervurik* = sorellina del sole, vedi nello Hai Pss. anche Կոճամօրուս - pr. *cogiamoruss*; պողպակ - pr. *bobghak*. Il racc. Shaban, dice che, i contadini mettono sopra qualunque piaga e certamente guarisce.
135. **H. orientale L. & ptarmicæfolium** Spach. — Bois. Fl. or., I, p. 795.
- Arm. transc.: Artwin lungo le siepi, n. 405 (14 VII 1910, leg. Diratz!).
136. **H. scabrum L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 796.
- Arm. cilic.: Elbistan, n. 71a (3 VI 1907, leg. Asdurian!) e sul Beryt-Dagh, n. 71b (1908, leg. Mergiand.!); Arm. centr. a Warto n. 71c (1908, leg. Surmagh!); dintorni di Erzerum 71d (1908, leg. Partamian!) ed a Passen inf. ad Ak-kilisse, n. 71e (1908, Minassian!). Gli esemplari citati appartengono al tipo quale è definito dal Boissier, quelli comunicativi dall' Arm. cilicica sul Kabak-Tépé, n. 71f devono riferirsi alla var. *hyssopifolium* Boiss. (= *Drosoanthus hyssopifolia* Spach).
- Nom. volg. sec. il racc. Surmaghian Պոյի խոռ կամ պ. ծաղիկ - pr. *boi khod o b. dzaghik*.
137. **H. hyssopifolium L.** var. **latifolium** Boiss. Fl. or., I, p. 799.
- Sir. bor.: Aintab, n. 72 (1906, leg. Khatchad.!).

138. **H. helianthemoides** Boiss. — Boiss. Diagn. I, 8 p. 116 e Fl. or., I, p. 802.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 73 (10 VI 1907, leg. Asdurian!).
139. **H. crispum** L. — Boiss. Fl. or., I, p. 806.
Arm. cilic.: Zeitun sul Kabak-Tépé, n. 406 (1908 leg. Mergiand.).
140. **H. perforatum** L. — Boiss. Fl. or., I, p. 809.
Arm. transcauc.: Artwin a Mesré Kekedgian e Shighenokhov, n. 407a (12 VII 1910, leg. Diratz!) ed a Mamanelis nel Piccolo Caucaso, n. 407b (1911 leg. Rostomian!). Ponto: dintorni di Trebisonda, n. 407c (1908 leg. Shaban!). Da riferire alla var. **veronense** Schrank. pr. sp. = var. *microphyllum* DC. su cui cfr. Fl. It. exsicc. n. 817.
Nom. volg. sec. lib. P. Menev. Պոպղակ հասարակ — pr. *bobghak hassarak*. Il racc. Rostomian dice, presso i turchi si chiama Մայասսու օդու — pr. *maiassul otù* = herba-emorroidea. I contadini lo fanno bollire e l'acqua amara ottenuta si fa bere ai malati affetti di emorroidi.

CISTACEAE

141. **Helianthemum salicifolium** (L. sub *Cisto*) Mill. — Boiss. Fl. or., I, p. 441.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 74 (10 VI 1907, leg. Asdurian!).
Nom. volg. sec. diz. moderni Արևանթեմ — pr. *arevantem*; sec. Hai Pss. Արեգական ծաղիկ — pr. *arecagan dzaghik*; e sec. diz. Lusignan Կարմրածաղիկ երիցուկ — pr. *garmradzaghik ieritzuk*.

VIOLACEAE

142. **Viola canina** L. — Boiss. Fl. or., I, p. 460.
Arm. cilicica: Zeitun, sul Kabak-Tépé, n. 75 (24 VII 1907, leg. Giand.).
Nom. volg. sec. Amirdovlat Շահբանակ, շան մանուշակ — pr. *shahbanak, shan manushak*: vedi nello Hai Pss. anche Շահորակ — pr. *shahorak*; i moderni scrivono Շնական մանուշակ — pr. *shnakakan manuskak*.
143. **V. tricolor** L. — Boiss. Fl. or., I, p. 465.
Arm. centr.: dintorni di Erzerum, n. 76a (31 V 1907, leg. Essayan!) e Sir. bor. ad Aintab, n. 76b. (1906, leg. Khatchiad!). — Forme diverse da ulteriori studiare su materiale più abbondante ed istruttivo. Il racc. Essayan dice che, nei dintorni e sui monti di Erzerum abbondano, coi fiori grandi come quelle coltivate. Nom. volg. sec. diz. Katciuni Հիր — pr. *hir*; sec. diz. Lusignan Խոկածաղիկ, խոկիկ — pr. *khokadzagik, khokik*; sec. P. Menev. Երեքունեան մանիշակ — pr. *ierekcunian manishak*; sec. Hai Pss. Մանուշակ, Զանազան — pr. *manushak, zanasan*.

RESEDAEAE

144. **Reseda luteola L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 435.
 Arm. transcauc.: Ardanoutch sulle rovine dell' antica fortezza armena, (8 VIII 1910, leg. Diratz.!).; Arm. cilic.: Elbistan, (4 VI 1907, leg. Asdurian!), n. 77.
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Կանչեռու. Աղանձ – pr. *kantcehhgod: aslandge*. sec. il lib. P. Ménev. Յափուկ հասարակ – pr. *hapuk hassarag*.
 145. **R. lutea L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 429.
 Sir. bor.: Aintab, n. 93 (1906, leg. Khatchiad.).
 Nom. volg. sec. Menev. Յափուկ գեղնագոյն – pr. *hapuk teghnacuin*.

CRUCIFERE

146. **Chorispora syriaca Boiss.** in Ann. Sc. Nat., 1842, p. 384 e Fl. or., I, p. 143.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 78 (3-10 VI 1907, leg. Asdurian!).
 147. **Matthiola bicornis** (S. et Sm. sub *Cheirantho*) DC. — Boiss. Fl. or., I, p. 155.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 79 (10 VI 1907, leg. Asdurian!). Le *Matthiola* di questo gruppo sono prevalentem. piante littoranee e tale è la nostra pianta: resta, quindi, un fatto notevole la sua stazione abbastanza lontana dal mare.
 148. **Cardamine amara L.** forma. — Boiss. Fl. or., I, p. 162.
 Arm. Transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 80 (7 VII 1907, leg. Minassian!). L'esemplare è solo fiorifero e merita ulteriore esame di confronto con saggi in frutto.
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Քարաւած. Ասորեակ. Կոսեմ – pr. *carare: assoriak: godemn*; sec. diz. P. Katciuni e sec. il racc. Minassian, Կոսեմ վայրի – pr. *godemn vaïri*.
 149. **Erysimum græcum Boiss et Heldr.** Diagn, II, 1. p. 27 et Fl. or., I, p. 193.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 81 (10 VI 1907, leg. Asdurian!). Corrisponde al n. 12 e 452 di Heldreich « Hb. Fl. Hell. » ed « Hb. græc. norm. » ed al n. 450 di Orphanides « Fl. græc. exsicc. ». Nom. volg. del gen. Erysimum sec. Hai Pss. Զագախոս – pr. *tzacakhod*, nel diz. Katciuni vidi *Vēlar* = Ապիկոյ խոս *pdg̣ikaw-kañ*, Արեգնիճ, Խորճ – pr. *abigo khod pdgishgagan, areknidge, khorgi*.
 150. **Alliaria officinalis** (L. sub *Erysimo*) DC. — Boiss. Fl. or., I, p. 212.
 Arm. centr.: distr. di Warto, n. 408 (1911, leg. Surmagh.).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Խասորամայր. – pr. *khsdoramair*.
 151. **Sisymbrium Sophia L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 216.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 82 (4 VI 1907, leg. Asdurian!).
 Nom. volg. nello Hai Pss. del Sisymbrium nasturtium, Ջրի կո-

- մելիկ* – pr. *tceri godemn*, e per Sis. acquatica. *Ջրիռուկ* – pr. *tcertceruk*. Nel diz. Katciuni pel nome generico *Sisymbrium* v' è messo *Ոխամբար* – pr. *ssissampar*.
152. **S. Loeselii L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 218.
Arm. transcauc.: Artwin sui muri della fortezza di questa città ed in quella di Ardanoutch, n. 409 (10 VII 1910, leg. Diratz!).
153. **Hesperis campicarpa Boiss.** in Ann. Sc. Nat., (842, p. 66 et Fl. or., p. 235.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 83 (3 VI 1907, leg. Asdurian!).
Nom. volg. sec. diz. Katciuni in fr. *Julienne*, in armeno *Մոթուր* – pr. *mntur*: anche nello Hai Pss. vidi *Մոթուր*. Il racc. Asdurian dice che è velenoso: i turchi lo chiamano *Ոխալէյէն* – pr. *sudlein*.
154. **Sinapis arvensis L.** — Boiss. or., I, p. 394.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 92 (4 VI 1907, leg. Asdurian!). Esemplare con siliqua ancora immatura, tuttavia da riferirsi, a quanto pare, alla var. *orientalis* L. (pr. sp.).
Nom. volg. del genere è *Մանակի* – pr. *mananekh*.
155. **Fibigia macroptera** (Ky. It. cil.-kurd. 1859 n. 380: *sub Farsetia*)
Boiss. Fl. or., I, p. 257.
Arm. centr.: distr. di Warto, n. 410 (1911, leg. Surmagh!). — Corrisponde perfettam. agli esemplari raccolti e distribuiti dal Kotschy nell' Essiccata s. p. della valle di Goschkar nel distr. di Warto, donde provengono i saggi a noi comunicati.
156. **Alyssum alpestre L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 268.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 84 (6 VI 1907, leg. Asdurian!). Corrisponde alla var. *serpyllifolium* Desf. (pr. sp.) quale cresce anche in Italia, ma essa va studiata di confronto con altre forme del ciclo su esemplari con siliquette mature.
Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. *Վարդուկ*, *Ալուսան* – pr. *varruk*, *aalussan*. Il racc. Asdurian dice, presso i turchi *Սարը* *սիմբիւ* – pr. *ssari simbül*.
157. **A. calycinum L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 285.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 85 (3 VI 1907, leg. Asdurian!).
158. **Coluteocarpus reticulatus** (Lam. *sub Vesicaria*) **Boiss.** — Boiss. in Ann. Sc. Nat., 1842, p. 162 et Fl. or., I, p. 306.
Arm. centr.: distr. di Warto, n. 411 (1911 leg. Surmagh!). Corrisponde a saggi conservati nell' Erb. Padovano di Huet de Pavillon raccolti tra Baibout ed Erzerum nel 1853.
Nom. volg. sec. il racc. Surmagh. *Ճիկի*. *Անմոռուկ* – pr. *dgetik*, *anmorug*.
159. **Chamaelina silvestris Wallr.** — Boiss. Fl. or., I, p. 311.
Arm. transcauc.: Pass. infer. ad Ak-kilisse, n. 412 (leg. Minass.).
Nom. volg. sec. il racc. Minassian, *Ասորիկ*. *Ցեսմիկ* – pr. *assorik*, *hesmik*.
160. **Thlaspi arvense L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 323.
Arm. transcauc.: Artwin a Mesire Kekedgian, n. 413 (12 VII 1910, leg. Diratz!).

- Nom. volg. sec. diz. Katciuni Անանեխ վայրի - pr. mananekh raiři: nel lib. P. Menev. Շինկուսեմ - pr. shingodem: nel diz. Lusignan Ախոնա, Տափիկ, տափիկ - pr. akhuna, daplik, dapki.
161. **Aethionema cristatum DC.** — Boiss. Fl. or., I, p. 352.
Sir. bor.: Aintab, n. 86 (1906 leg. Khatchiad.).
Nom. volg. sec. Hai Pss. Եռար խոս, Եռարսակ, Աճխոս - pr. muar khod, nuardak, antzkhod.
162. **A. Buxbaumi** (Fisch. in Horn. sub *Thlaspide* Suppl. p. 71, a. 1819) DC. (1821) = *A. cappadocicum* Spreng. (1819); Boiss. Fl. or., I, p. 353.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 87 (10 VI 1907, leg. Asdurian!).
163. **Lepidium Draba L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 356.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 88a (6-16 VI 1907, leg. Asdurian!); Arm. centr. a Warto, n. 88b (1911 leg. Surmagh!); Sir. bor. ad Aintab, n. 88c (1906 leg. Khatchiad!).
164. **L. perfoliatum L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 362.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 89 (16 VI 1907, leg. Asdurian!).
165. **Euclidium syriacum** (L. sub *Anastatica*) R. Br. — Boiss. Fl. or., I, p. 368.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 90 (4 VI 1907, leg. Asdurian!) — Corrisponde a saggi di Huet de Pavillon «Fl. orient. exsicc.» raccolti nel 1853 presso Erzerum e conservati nell' Erb. Padovano.
166. **Isatis glauca Auch.** var. **collina** Boiss. in Bal. Pl. exsicc. 1856 et Fl., or., I, p. 378.
Arm. cilic. Elbistan, n. 91 (10 VI 1907, leg. Asdurian!).
Nom. volg. adoperato da P. Katciuni Լողաբոյս - pr. lrčiapuiss.

FUMARIACEAE

167. **Fumaria officinalis L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 134.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 94a (3 VI 1907, leg. Asdurian!) e Sir. bor. ad Aintab, n. 94b (1906, leg. Khatchiad.).
Nom. volg. sec. Hai Pss. Ասմու ողի - mamu olcil = pidocchio della nonna. Sec. P. Menev. Եփարյոս հասարակ - pr. tzkhapuiss hassarak, che è la traduzione del nome latino Fumaria. Nel diz. di P. Katciuni si legge Աչխոս - pr. antzkhod, անծխոս - pr. andzakhod, շահառակ - pr. shaharak, dal persiano ژاپرک - pr. shahtere.
168. **F. Vaillantii Lois.** — Boiss. Fl. or., I, p. 135.
Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak - kilisse, n. 414 (1908, leg. Minassian!).
Nom. volg. sec. il racc. B. Minassian Շահդարէ - pr. shahdaré.
169. **F. parviflora Lam.** — Boiss. Fl. or., p. 135.
Arm. centr.: dintorni di Musch, di Warto e di Erzerum, n. 95b; Arm. cilic. ad Elbistan, n. 95a (7 VI 1907, leg. Asdurian!) e Sir. bor. ad Aintab, n. 95c (1906, leg. Khatchiad.).
Nom. volg. sec. il racc. Surmaghian, Ճբճըթիկ - pr. dgengeghik: lo stesso dice che questa pianta è medicinale, febbrifuga.

PAPAVERACEAE

170. **Papaver Rhoeas L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 113.
 Comune in tutta l' Armenia e ne ricevemmo saggi da quella transcaucasica (Ak - kilisse), cilicina (dintorni di Zeitun), centrale (dintorni di Musch) e dalla Siria boreale (Aintab), n. 96. Nom. volg. sec. Hai Pss. Խաշխաշ վարի - pr. *Khashkhash rairi*, ed anche Պապոս - pr. *bablass*. Nel libro di Artignan Պակու մեր - pr. *bdgū mer*: nel distretto di Bardisag Կուգու - pr. *cucug*. di solito il volgo lo chiama anche Կակաչ - pr. *gagatce* = tulipa. Il raccoglitore B. Minassian lo designa Պուտ պուտ - pr. *bud bud*.
171. **P. macrostomum Boiss. et Huet.** — Boiss. Fl. or., I, p. 115.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 97 (3 VI 1907, leg. Asdurian!).
 Nom. volg. sec. P. Alishan Խաշխաշ երկայնքերան - pr. *khashkhash iergaiñperan*.
172. **P. somniferum L. var. glabrum Boiss.** — Fl. or., I, p. 116.
 Arm. pers.: Khoy, n. 98a (25-30 V 1907, leg. Der Minas.); Arm. transcauc.: Passen inf. ad Ak-kilisse, n. 98b (1908, leg. Minassian!). Nom. volg. sec. Hai Pss. Մեկոն - pr. *megan*, Խաշխաչ (քնարեր) - pr. *khashkhash (knaper)*, in turco աֆինն յիշյի. Nel diz. Katciuni. vedi Pavot Մեկոն քնարեր, պարսիզաց մեկոն - pr. *Megan knaper, bardisatz megon*.
173. **Römeria hybrida** (L. sub *Chelidonio*) DC. — Boiss. Fl. or., I, p. 118.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 99 (10 VI 1907, leg. Asdurian!).
174. **Glaucium leiocarpum Boiss.** — Boiss. Fl. or., I, p. 122.
 • Arm. transcauc.: lungo la strada carrozzabile tra Artwin ed Ardanoutch (10 VIII 1910, leg. Diratz.); Arm. cilic.: Zeitun sul Kabak-Tepé (1908 leg. Mergian!), n. 415.
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Եղլու խաշխաչ - pr. *dzorù khashkhash*, in fr. Pavot cornu. Il P. Katciuni nel suo diz. crea il nome Լրթախօծ - pr. *lrlakhod* per il nome generico *Glaucium*, e la sp. Pavot cornu, nomina Խաշխաչ եղլերաւոր կամ դեղին լրթախօծ - pr. *khashkhash ieghtciuravor o teghin lrlakhod*.

RANUNCULACEAE

175. **Clematis Vitalba L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 4.
 Ponto: Trebizonda, n. 100 (29 VII 1889, leg. Marimian!).
 Nom. volg. sec. il racc. Marimian, nel Ponto, Խիպիկ - pr. *Khibilik*. Sec. Hai Pss. Շիրխաս - pr. *shirkhass*, ed anche Հոսուս, Յասմիկ վայրի - pr. *hodod, hasmik rairi*. Nel lib. P. Menev. Պասաղիճ վայրի - pr. *badaghidge rairi*: e nel diz. del P. Katciuni, Հողմալարդ, պասղարդ - pr. *hoghamart, badrart*.
176. **Thalictrum elatum Murr.** — Boiss. Fl. or., I, p. 7.
 Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 101a (31 V 1907, leg. Minass.!) e dintorni di Artwin, n. 101b (7 VIII 1910, leg. Diratz.); Arm. centr.: distr. di Warto, n. 101c (1911, leg.

Surmagh.!) e Musch, n. 101d (Gindoian!). Saggi tutti privi di acheni e quindi da ulteriori studiare su materiale più completo. Nom. volg. sec. il racc. Minassian Աւասի սապօն - pr. *Ughdi sabon*. Sec. Der Minassian e Surmaghian Սանամաքի - pr. *ssanamaki*. Sec. Hai Pss. Գնձմնչուկ - pr. *ctzmnatzuk*; nel diz. Katciuni, in fr. Pigamon, in gr. Ηγγανον, in arm. Փեղենայ, սապապ - pr. *Pechena, ssadab* e nel diz. Lusignan Գունդաս - pr. *cuntad*.

177. **Anemone armena Boiss.** — Boiss. Fl. or., I, p. 10. — Cfr. **Tabula nostra II**, fig. 1-2.

Arm. transcauc.: Passen inf. ad Ak-kilisse (6 IV 1907, leg. Minass.!) e Sarikamish (15 IV 1907, leg. Sabund.!); Arm. centr.: ai piedi del monte Palandöken e nel M. Eyerli presso Erzerum, (1907, leg. Essayan!); Arm. pers.: a Khoy (1907, leg. Der Minassian!). Coll. n. 102. Corrisponde a saggi di Aucher-Eloy «Hb. d' Orient n. 4015» e di Huet du Pavillon «Pl. or. exsicc.» ambedue provenienti dai monti attorno ad Erzerum donde fu scoperta e descritta la specie. La quale studiata di confronto nell'Erb. centr. di Firenze con *A. albana* Ster. si rivela molto affine, tuttavia come apparece dalle schede, è tenuta specificamente distinta dall' *Hayek*, che ebbe di recente occasione di studiare il materiale Fiorentino.

Nom. volg. generico di Anemone sec. Hai Pss. Ամիր-իշխան կամ Ամիրաշխամ - pr. *amir-ishkhan* o *amirashkham*; Տաճ - pr. *dage*: I moderni lo chiamano Հարսնակ, Հողմածաղիկ - pr. *harsnug, hogh-madzagik*. Nel lib. del P. Menev., Անտառի պուա (Ճափկարուկ, պուակ կոտրուկ ծաղիկ) - pr. *andari bud* (*dzapgodrug, bdugk godrug dzaghik*), sec. il diz. Katciuni (vedi in fr. *anémone*) = Պուա. Փեննայ, Փենունայ, Դարունաճ, Խաչափայտ, ecc.

178. **A. narcissiflora L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 14.

Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 102 bis (15 V 1907, leg. Minass.); Arm. pers.: a Khoy, n. 102 ter (1907, leg. Der Minass.!).

Nom. volg. sec. il racc. Der Minassian Ճերմակ կեցուկ կամ խաճաղիկ - pr. *dgermag ketzung* o *kharadzagik*. sec. il racc. B. Minassian Ղազի ծաղիկ - pr. *ghasi dzaghik*.

179. **Adonis autumnalis L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 16.

Arm. centr.: Erzerum, n. 103 (15 VIII 1907, leg. Essayan!).

Nom. volg. nella Provincia di Van (sec. Artigan) Ամանկոտրուկ - pr. *amangodrug*; sec. il racc. Essayan, nel *vilayet* di Erzerum Ֆախ կոտրուկ, պառուկ կոտրուկ - pr. *dzap godrug, bdug godrud*, ed in turco Քան ավճը օգու - pr. *can arge otu* = erba sangue del cacciatore; sec. St. Shehrimian Ամրագոյն - pr. *adracuün*, in persiano Էդրէ կիւն - pr. *edrekün* = color di fuoco. Nello Hai Pss. vedi Վարդ-կոկոչ - pr. *rart-gagatch* = rosa-tulipa. I diz. moderni dicono anche Աղոնիս - pr. *atonis*. Nel diz. Katciuni, (per francese *adonis automnale* o *goutte-de-sang*), troviamo Աղոնիս աշնանային, կամ Շիթ արեւն, che sono le traduzioni dal fr. in armeno.

180. ? **A. parviflora Fisch.** in DC. — Boiss. Fl. or., I, p. 17.

Arm. centr.: Erzerum, n. 104 (21 V 1907, leg. Partam.). Da ulteriormente studiare su materiale più completo.

181. **A. aestivalis L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 17.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 105 (10 VI 1907, leg. Asdurian!). Ricorda specialmente la var. *miniatia* Jacq. (pr. sp.).
Nom. volg. sec. diz. Katciuni, Աղոնիս ամարային — pr. *atonis amaraian*, oppure dal fr. *oeil-de-perdrix*, Աչք կաքաւու — pr. *atcek gacaru*.
182. ? **A. eriocalyxina Boiss.** — Boiss. Fl. or., I, p. 17.
Arm. centr.: Erzerum, n. 106 (25 V 1908, leg. Partamian!). Frammento incompleto sul quale non è possibile dare giudizio definitivo. La specie, del resto, fu trovata nei dintorni di Erzerum (Huet.) e di Baibout (Bourg.).
183. **Ranunculus Ficaria L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 24.
Arm. centr.: distr. di Warto, n. 416 (1912, leg. Surmagh.).
Nom. volg. per il gen. Ranunculus sec. i moderni Խառածաղիկ — pr. *kharadzagik*: il P. Menev. traduce il nome gen. latino *Ranunculus*, in Գորտնուկ — pr. *cordnug*.
184. **R. illyricus L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 29.
Arm. centr.: distr. di Warto, n. 417 (1911, leg. c. s.).
Nom. volg. sec. il racc. Surmaghian Ցինց — pr. *tzinc*.
185. **R. palustris L.** ex Boiss. Fl. or., I, p. 37.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 107 (I VI 1907, leg. Asdurian!).
186. **R. Villarsii DC.** — Boiss. Fl. or., I, p. 40; Rehb. Ic. Fl. Germ. III, tav. XVIII dext.!
Arm. transcauc.: Artwin presso i villaggi Scheba, Mamatzminda super. e nell'altura di Golordo, n. 591 (VII 1910, leg. Diratz.). Pianta polimorfa (alcuni saggi molto si avvicinano all'affine *R. montanus* W. altri fanno passaggio a *R. brachylobus* Boiss. et Hoh.). Da ulteriormente studiare su ricco materiale di confronto, orientale-europeo.
187. **R. cassius Boiss.** in Ann. Sc. Nat., 1841, p. 354 et Fl. or., I, p. 48.
Arm. cilic.: Elbistan (30 V 1907, leg. Asdurian!) e Sir. bor.: Aintab (1906, leg. Khateiad.), n. 108.
Quanto al nom. volg. di *R. cassius*, come anche per *R. acris*, e simili, nello Hai Pss. troviamo Հարված, Հարվի խոս — pr. *halva*, *halri khod*; nella città di Musch chiamasi Ամի կոսրուս — pr. *auni godrudge* = rompi vaso; nel villaggio Arintch, presso Musch, viene chiamato Համբարձման ծաղիկ — pr. *Hampartzman dzaghik* = fior di Ascensione; nella prov. Kars e di Shirag si chiama Մայսի ծաղիկ — pr. *mäissi dzaghik* = fiore di Maggio; nella parte di Alasdan è detto Կարնան ծաղիկ — pr. *karnan dzaghik* = fiore di primavera; nel lib. di P. Menev. Պահան գորշ նուկ — pr. in fr. *tajan cordnug* che è tradotto dal latino, ecc.
188. **R. arvensis L. & typicus Boiss.** — Boiss. Fl. or., I, p. 57.
Arm. cilic.: Elbistan, (4 VI 1907, leg. Asdurian!) e arm. centr.: distr. di Warto, (1911, leg. Surmagh.), n. 109a.

- β **tuberculatus DC.** — Arm. cilic.: Elbistan c. s. e dintorni di Erzerum (3 VI 1907, leg. Partamian!), n. 109b.
189. **Caltha polypetala Hochst.** in Lorent. — Boiss. Fl. or., I, p. 59.
Arm. transc.: nel Passen inf. ad Ak-kilisse, (24 V 1907, leg. Minass.!) e dintorni di Erzerum (20 VIII 1907, leg. Essayan), n. 110.
190. **Nigella sativa L.** var. **hispidula Boiss.** — Boiss. in Ann. Sc. Nat., 1841 p. 360 = *N. sativa* L. β *brachyloba* Boiss. Fl. or., I, p. 68.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 111 (26 VI 1907, leg. Asdurian!).
Nom. volg. sec. Hai Pss. Արդղեղ - pr. arcentegh; Ուսնիս - pr. ssev ssonige, ecc.
191. ? **Delphinium olopetatum Boiss.** in Ann. Sc. Nat., 1841, p. 364 e Fl. or., I, p. 78.
Arm. centr.: monti attorno ad Erzerum, n. 112 (20 VII 1907, leg. Essayan!). Esemplare incompleto e quindi determinazione dubbia.
Nom. volg. sec. il lib. di Artignan, Փանի ծաղիկ - pr. tani dzaghiq = fiore di minestra; perche, dice l'A. gli abitanti di Van mischiano nella minestra; sec. P. Menev. Դեղփինոն - pr. teghpinion. I diz. moderni, traducendo il nome generico *Delphinium*, nominano Դլփնուկ - pr. tlpnag.
192. **D. orientale J. Gay.** — Boiss. Fl. or., I, p. 79.
Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse n. 113b (1907, leg. Minassian!); Arm. cilic.: Elbistan, n. 113a (13 VI 1908, leg. Asdur.!).
193. **D. glandulosum Boiss.** et **Huet** Diagn. II, 5, p. 11 et Boiss. Fl. or., I, p. 80.
Arm. centr.: distr. di Warto, n. 418 (1911, leg. Surmagh.).
Nom. volg. sec. il racc. Surmaghian Փաթիկ - pr. tatik.
194. **D. peregrinum L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 87.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 115 (2 VI 1907, leg. Asdurian!), e Zeittun Kabak-Tépé, n. 114 (23 VIII 1907, leg. Mergiand!): i primi da riferire al tipo, i secondi alla var. **eriocarpum** Boiss.
195. **Aconitum orientale Mill.** — Boiss. Fl. or., I, p. 95.
Arm. transcauc.: Artwin nei boschi di Salalet a c. 850 m., n. 590 (24 VII 1910, leg. Diratz!).
Nom. volg. sec. i diz. moderni Ընծախոս - pr. entzakhod.
196. **Paeonia corallina Retz.** — Boiss. Fl. or., I, p. 97.
Arm. transcauc.: Artwin nei boschi di Salalet, a c. 900 m., n. 578 (24 VII 1910, leg. Diratz!).
Nom. volg. de gen. *Paeonia* è Քաղցրաբ - pr. catcerart: nello Hai Pss. vedi Խաչափայտ - pr. khaciapaid ed altri sinonimi; per questa specie il P. Alishan adopera Ք. կարմրաբնկ կամ Ք. բուռպայխ - pr. c. garnirorag o c. possorain.

CAPPARIDACEAE

197. **Capparis spinosa L.** var. **sicula Duham.** (pr. sp.) — Boiss. Fl. or., I, p. 420 [sub: *C. spin. β canescens* Coss.]

Arm. transcauc.: Artwin sui muri presso Gorzul, n. 419 (12 VII 1910, leg. Diratz.).

Nom. volg. sec. Hai Pss. Կապար - pr. *gabbar*, ecc: numerosi sinonimi, vedi in fr. *ciprier*, nei diz. di P. Katciuni e Lusignan.

BERBERIDACEAE

198. **Berberis vulgaris** L. — Boiss. Fl. or., I, p. 102.

Arm. transcauc.: Sarikamish (3 VI 1907, leg. Sabund.) ed Arm. pers. a Khoy (19 V 1907, leg. Der Minass.), n. 116.

Nom. volg. sec. Hai. Pss. Եղբ (Հասարակ) - pr. *dzor* (*hassarag*), Կոժոխոր - pr. *gotzokhur*, ecc.; sec. i moderni Եղբնի - pr. *dzoreni*.

SAXIFRAGACEAE

199. **Saxifraga Cymbalaria** L. — Boiss. Fl. or., II, p. 811.

Ponto: Trebizonda sulle mura del convento di Prghitch, n. 117 (19 VIII 1889, leg. Marimian!).

Nom. volg. sec. il racc. Marimian e Hai Pss. Եղածաղիկ - pr. *dzngadzaghiq*; sec. i moderni Քարկոտրուկ - pr. *cargodrug*; nel diz. Lusignan Քարպեկ, Վրփրիճակ - pr. *carpeh*, *prprigiag*.

200. **Parnassia palustris** L. — Boiss. Fl. or., II, p. 814.

Arm. cilic.: sul Kabak - Tépé di Zeitun, n. 118 (24 VIII 1907, leg. Mergiand.).

Nom. volg. sec. il diz. Katciuni Պառնասիա - pr. *barnassia*; nel lib. del P. Menev. Մօրական լերտուկ? - pr. *moran lertug*.

CRASSULACEAE

201. **Sedum Sempervivum** Ledeb. — Boiss. Fl. or., II, p. 786.

Arm. cilic.: catena del Bingöl-Dagh, n. 420 (2 VII 1910, leg. N. Andrikian!). Corrisponde ad esemplari distrib. dal Kotschy nei n. 335, 340 dell'Iter cilic. in Tauri alpes «Bulgar-Dagh» conservati nell'Erb. Padovano.

Nom. volg. del gen. *Sedum*, sec. Hai Pss. e P. Menev. Կառնա-դակիկ - pr. *carnatmakik*, e della specie, in turco, sec. Kotschy, *Hasereti cschitsek*. (?)

202. **Umbilicus erectus** DC. — Boiss. Fl. or., II, p. 767.

Arm. cilic.: Zeitun sul Kabak-Tépé, n. 421 (1908, leg. Mergi.). Corrisponde agli esemplari del Tauro cilicico distribuiti dal Kotschy nell'«It. s. c. n. 93». (sub: *Umbellicus rectus* Huds.).

203. **Sempervivum globiferum** L. — Boiss. Fl. or., II, p. 797.


Arm. transcauc.: Artwin sulle rupi dell'altura detta Imara Tagara a c. 700 m. (30 VII 1910) e sui muri dell'antica fortezza armena di Ardanoutch (8 VIII 1910, leg. Diratz.), n. 592.

Nom. volg. sec. P. L. Alishan, nel suo Hai Pss. Կառնագմակ (Կնոսա-ձկ) - pr. *carnatmak* (*cndatzer*).

ROSACEAE

204. **Sorbus domestica L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 657.
 Ponto: Trebiz. presso Mala, n. 119 (25 VIII 1889, leg. Khushb.).
 Nom. volg. Ախ (պատմակ) — pr. ssin; Անձենի — pr. ssntzéni: in turco *kuqtıq* — pr. ürez: vedi Hai Pss. ՈՒԽ, p. 564. Sec. il racc. Khushbulian Յնծղի — pr. tzndzghi, in turco Ախս աղաճ?
205. **S. aucuparia L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 657.
 Arm. transcauc.: Artwin nei boschi di Salalet a c. 900 m., n. 589 (34 VII 1910, leg. Diratz.!).
 Nom. volg. Ոխ զայրի — pr. ssin raiři = sorbo selvatico.
206. **Pirus communis L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 653.
 Arm. transcauc.: lungo la strada carrozzabile tra Artwin ed Ardanoutch, n. 593 (10 VIII 1910, leg. Diratz.!).
 Nom. volg. Տանչի, անձենի — pr. dantzi, dantzeni.
207. **Malus communis Desf.** — Boiss. Fl. or., II, p. 656.
 Arm. transcauc.: nell' antica fortezza armena di Ardanoutch, n. 593 (8 VIII 1910, leg. Diratz.!).
 Nom. volg. Խնձորի, խնձորինի — pr. khntzori, khnzoreni.
208. **Crataegus orientalis Pall.** — Boiss. Fl. or., II, p. 660.
 Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 422 (1908, leg. Minass.). — Esemplari sterili, tuttavia confrontati con materiale conservato nell' Erb. Padovano ci sembrano corrispondere a questa specie.
 Nom. volg. del genere *Crataegus*, nell' Arm. centrale Մկնարիս — pr. mgnalodge, nel lib. di Agatangelo v' è Արափուշ — pr. ssrapush; sec. il racc. Minassian per *C. orientalis* Ալոս — pr. alodge. Nello Hai Pss. Կրկնենի — pr. grydeni.
209. **C. Azarolus L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 662.
 Arm. cilie.: Zeitun sul Kabak-Tep̄, n. 120 (24 VIII 1907, leg. Mergiand.).
210. **C. monogyna** (All. sub *Mespilo*) **Jacq.** — Boiss. Fl. or., II, p. 664.
 Ponto: Trebizonda, n. 121a (30 VII 1887, leg. Marimian!); Arm. pers.: Ardaz, n. 121b (20 IV 1907, leg. Der Minassian!), questi ultimi saggi riproducono la var. *hirsutior* Boiss.
 Nom. volg. sec. il racc. Der Minassian, Յոսն ալս — pr. tzran alogue; sec. il racc. Marimian Ժամու տանձ — pr. manu dantz.
211. **Cotoneaster pyracantha** (L. sub *Mespilo*) **Spach.** — Boiss. Fl. or., II, p. 665.
 Ponto: Trebizonda nel convento di S. Salvatore, n. 122 (30 VII 1889, leg. Marimian!).
 Nom. volg. sec. il racc. Marimian Յըսպոկի — pr. tzrbalki.
212. **C. nummularia** **F.** et **M.** — Boiss. Fl. or., II, p. 666.
 Arm. transcauc.: Artwin sulle mura della fortezza genovese sul fiume Tchorok e su quelli della fortezza armena di Ardanoutch n. 580 (10 VII 1910, leg. Diratz.!).

213. **Rosa lutea** Mill. — Boiss. Fl. or., II, p. 671.
Sir. bor.: Aintab, n. 123 (1906, leg. Khatchiad.!).
Nom. volg. Վարդ դեղին — pr. *vart teghin*.
214. **Rosa canina** L. var. **collina** (Jacq.) Boiss. — Boiss. Fl. or., II, p. 685.
Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 124 (25 V 1907, leg. Minassian!).
Nom. volg. sec. il racc. Minassian Վարդիկ վարդ, Մասրենի — pr. *vairi vart, massreni*.



Cotoneaster pyracantha (L.) Spach == Ցուպտկի.

215. **Spiraea Aruncus** L. — Boiss. Fl. or., II, p. 690.
Ponto: Trebizona presso il villaggio Mala, n. 125a (19 VIII 1889, leg. Khushb.!); Arm. centr.: dintorni di Gumgum, n. 125b (1908, leg. Surmagh.!)
Nom. volg. sec. il racc. Khshbulian Փիզուլ — pr. *pinciol*.
216. **Rubus nemorosus** Hayne. — Boiss. Fl. or., II, p. 692.
Ponto: Trebiz. presso Mala, n. 126 (10 VIII 1889, leg. Khushb.!)
Nom. volg. sec. il racc. Khshbul. Մաղոլ — pr. *maghol*; secondo altri Մորենի — pr. *moreni*.
217. **Potentilla geranioides** W. — Cfr. Nestl. Monogr. p. 25, tab. V, fig. 1.; Boiss. Fl. or., II, p. 721.
Arm. transcauc.: Sarikamish, n. 127 (22 V 1907, leg. Sabund.!).
Nom. volg. sec. il racc. Sabundgian Բթիկ — pr. *ptlik*.
218. **P. reptans** L. — Boiss. Fl. or., II, p. 723.

- Arm. transcauc.: Artwin nella fortezza e lungo la via di Ardanoutch (20 VII e VIII 1910, leg. Diratz!); Arm. centr.: presso Musch (1906, leg. Gindoyan!) ed Arm. cilic.: Zeitun sul Kabak-Tepé (20 VIII 1907, leg. Mergiand!), n. 128.
 Nom. volg. del genere *Potentilla* sec. Hai Pss. Աղպատ - pr. *aghbad*.
219. **Agrimonia Eupatoria L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 727.
 Arm. transcauc.: dintorni di Artwin (VII - VIII 1910, leg. Diratz!); Arm. centr.: distr. di Warto, (1911, leg. Surmagh!) ed Arm. cilicica: Zeitun sul Kabak-Tepé e Beryt - Dagh (22 VIII ed 8 IX 1908, leg. Mergiand!), n. 129.
 Nom. volg. sec. il racec. Surmaghian Խոսկիս - pr. *khosid*; sec. Shehrimanian Երիխնակ - pr. in fr. *ierijnak*.
220. **Alchemilla acutiloba Stev.** = *A. vulgaris* var. *major* Boiss. Fl. or., II, p. 729. S. Cfr. Handel-Mazzetti *Bot. Reis. in das Pont. Randgeb. im sandsch. Trapezunt* (1909), p. 166.
 Ponto: Trebiz. presso Mala, n. 130a (14 VII 1889, leg. Khushb.!); Arm. centr.: sul Beryth-Dagh, n. 130b (1908, leg. Mergian!); già nota per ambedue le località (cfr. Handel-Mazzetti e Boissier!).
 Nom. volg. sec. il dialetto del villaggio Mala Գէմլթաթ, (գայլթաթ) - pr. *kealtat* = zampa di orso.
221. **Poterium Sanguisorba L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 733.
 Comune in tutta l'Armenia: ricevemmo saggi dall'Arm. transcauc. (Artwin), Arm. turca centr. (Erzerum) e cilic. (Elbistan, Beryt-Dagh) (n. 131). Pianta ora quasi glabra (= *P. dictyocarpum* Spach), ora con minuta pubescenza (= var. *puberulum* DC.).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Ճիման, երևնակ - pr. *dgigiman, ieresnag*.
222. **Geum rivale L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 697.
 Arm. pers.: Khoy, n. 424 (1908, leg. Der Minassian!).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Բրաբիս՞ն - pr. *prapion*.

LEGUMINOSAE

223. **Argyrolobium calycinum** (M. B. sub *Cytiso*) **Jaub. et Spach.**
 — Boiss. Fl. or., II, p. 32.
 Ponto: Treb. presso Mala, n. 133 (24 VIII 1889, leg. Khushb.!).
 Nom. volg. nello Hai Pss. sec. i Trebizondotti Խփռուկ (արծաթպակ - pr. *khprug* (*ardzatpltag*)).
224. **Genista albida W.** var. **armeniaca** Spach. (pr. sp.). — Boiss. Fl. or., II, p. 42.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 134 (6 VI 1907, leg. Asdurian!).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Որոճ - pr. *orodge*.
225. **Ononis procurrens** **Wallr.** — Boiss. Fl. or., II, p. 56.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 135 (1 VI 1907, leg. Asdurian!).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. del gen. *Ononis*, Իշահոռն, եղնարզել - pr. *ishakhorn, iesnarkel*.

226. **O. antiquorum L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 57.
 Arm. centr.: distr. di Warto, n. 425 (1911, leg. Surmagh!).
 Nom. volg. sec. il racc. Surmaghian Օժիկ - pr. *otzhhi*.
227. **O. pubescens L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 62.
 Arm. cilic.; Zeitun sul Kabak-Tépé, n. 426 (1908, leg. Mergian!).
228. **Trigonella Foenum - græcum L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 57.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 136 (10 VI 1907, leg. Asdurian!). Corrisponde al n. 28 dell'«Iter cilic.-kurd., 1859» del Kotschy, dalla pianta europea si distacca un po' per le foglie più piccole ed il legume meno grosso, ma è da avvertire che in Armenia è pianta spontanea ed in Europa quasi sempre coltivata o sfuggita alla coltura.
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Հացհամեմ - pr. *hatzhamem*; nel diz. Karteuni vedi Fenugrec Հողու շաման; nel diz. Lusignan anche Բլթենի - pr. *plteni* ed in turco չուլկı - pr. *tcemen*.
229. **T. Kotschyi Fenzl** in Ky. Pl. cilic. exsicc. n. 163 (1836); — Boiss. Diagn. I, 9, p. 15 et Fl. or., I, p. 81. Cfr. **Tabula nostra** III, fig. 1.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 137 (1 e 16 VI 1907, leg. Asdurian!). Corrisponde ai saggi del Kotschy s. c. (M. Tauro) che uno di noi (Bög.) ebbe occasione di esaminare nell'Erb. centr. di Firenze, ed ai saggi del n. 1 pure di Ky. «It. cil.-kurd. 1859: Plantæ in monte Lokmanni ecc.» dell'Erb. Padovano non citati dal Boissier, nella cui «Fl. or., II, p. 87» è elencata, certo per una svista, una seconda *Tr. Kotschyi* caduta, sec. l'Index Kraussensis, in sinonimia.
230. **T. corniculata L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 83.
 Sir. bor.: Aintab, n. 138 (1906, leg. Khatchiad.).
231. **Medicago falcata L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 93.
 Arm. transcauc.: Artwin sui muri della fortezza (20 VII 1910, leg. Diratz!) ed Arm. cilic.: Elbistan (6 VI 1907, leg. Asdurian!) n. 139.
232. **M. sativa L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 94.
 Arm. cilic.: Elbistan, (6 VI 1907, leg. Asdurian!) ed Arm. centr. nei dintorni di Musch (1908, leg. Gindoian!), n. 140.
 Nom. volg. sec. Artignan Առուածակապյան - pr. *arrouid gabouid*; il racc. Gindoian di Musch scrive Արուած - pr. *arruid*.
233. **M. agrestis Ten.** — Boiss. Fl. or., II, p. 101.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 141 (4 VI 1907, leg. Asdurian!).
234. **M. lupulina L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 105.
 Arm. cilic. Elbistan, n. 142 (1 VI 1907, leg. Asdurian!).
235. **Melilotus officinalis Lam.** var. **armena Boiss.** — Boiss. Diagn. I, 9, p. 11 (pr. sp.) = *M. off. γ oxycarpa* Boiss. Fl. or., II, p. 109.
 Arm. transcauc.: Satrel nel Piccolo Caucaso (5 VI 1911, leg.

- Rostomian!), ed Arm. cilic.: Elbistan (10 VI 1907, leg. Asduran!), n. 143.
- Nom. volg. sec. Artignan **Մելիլորդ** — pr. *melilord*; nel diz. di N. Püzantakzi **Կորնգան**, **մեղրածուծ** — pr. *gorncan, meghradzudz*.
236. **Trifolium medium L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 114.
 — α **typicum**. — Arm. transcauc.: dintorni di Artwin e presso il villaggio Scheba, n. 144a (24 VII 1910, leg. Diratz!).
 — β **majus Boiss.** — Trebizonda presso Mala, n. 144b (18 VIII 1889, leg. Khushb.).
 Nom. volg. del genere Trifoglium sec. Artignan **Երեկնուկ** — pr. *iereknug*; nel Ponto sec. Khushb. **Խփռուկ** — pr. *khprvug*.
237. **T. pratense L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 115.
 Comune in tutta l'Armenia e noi ne ricevemmo e studiammo saggi dei dintorni di Trebizonda, Musch, Erzerum, Elbistan ecc. Coll. n. 145.
 Nom. volg. sec. il racc. Rostomian, in turco **Իչ բուլար օթու** — pr. *ütlç culak otu* = erba tre orecchi.
238. **T. arvense L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 120.
 Arm. transcauc.: Artwin nella fortezza e presso Scheba (20 VII 1910, leg. Diratz!) e Ponto presso Trebizonda (1907, leg. Shaban!), n. 427.
 Nom. volg. sec. il racc. Shaban. **Խնկածաղիկ ձերմակ** — pr. *khngadzaghiq dgermag*.
239. **T. Desvauxii Boiss. et Bal.** Diagn. ser. II, 2, p. 12 et Boiss. Fl. or., II, p. 123.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 146 (10 VI 1907, leg. Asduran!). I nostri saggi ricordano da vicino la var. *Russawanum* (Boiss.) *Boiss.*
240. **T. fragiferum L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 135.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 147 (20 VI 1907, leg. Asduran!).
241. **Trifolium resupinatum L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 137.
 Arm. centr.: dintorni di Erzerum (1908, leg. Partamian!) e distretto di Warto (1911, leg. Surmagh!), n. 428.
242. **T. repens L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 145.
 Arm. centr.: dintorni di Musch e distr. di Warto, n. 429 (1908 e 1911, leg. Gindoian et Surmagh!).
 Nom. volg. sec. il racc. Surmaghian **Երեկնուկ** — pr. *iereknug*; sec. Der Minassian **Երեք թերթիկ** — pr. *ierek tertik*, e nel Salmasid **Աստու խնձոր** — pr. *asdù khntzor*.
243. **T. aureum Poll.** — Boiss. Fl. or., II, p. 153.
 Arm. transcauc.: Mamanelis nel Picc. Cauc., n. 430 (12 VII 1911, leg. Rostomian!).
 Nom. volg. sec. il racc. Rostomian, in turco, **Իչ բուզար օթու** — pr. *iütlç culak otu*.
244. **T. agrarium L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 153.
 Ponto: dintorni di Trebizonda (1908, leg. Shab.) e presso il villaggio Mala (14 VII 1889, leg. Khoushb.), n. 148.
 Nom. volg. sec. il racc. Khushbulian **Խնկածաղիկ** — pr. *khngadzaghiq*.

THE
JOHN CERAR

59

245. **Dorycnium herbaceum** Vill. var. **intermedium** Led. (pr. sp.) — Boiss. Fl. or., II, p. 162 [*sub D. intermedium*].
Arm. transcauc.: Artwin presso Mesrè Kekedgian e Scheba, n. 431 (12 VII 1910, leg. Diratz.).
246. **Lotus corniculatus** L. — Boiss. Fl. or., II, p. 165.
— α **typicus**. — Arm. transcauc.: dintorni di Artwin (12 VII 1910, leg. Diratz.!) ed Arm. cilic.: Elbistan, (16 VI e 27 VII 1907, leg. Asdurian!), n. 149a.
— β **ciliatus** Koch. — Ponto: Grom, sulle pendici delle montagne Pontiche (1911, leg. Parghent.); Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse (1908, leg. Minassian!), n. 149b.
Nom. volg. del genere Lotus sec. il diz. Katciuni Արդիւն, լուսաս – pr. *nercün*, *ludass*; e della specie Ա. եղիքաւոր – pr. *n. ieghtceravor*, vedi *Lotier* anche nel diz. Lusignan := Քարառույս, in turco *paşlı boğazılık*; nel lib. di P. Menev. L. corn. = Եղիքաւույս (վայրի առույս): Nello Hai Pss. Ագուսի ճանկ: Հանդազուղ՝ վայրի առույսն է:
247. **L. tenuifolius** (L.) Rchb. — Boiss. Fl. or. II, p. 166.
Arm. transcauc.: dintorni di Artwin, n. 432 (1910, leg. Diratz.).
248. **Coronilla cappadocica** W. — Boiss. Fl. or., II, p. 180.
Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, (29 V 1907, leg. Minassian!); Arm. centr. distr. di Warto (1911, leg. Surmagh.!) ed Arm. cilic.: ad Elbistan (4 VI 1907, leg. Asdurian!) e sul Kabak-Tépé (1908, leg. Mergiand.).
249. **C. varia** L. — Boiss. Fl. or., II, p. 181.
Comune in tutta l'Armenia: ne ricevemmo saggi di Artwin (Diratz.!), di Shavshet (1911, leg. Rost.!), di Musch (Gindoian.!) e Elbistan (Asdurian.!), n. 151.
Nom. volg. sec. il lib. di P. Menev. Քարառույս երինագոյն – pr. *cararroid* *icerpnacuin*; il P. Katciuni nel suo diz. mette Պակուկ – *bsagug* che è la trad. dal nome gen. latino.
250. **Astragalus densifolius** Lam. — Boiss. Fl. or., II, p. 244.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 152 (6 VI 1907, leg. Asdurian!).
Nom. volg. di questo genere secondo la verifica dell' Artignan è Կազ – pr. *cas*, per la gomma adragante si dice Գազի խեժ – pr. fr. *casi kheje*; in turco Փիրս – pr. *kitra*: i kurdi adoperano specie di questo genere per facilitare la combustione del loro focolare detto *tandir*.
251. **A. Lamarckii** Boiss. — Boiss. Diagn. ser. I, 9. p. 82 et Fl. or., II, p. 355. Cfr. De Candol, *Astragal.*, tab. 32, fig. 2.
Ponto: Grom sulle pendici delle montagne Pontiche, n. 433a (1908, leg. Parghent.); Arm. cilic.: sul Kabak - Tépé, n. 433b (1908, leg. Mergiand.).
252. **A. cucullaris** Boiss. — Boiss. Diagn. ser. I, 6, p. 30 et Fl. or., II, p. 413.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 434 (6-10 VI 1907, leg. Asdurian!).
253. **A. fragrans** W. — Boiss. Fl. or., II, p. 450.

ՀԱՅ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿ

ՎՐԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԻՃԱԿ
60. Արևածագը և այլ պատճենները

Արևածագը: transcauc.: Passen infer. a Sarikamish, n. 153 (1908, leg. Saltingian!).

Nom. volg. sec. il racc. Sabundgian Հօսղու պարկ (?) - pr. *hodghù barg*.

254. **Ebenus laguroides Boiss.** — Boiss. Diagn. ser. I, 2, p. 99 (1842) = *E. Montbretii* Jaub. et Spach in Ann. Sc. Nat., XIX (1843), p. 154 et Ill. pl. or. tab. 250. Cfr. Boiss. Fl. or., II, p. 556 [*sub E. Montbretii*] et Ky. It. cilic. - kurd. 1859, n. 223 [*sub E. laguroides*].

Արմ. cilic.: Elbistan, n. 154 (6 VI 1907, leg. Asdurian!).

Nom. volg. sec. Hai Pss. Հաւամբղի - pr. *haramrki*. Փիւրակ - pr. fr. *Jülab*: supposto l'*Eb. laguroides* sinonimo a *Cytisus Laburnum*, il nom. volg. sec. il lib. del P. Meneviscian è Ալպեան ոլոր, (ժիւրաւպ?) - pr. *albian olor*; nel diz. del P. Katiciuni vedi *Cytise* ալպեան, Ալպուախունկ. ecc.

255. **Cicer pinnatifidum Jaub. et Spach.** = *Cicer judaicum* Boiss. Diagn. I, 9, p. 130 (forma *foliis minus incisis*); Boiss. Fl. or., II, p. 561 [*sub C. pinnatifido*].

Արմ. cilic.: Elbistan (10 VI 1907, leg. Asdurian!) e sul Beryt-Dagh (1908, leg. Mergian!), n. 156.

256. **C. arietinum L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 560.

Արմ. cilic.: Elbistan, n. 435 (26 VII 1907, leg. Asdurian!).

Nom. volg. di questo gen. è Ոխենն - pr. *sissern*; per la sp. *C. ariet.* sec. P. Menev. Բուն սխեն - pr. *pun sisser*; il racc. Asdurian, in turco Կոխուն - pr. *nokhud*.

257. **Vicia Faba L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 578, obs.

Արմ. cilic.: Elbistan, n. 117 (5 VI 1907, leg. c. s. !): certamente si tratta di pianta coltivata.

Nom. volg. in generale si dice Բակլա - pr. *pagla*.

258. **V. narbonensis L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 577.

Արմ. cilic.: Elbistan, n. 155 (6 VI e 26 VII 1907, leg. c. s. !).

259. ? **V. hircanica Fisch et Mey.** — Boiss. Fl. or., II, p. 571.

Արմ. cilic.: Elbistan, n. 158 (10 VI 1907, leg. c. s. !). — Frammento in frutto e quindi determinazione dubbiosa!

260. **V. tenuifolia Roth.** — Boiss. Fl. or., II, p. 886.

— *subsp. variabilis* (Freyn et Sint. in Oest. bot. Zeitschr., XLII, p. 82 ed in Bull. Herb. Boiss. 2a ser., III, p. 190-193) **Bég.** et **Diratz.** n. comb. var. **parviflora** Freyn et Sint. in op. c. — Արմ. cilic.: Elbistan, n. 159 (2 VI 1907, leg. Asdurian!). Per il polimorfismo di questa specie, scissa da Freyn e Sintenis in 4 specie e cioè, oltre la citata, *V. Boissieri* (= *V. tenuifolia* Boiss. Fl. or.), *V. elegans* Guss. (vedremo nell'Erb. Padovano saggi distribuiti dal Kotschy nei n. 5 e 71 rispettivamente dell' «It. syr. 1855» e delle «Pl. syr. bor. ex Amano pr. Beilan» e nel 915 delle «Pl. Cypro 1862») e *V. stenophylla* Vel. (= *V. tenuifolia* Roth β *stenocephala* Boiss. p. p.) si vedano i due ricordati lavori di Freyn e Sintenis, qui avvertendo che per noi non

rappresentano che sottospecie di un unico tipo proteiforme.
Nom. volg. del gen. *Vicia*, sec. Hai Pss. Վիշն, Խոլորչ - pr. *vishn*, *kholorts*; nel diz. Katciuni in fr. *vesce* = Վիշն, Արմիճ - pr. *vign*, *ardige*, ecc.; il racc. Asdurian scrive, in turco Տիշտը յիշի(?) - pr. *derder cicci* = fior di prete.

261. **V. hirsuta** (L. sub *Ervo*) Gray var. **Terronei** Burn. Fl. Alp. Mar., II, p. 188.
Arm. cilic.: Elbistan n. 160 (16 VI 1907, leg. c. s.!).
Nom. volg. sec. il racc. Asdurian, in turco Տաղ հօխուսն - pr. *dagh nokhdu*.
262. **V. disperma** DC. = *V. parviflora* Lois., non Cav. nec Michx. Arm. centr.: dintorni di Gumgum, n. 436 (1908, leg. Surmagh!).
263. **V. orientalis** (Boiss. sub *Ervo*) Bég. et Diratz. n. comb.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 161 (6 VI 1907, leg. Asdurian!). Boissier (Diagn., ser. I, 9, p. 115) ha descritto questa entità nel genere *Errum* e la combinazione fu mantenuta nella «Fl. or., II, p. 598» e da qualche altro autore: non ci consta sia stata mai trasportata nel gen. *Vicia*.
264. **Lathyrus Aphaca** L. — Boiss. Fl. or., II, p. 602.
Arm. pers.: dint. di Khoy, n. 162 (27 IV 1907, leg. Der Minass.).
Nom. volg. del gen. sec. Hai Pss. Ճուլպան - pr. *dgiulban*; nel diz. Lusignan, in fr. *gesse*, in arm. Խորու, մահդանակ, ճուլպան; nel diz. Katciuni, Քաեկան - pr. *kregan*; e nel lib. di P. Menev. Քիսամ(?) - pr. *kissam*.
265. **L. tuberosus** L. — Boiss. Fl. or., II, p. 611.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 438 (26 VII 1907, leg. Asdurian!).
Nom. volg. sec. Hai Pss. Կասուի ճանկ(?) - pr. *gadui giang* = uncino di gatto.
266. **L. sphæricus** Retz. — Boiss. Fl. or., II, p. 613.
Arm. centr.: dintorni di Musch, n. 437 (1908, leg. Gindoian!).
267. **Pisum sativum** L. — Boiss. Fl. or., II, p. 622.
Arm. cilic.: Elbistan (leg. c. s.!) ed Arm. centr. distr. di Warto (leg. Surmagh!), n. 163.
Nom. volg. di questo gen. è Ուռոն, Մաշ - pr. *olorn*, *mash*; sec. il racc. Surmaghian Յունս բկղիւս(?)
268. **P. elatius** M. B. — Boiss. Fl. or., II, p. 623.
Arm. centr.: distr. di Warto, n. 439 (1911, leg. Surmagh!).
Nom. volg. sec. il racc. Surmaghian, nella Prov. di Musch Մաշ - pr. *mash*, e sec. lui stesso = զայրի պէղէլիս - pr. *rairi baselia*.
269. **Glycyrrhiza glabra** L. var. **glandulifera** (Rg. et Herd.) Boiss. Fl. or., II, p. 202; S. et Sm. Fl. Græc. tab. 709.
Arm. centr.: distr. di Warto, n. 440 (1911, leg. Surmaghian!).
Nom. volg. sec. il raccoglitore, Մարոխի կամ սուսում մասուսակ - pr. *marokh* o *sud madudak*.
270. **Albizzia Julibrissin** Durazz. — Boiss. Fl. or., II, p. 639.
Ponto: dintorni di Trebisonda, n. 441 (1908, leg. Shabanian!), spontanea?

ՀԱՅԻ ԲՈՒԺ
62
ԲԱՐՁՐԾԱՀԱՆ
ՎԻՃԱԳԱԼ

MYRTACEAE

271. **Punica Granatum L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 737.

Ponto: dintorni di Trebisonda, n. 164a (30 VI 1907, leg. Shaban!); Arm. transcauc.: Artwin a Gorzul, n. 164b (12 VII 1910, leg. Diratz!).

Nom. volg. Կոռն - pr. *nurn*, Կոռնենի - pr. *nrneni*.

LYTHRACEAE

272. **Lythrum Salicaria L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 738.

— α **typicum**. — Arm. celic.: Elbistan, 165a (26 VII 1907, leg. Asdurian!).

— β **intermedium** (Ledeb.) Koehne = *L. intermedium* Ledeb. Ind. Horti Dorp., 1822 et ap. Turez. in Bull. Soc. Nat. Moscov., 1838, p. 92 = *L. Salicaria* γ *glaberrimum* Boeckl. in Oesterr. bot. Wochenschr., 1853, p. 405 = ? *L. Salicaria* var. *syriaca* Boiss. et Gaill. Diagn. pl. nov. or. 2a ser. VI (1859), p. 23 et Boiss. Fl. or., II, p. 738. Cfr. Koehne *Lythraceae* in Engler's « Pflanzenreich », IV, 216. Leipzig, 1903, p. 36. — Arm. centr.: distr. di Warto, n. 165a (1911, leg. Surmagh!); Arm. transcauc.: Mamanelis nel Picc. Cauc. n. 165b (IX 1911, leg. Rostomian!).

Nom. volg. adoperato dal P. Katciuni nel suo diz. Արենածաղկ - pr. *arenadzagik*, vedi in fr. *salicaire*, v. II, 553. Sec. il racc. Rostomian Ջրի ծաղկ - pr. *tceri dzagik* = fiore acquatico.

ONAGRARIACEAE

273. **Epilobium angustifolium L.** (s. lat.). — Boiss. Fl. or. II, p. 745 [*sub E. spicato*].

Ponto: Grom sulle pendici delle montagne pontiche (1911, leg. Parghent!); Arm. transcauc.: Artwin nei boschi di Salalet (24 VII 1910, leg. Diratz!), n. 443.

Nom. volg. sec. Hai Pss. Ապուզան (նեղստրկի) - pr. *abusan*; nel diz. Katciuni vidi *onagre* (derivato dal ծոց էլ ձշբա որս) Իշախոդ - pr. *ishakhod*; nel diz. Lusignan anche ցիր, ցոխոս - pr. *tzir*, *tzrkhod*.

274. **E. Dodonaei Vill. var. brevifolium** Kohl. in Rehb. Ic. Germ. XXIII, p. 5.

Arm. transcauc.: Mamanelis nel Piccolo Caucaso, n. 444 (3 IX 1910, leg. Rostom.).

Nom. volg. sec. il racc. Rostomian in turco Կարափիլ յիշեյ - pr. *garapil cicei* = fiore di garofano.

275. **E. hirsutum L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 746.

— α **typicum**. — Arm. centr.: distr. di Warto (1911, leg. Surmagh!) ed Erzerum (1908, leg. Essayan!), n. 444a.

— β **tomentosum** (*Vent.*) Boiss. — (pr. sp.). — Arm. transcauc.: dintorni di Artwin (29 VII 1910, leg. Diratz!), Arm. celic.: Zeitun sul Beryt-Dagh (1908 leg. Mergiand!), n. 444b.

276. **E. parviflorum Schreb.** — Boiss. Fl. or., II, p. 746.
Arm. transcauc.: Artwin, n. 445 (24 VII 1910, leg. Diratz.!).
277. **E. tetragonum L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 748.
Arm. pers.: Khoy, n. 446 (1908, leg. Der Minassian!).

UMBELLIFERAE

278. **Astrantia helleborifolia Salisb.** — Boiss. Fl. or., II, p. 831; Bot. Mag. tab. 1553 (*sub A. maxima*).
Arm. transcauc.: campi coltivati nelle alteure sopra Artwin a circa 700 m., n. 582 (24 VII 1910, leg. Diratz.!).
Nom. volg. della genere dal P. Katciuni è adoperato Աստրանս; — pr. *astrand*, e nel lib. di Menev. troviamo Աստրանց, mentre nel diz. Lusignan vedi Astrance, Աստրանչ — pr. *asdghakhod* — erba di stella.
279. **Sanicula europaea L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 832.
• Arm. transcauc.: dintorni di Artwin e di Scheba, n. 585 (20 e 27 VII 1910, leg. Diratz.!).
Nom. volg. sec. Hai Pss. Պանակուլ (?) — pr. *badarodug*. Il P. Katciuni nel suo diz. adopera in fr. *sanicle*, in arm. Բուժախոն — pr. fr. *pugeakhod* = erba sanatoria.
280. **Bupleurum croceum Fenzl.** — Boiss. Fl. or., II, p. 836.
Arm. cilic.: Elbistan, (4 VI 1907, leg. Asdurian) e Siria bor. ad Aintab (1906 leg. Khaticiad.!), n. 166.
Nom. volg. del gen. adoperato nel diz. Katciuni Կողախոն — pr. *gorakhod*, anche Եղնակող, vedi Buplèvre, dal gr. Βούς *hqō* e πλευρόν *kn̄*:
281. **B. brachyatum C. Koch** ap. Boiss. Fl. or., II, p. 844. Cfr. **Tabula nostra** III, fig. 2-3.
Arm. transcauc.: Artwin presso Gorzul, n. 447 (12 VII 1910, leg. Diratz.!). — Di questa interessante e poco nota specie non avemmo occasione di vedere saggi, né nell' Erb. Padovano, né in quello Centrale Fiorentino. Essa è interpretato dal Koch e Boissier in senso molto stretto e come tale non corrisponde per tutti i caratteri alla pianta di Artwin. Ma la diagnosi redattane dal Wolf (*Umbelliferæ Apioideæ-Bupleurum* etc. in Engler's «Pflanzenreich» IV, 228. Leipzig, 1910, p. 104), che certamente ebbe sott' occhio materiale più abbondante, ha parecchio allargato i limiti della fluttuazione della specie (foglioline dell' involucro 2-5, quelle degli involucelli angustamente lanceolate o linear-lanceolate, insensibilmente acuminate, più di rado lanceolato-ovate, ottuse, bruscamente acuminate, submucronate ecc.) e vi rientra quindi anche la nostra pianta. La quale è caratterizzata per le foglioline dell' involucro in numero di 2-3 e per quelle dell' involucello largamente lanceolate, subellittiche, insensibilmente acuminate, con margini un po' scariosi e minutamente serrulate, trinervie, con nervi abbastanza evidenti. È certo pianta annua!

282. **Apium nodiflorum** (L. sub *Sio*) Rchb. — Boiss. Fl. or., II, p. [sub *Helosciadio*].
Arm. cilic.: Elbistan, n. 167 (6 VI 1907, leg. Asdurian!).
Nom. volg. del gen. sec. Hai Pss. Լախուր? — pr. *lakhur*: nel lib. P. Menev. anche Կարսս — pr. *gaross*, vedi nel diz. Katciuni *céleri*, anche Գերիս, in turco Գլուզիզ — pr. *kereris*.
283. **Pimpinella saxifraga** L. — Boiss. F. or., II, p. 873.
Arm. transcauc.: Passen inf. ad Ak-kilisse, n. 448 (1908, leg. Minassian!).
Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Ուղ? — pr. *ses*; vedi nel diz. Katciuni in fr. *Boucage*, Քաղկանուն — pr. *kaghkhod*; sec. il racc. Minassian Անիսոն — pr. *anisson*.
284. **Grammosciadium daucoides** DC. Mem. Umb. p. 62, tab. 2, fig. K, Boiss. Fl. or., II, p. 899; Ky. It. cil.-kurd. n. 142 [sub *G. scabrido!*].
Arm. cilic.: Elbistan, n. 168 (3 VI 1907, leg. Asdurian!).
285. **Chærophylloides temulum** L. — Boiss. Fl. or., II, p. 903.
Arm. transcauc.: Artwin, Mesire Kekedgian e nel luogo detto Ovaintz mesire, n. 449 (12 e 24 VII 1910, leg. Diratz.).
Nom. volg. del genere vidi solo nel diz. Lusignan, Բերկաստերե — pr. *pergraderer*, in fr. *chèrophylloides*.
286. **Bifora radians** M. B. — Boiss. Fl. or., II, p. 922.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 169 (30 V 1907, leg. Asdurian!).
Nom. volg. del genere vidi solo nel diz. Lusignan, Երգծաղ — pr. *iergdzag*, in fr. *bifore*.
287. **Conium maculatum** L. — Boiss. Fl. or., II, p. 922.
Sir. bor.: Aintab n. 170 (1906, leg. Khatchiad.).
Nom. volg. del gen. Conium sec. lo Hai Pss. Խնդակոթ, մողեխինդ, Հնդ. — pr. *khndagot*, *molekhint*, ecc. La specie nell' Armenia russa è detta Պլանուկ — pr. *blanug*, in fr. *Grande cigne*, sec. diz. Katciuni, Մնծ մողախինդ, որ է բում մողախինդ:
288. **Prangos lophoptera** Boiss. in Ann. Sc. Nat., 1844, p. 354 et Fl. or., II, p. 941.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 171 (2 VI 1907, leg. Asdurian!).
Nom. volg. sec. il diz. Lusignan, Պոխի — pr. *bokhi*; P. Katciuni adopera Պրանգ — pr. *brank*; il racc. Asdurian in turco Փկյուկիր? — pr. *keipenir*.
289. **Foeniculum vulgare** Mill. — Boiss. Fl. or., II, p. 975.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 172 (25 V 1907, leg. c. s.).
Nom. volg. sec. Hai Pss. Հոռոմ սամիթ — pr. *horom samit*, Բաշղան — pr. *rasian*, in turco բկղղան — pr. *resene*, in francese *fennouil*, in it. finocchio: vedi diz. Katciuni vol. I, p. 846.
290. **Tordylium officinale** L. — Boiss. Fl. or., II, p. 1033.
Sir. bor.: Aintab, n. 173 (1906, leg. Khatchiad.).
Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Սնդիք? — pr. *sntri*; nel diz. Katciuni, in fr. *tordyle*, Շակակուլ, բող կրետեայ — pr. *shagagul*, *pogh gredia*.

291. ? **Heracleum sibiricum L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 1046.
 Ponto: Trebiz.: presso Mala, n. 174 (16 VII 1889, leg. Khushb.).
 Saggio incompleto e quindi determinazione dubbia.
 Nom. volg. sec. il racc. Khushb. e lo Hai Pss. Աղցուկ - pr. *gotzug*; od anche Բերիսչ - pr. *terkhash*, in fr. *berce*; nel diz. Katciuni, è adoperato Աղանթ վայրի - pr. *agant rai'i*.
292. **Daucus Carota L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 1076.
 Arm. transcauc.: Artwin a Gorzul, n. 448 (12 VII 1910, leg. Diratz!).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. (Վայրի տեսակը) Գաղպար - pr. *casar*, (բարձի տեսակը) Սաեպին - pr. *sdebghin*, in turco հաղուզ - pr. *harrudge*, in fr. *carotte*.
293. **Torilis leptophylla L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 1084 [*sub Cancalide*].
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 175 (10 VI 1907, leg. Asdurian!).
 Nom. volg. sec. il diz. Katciuni Շիմար - pr. *shimar*.
294. **Turgenia latifolia** (L. *sub Tordylio*) Hoffm. — Boiss. Fl. or., II, p. 1087.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 176-77 (1, 8 e 16 VI 1907, leg. c. s.!) ed Arm. transc.: a Satel nel Piccolo Cauc. (27 VIII 1910, leg. Rostom!), n. 176.
 Nom. volg. dialettico sec. il racc. Rostomian Խոզանակ - pr. *khosanag* = spazzolino.
295. **Lisaea heterocarpa** (DC. *sub Turgenia*) Boiss. — Boiss. Fl. or., II, p. 1088.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 178 (16 VI 1907, leg. Asdurian!).
296. **L. syriaca** Boiss. — in Ann. Sc. Nat. 1844, p. 55 et Fl. or., II, p. 1088.
 Arm. cilic.: Elbistan; (11 VI 1907, leg. Asdurian!); Siria bor.: Aintab (1906, leg. Kathciad.), n. 179.
297. **Eryngium campestre** L. — Boiss. Fl. or., II, p. 824.
 Arm. transcauc.: Artwin a Mesire Kekedgian, n. 449 (12 VII 1910, leg. Diratz!).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. ed altri Երևանկ - pr. *ierneinag*, in turco گلکلپک - pr. *kenghere*, in fr. *panicant*.

RHAMNACEAE

298. **Paliurus Spina-Cristi** Mill. — Boiss. Fl. or., II, p. 13 [*sub Zizypho*].
 Sir. bor.: Aintab, n. 180a (1906, leg. Khatchiad.) ed Arm. transcauc.: Artwin a Gorzul, n. 180b (12 VII 1910, leg. Diratz!).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Նաբխ - pr. *nabkh*, Քունար - pr. *cumar*; nel diz. Katciuni alla voce *Palme* Ժանափուշ - pr. fr. *jandapuché*; in quello di Lusignan, anche շապահ - pr. *shabah*.
299. **Rhamnus libanotica** Boiss. — Boiss. Diagn. I, 2, p. 119 et Fl. or., II, p. 19.

Arm. transcauc.: Artwin dal bosco di Salalet, alt. 850 m., n. 450 (VIII 1910, leg. Diratz.!). — Confrontato con il n. 59 di Kotschy « It. syr. 1855. Circa Zebdaine pr. Damascum », la nostra pianta ne differisce per le foglie più ampie, nel resto coincide.

Nom. volg. del gen. Rhamnus, sec. Hai Pss. Դժնիկ - pr. fr. *tjnik*. sec. il diz. Katciuni, anche Ժողուրենի - pr. fr. *jeoghoureni*; in turco *aq uhpkli* - pr. *ak diken*.

300. **Rh. Frangula L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 21.
Ponto: dintorni di Trebisonda, n. 181 (10 VII 1907, leg. Shaban!).
Nom. volg. sec. i diz. Katciuni e Lusignan (in fr. *bourdaine*), **Փոկուռի** - pr. *poguri*; nel libro di Menev. **Բեկսենի** - pr. *pekdeni*.

AMPELIDACEAE

301. **Vitis vinifera L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 955.
Arm. cilic.: Kabak - Tepé presso Zeitun, n. 182 (20 VIII 1907, leg. Mergiand.).
Nom. volg. Որթ - pr. *rort*, Որթասունկ - pr. *vortladung*, Խաղողենի - pr. *khaghogheni*, in turco Ասմա - pr. *asma*. Sec. il mittente Asdurian Վարդի խաղող - pr. *varri khaghogh*, in turco Եազանի բերրեր հրզիւլիւ:

CELASTRACEAE

302. **Evonymus latifolius** (L. sub *E. europæo* β *latifolio*) Mill. — Boiss. Fl. or., II, p. 10.
Arm. transcauc.: distr. Shavshett nel Piccolo Caucaso, n. 451 (1910, leg. Rostom.).
Nom. volg. sec. il diz. Katciuni ed altri Իլենի - pr. *ileni*, in turco *iy aqmađ*, *qawâlîp kârpaq* - pr. *iy aghadge, carne jarek*.

SAPINDACEAE

303. **Acer campestre L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 948.
Arm. cilic.: Kabak-Tepé presso Zeitun, n. 183 (23 VIII 1907, leg. Mergian!).
Nom. volg. del genere Acer Թղիկ, o Տկիկ, anche Բիծղի - pr. *tghghi*, *dghki*, *pidzghi*, ecc. e della specie nel diz. Katciuni Ոփի - pr. *opi*. Vedi pure in questo diz. Erable = Յուկ - pr. *tzakh*, in turco *aklimkuvali aqmađ* - pr. *sendeban aghadge*.
304. **A. platanoides L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 949.
Ponto: Trebis. presso Mala, n. 184 (7 VII 1889, leg. Khushb.).
Nom. volg. dei contadini di Mala, sec. il racc. Khushbulian Կառ թլնուրերի - pr. *galnderepi*; nello Hai Pss. Կառթնուրերի, (*Տկիկ Յուկիկը*) - pr. *galndereri* = foglia-lattifera, nel Ponto si chiama in turco Ոց աղած - pr. *ac aghadge*.

305. **Staphylea pinnata L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 953.
 Ponto: Trebiz. presso Mala, n. 185 (19 VIII 1889, leg. c. s.).
 Nom. volg. sec. il racc. Khushbulian կրոնի - pr. *groni*; nello Hai Pss. anche խաղողածառ - pr. *khaghoghadzav* = albero di uva.

ANACARDIACEAE

306. **Rhus Cotinus L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 4.
 Arm. transeauc.: distr. Shavshett nel Piec. Caucaso (1907, leg. Rostom!). e Sir. bor.: ad Aintab (1906 leg. Khatciad.), n. 186.
 Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. ed altri, Աղմոր - pr. *aghmor*, in turco սօմազ - pr. *somac*; il racc. Rostom per questa specie scrive Կապուշ - pr. *gabrush*; nel diz. Kateuni vedi in fr. *Fustet* = Սպարակ - pr. *ssbarag*, in turco սարը աղած, զերտելօփ - pr. *sari aghadge*, *zerdeceop*.
 307. **Rh. Coriaria L.** — Boiss. Fl. or., II, p. 4.
 Arm. transeauc.: Artwin sui muri della fortezza, n. 452 (20 VII 1910, leg. Diratz!).
 Nom. volg. sec. il diz. Kateuni alla voce *sumac di corravewr*, Աղմոր կաչկործաց:

POLYGALACEAE

308. **Polygala anatolica Boiss.** et **Heldr.** Diagn. II, 2, p. 57 et Boiss. Fl. or., I, p. 474.
 Arm. transeauc.: Passen inf. ad Ak-kilisse, n. 187 (29 V 1907, leg. Minass.).
 Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. ed altri è կոթնիսս - pr. *gatkhoed* = erba-latte, իշգալնուկ - pr. *ishgatnug* = latte di asino
 309. **P. vulgaris L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 476.
 Sir. bor.: Aintab, n. 188 (1906, leg. Khatciad.).
 Nom. volg. sec. il diz. Kateuni (vedi *Iolyyale*) իշգալնուկ հասրակ, կաթնածսս - pr. *ishgatnug hassarag*, *gatkhoedzav*.

GERANIACEAE

310. **Geranium cinereum Cav.** var. **subacutum Bég.** et **Diratz.**
 n. comb. = *G. subcaulescens* L'Hér. β *subacutum* Boiss. Fl. or., I, p. 872. — Cfr. **Tabula nostra** IV, fig. 5-6.
 Arm. cilic.: Zeitun nel Beryt - Dagh, n. 189 (3 VII 1907, leg. Mergiand.). Nell'interpretazione della specie di Cavanilles ci siamo attenuti alla Fl. It. II, p. 238 che abbiamo avuto occasione di confrontare la pianta dei Pirenei e dell'Italia con quella della Grecia, Asia Minore ed Armenia dichiarandole simili. Tutto al più delle variazioni a cui va incontro si potranno fare delle razze geografiche, una delle quali è quella da noi studiata.
 Nom. volg. del genere, sec. i moderni, è Խորենի - pr. *khorteni*

in turco **Qırıplı** – pr. *eter*. Il P. L. Alishan, nel suo Hai Pss. preferisce **Մլմլուկ** – pr. *mlmlug*, che i trebizondiotti (sec. Khuchb). adoperano per *G. gracile*. Nel diz. Katciuni troviamo in fr. *Géaine*, *Géranion* in lat. *Geranium*, derivato dal greco γέρανος **ինորդ** gru, per il frutto somigliante al becco di questo uccello; volgarmente i francesi chiamano *Bec-de-grue* = **կոճոց ինորդի կամ ինորդի բեռք**, nel detto diz. v'è anche **Աղարնեցներ** – pr. *agharnegdntz* = becco di piccione; di più nel diz. Lusignan è nominato **Քարտիկ** – pr. *cardik*.

311. **G. tuberosum L. & genuinum Boiss.** — Boiss. Fl. or., I, p. 873. Sir. bor.: Aintab, n. 190 (1906, leg. Khateiad!). Nom. volg. sec. P. L. Alishan, in Hai Pss. **Մլմլուկ կոճղիզաւոր** – pr. *mlmlug gogeghisaror*.
312. **G. gracile Ledeb.** var. **trilobum Koch.** in Linnaea XV, p. 716; Boiss. Fl. or., I, p. 875. Ponto: Trebizonda presso il villaggio Mala, n. 191 (1 VII 1889, leg. Khushb.). Nom. volg. sec. il racc. Khushbulian **Մլմլուկ** – pr. *mlmlug*; il P. L. Alishan lo denomina **Մ. ճղճիս** – pr. *M. gehgim*.
313. **G. pusillum L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 880. Arm. centr.: distr. di Warto, n. 453 (1911, leg. Surmagh.).
314. **G. columbinum L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 881. Ponto: dintorni di Trebizonda, n. 192 (23 VIII 1889, leg. Marimian!). Nom. volg. sec. il racc. Marimian **Քումիկ խոս** (*quimik junus*) – pr. *cume khod*.
315. **G. divaricatum Ehrh.** — Boiss. Fl. or., I, p. 881. Arm. cilic.: Elbistan, n. 193 (16 VI 1907, leg. Asdurian!).
316. **G. Robertianum L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 883. Ponto: dintorni di Trebizonda, n. 194 (3 VII 1907, leg. Shaban.). Nom. volg. sec. il racc. Shabanian **գետնի մօռս** – pr. *kedni mora*.
317. **Erodium cicutarium** (L. sub *Geranio*) **L' Hér.** — Boiss. Fl. or., I, p. 890. Arm. cilic.: Elbistan, (10 VI 1907, leg. Asdurian!) e Zeitun sul Kabak-Tepé (10 VI 1907, leg. Mergian.), n. 195. Nom. volg. del genere adoperato nel diz. Katciuni **Ճայակառուց** – pr. *giajagdntz*, dal gr. ἔρωδιός ἄρι – airone; nel diz. Lusignan, anche **Թէնի** – pr. *dzeni*, della specie Er. cicutarium nel libro di Menev. **Մշկահոտ ճայկառուց** – pr. *mshgahod giajgdntz*.
318. **E. ciconium** (L. sub *Geranio*) **W.** — Boiss. Fl. or., I, p. 891. Arm. cilic.: Zeitun sul Kabak-Tepé, n. 196 (7 IX 1907, leg. Mer- giand.).

OXALIDACEAE

319. **Oxalis corniculata L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 867. Ponto: Trebizonda, n. 197 (18 VII 1889, leg. Marimian!).

Nom. volg. del gen. *Oxalis*, sec. Hai Pss. e altri è ՓՊոկիչ, ma anche per genere *Rumex* usano denominazione simile; secondo noi, sarà opportuno adoderare per gen. *Rumex* Կառնական, - pr. *carnagantch* = orecchio di pecora (vedi Hai Pss.), և Պրթնջուկ - pr. *trtncing* (dal gr. ἔξαλις) per il gen. *Oxalis*; nel lib. del P. Menev. troviamo *Oxalidaceæ* = Փրուասույնելք - pr. *ttuarvuuidner*, probabilmente tradotto dal fr. *Trèfle aigre*, mentre il diz. Kateuni adopera Փրթնջակեայք - pr. *trtnciakajk*; nel diz. Lusignan troviamo in fr. *Oxalide* = ՓՊոնիչ, ՓՊուարաշ, e per *Ox. tubereuse*, Փ. հացարման; *Oxalidées* = Փրսնիչեայք. Il racc. Marimian scrive per. *Ox. corniculata* Պիկուիթ - pr. *bilibili*.

LINACEAE

320. ***Linum nodiflorum* L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 953.
Arm. transcauc.: Sarikamish (30 V 1907, leg. Sabund.!); Arm. centr.: dintorni di Erzerum (3 VI 1907, leg. Partamian!); Arm. cilicia: Zeitun sulle pendici del Beryt-Dagh (8 IX 1907, leg. Mergiand.!), n. 198.
Nom. volg. del gen. è կտաւաս - pr. *gdarad*, կուռ - pr. *gdav*. in turco گلپک - pr. *kelen*.
321. ***L. mucronatum* Bert.** == *L. flavum* L. var. ***orientale*** Boiss.
Diagn. ser. 2a, I, p. 99 == *L. orientale* Boiss. Fl. or., I, p. 855.
Sir. bor: Aintab, n. 199 (1906, leg. Khatciad.!). Sulle affinità tra questa specie, di cui la priorità spetta certo al nostro Bertoloni e l'europeo *L. flarum* cfr. Boiss. Fl. or.; sui rapporti tra *L. mucronatum* e *L. Balansæ* Boiss., pure della Flora orientale cfr. Freyn in Bull. Herb. Boiss. III (1895), p. 101 e sul suo polimorfismo nella Siria e contermini regioni cfr. Post, *Fl. of Syria* ecc. p. 183 che a *L. flarum* L. riconduce quali varietà i *L. orientale*, *tauricum*, *syriacum*, *sulphureum* e *rigidissimum*.
322. ***L. tauricum* W.** — Boiss. Fl. or., I, p. 856.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 200 (6 VI 1907, leg. Asdurian!).
323. ***L. angustifolium* Huds.** — Boiss. Fl. or., I, p. 861.
Arm. transcauc.: Artwin a Gorzul (12 VII 1910, leg. Diratz.!), ed Arm. pers.: Khoy (10 IV 1907, leg. Der Minassian!), n. 201.
324. ***L. usitatissimum* L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 860.
Arm. transcauc.: nel Passen inf. ad Ak-kilisse, n. 454a (1907, leg. Minass.!); Arm. centr.: distr. di Warto, n. 454b (1911, leg. Surmaghian!).
Nom. volg. sec. il lib. del P. Menev. Կործածական կտաւաս - pr. *cordzadzagan gdarad*.

ZYGOPHYLLACEAE

325. ***Peganum Harmala* L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 917; S. et Sm. Fl. greca tab. 456; Rehb. Ic. Fl. Germ. n. 4818!

Arm. transcauc.: Artwin nell' antica fortezza armena di Ardanoutch, (8 VIII 1910, leg. Diratz.); Ani fra i ruderi nell' antica capitale armena (1900, leg. Basmadgian!), n. 202.

Nom. volg. sec. Hai Pss. Ապանդ - pr. *sbant*; nel diz. Katciuni in fr. *Harmale* = Վայրի վեգենայ, սպանդ - pr. *ravri pekena*, e nel diz. Lusignan anche Խուճիկ - pr. *khudgik*, in turco մախմուր յիշկի. Il racc. G. Basmadgian scrive սպանդ ծաղիկ - pr. *sbunk dzaghik*.

RUTACEAE

326. ***Haplophyllum myrtifolium* Boiss.** — Diagn. I, 1, p. 63 et Fl. or., I, p. 203; Ky. It. cil. - kurd. 1859, n. 112!
Arm. cilec.: Elbitan, n. 203 (6 VI 1907, leg. Asdurian!).
Nom. volg. del gen. sec. il diz. Lusignan Պարզատերև - pr. *barzaderer*; sec. il racc. Asdurian in turco, աճի բիյամ (?) - pr. *agiam*.
327. ***H. Buxbaumi* (Poir. *sub Ruta*) Boiss.** Fl. or., I, p. 937 = *Ruta spathulata* S. et Sm. Fl. Graec. tab. 370.
Sir. bor.: Aintab, n. 204 (1906, leg. Khateiad.).

MELIACEAE

328. ***Melia Azedarach* L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 954.
Sir. bor.: Aintab, n. 205 (1906, leg. Khateiad.).
Nom. volg. sec. Hai Pss. Ազադրախտ - pr. *azadtrakht*, dal persiano *azad direkht* che significa *albero grande* e che in Persia si eleva ad oltre 10 metri, in turco *پلاسپری ազար*? - pr. *tesbih agadyi*; il nome generico Melia (dal gr. μελιάς *ξωγή* = frassino) è chiamato dal P. Katciuni Մոլահացի - pr. *molahatsi*, e la specie Առա Մոլաթզենի - pr. *sud molatzeni* dal fr. *fauve sycomore*; in fr. anche *Lilas des Indes* = Եղբակնի Հնդկաց, nel diz. Lusignan alla voce Azadirachte v'è Ազատենի, խախակ, ecc.

MALVACEAE

329. ***Althaea pallida* W. et K.** — Boiss. Fl. or., I, p. 832 [*sub Alcea*.]
Arm. transeauc.: Mamanelis nel Piccolo Caucaso (18 VIII 1911, leg. Rostomian!) e Passen inf. ad Ak-kilisse (1909 Minassian!);
Arm. centr.: a Musch e Warto (leg. Gindoian e Surmagh.);
Arm. cilec.: Zeitun a Kabak-Tepé leg. Mergiand.), n. 455.
Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Տուզու - pr. *dughd*, Կուտաշ - կուտաշ (?) - pr. *gudagnd*, ecc. vedi diz. Katciuni Althée, in turco Կիլիկայի - pr. *gülhatem*; il racc. Surmaghian scrive Տեղու - pr. *dighd*.
330. ***Malva silvestris* L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 819.
— *α typica* — Arm. transcauc.: Satrel nel Piccolo Caucaso, n. 456a (13 VI 1911, leg. Rostom.).

- 3 **Mauritiana** L. (*pr. sp.*). Arm. centr.: Warto, n. 456b (1911, leg. Surmagh!).
 Nom. volg. in generale Մոլոշ - pr. *molosh*, vedi Hai Pss. i sinonimi, anche Աղցկառկ - pr. *aghgegdag*; nel diz. Katciuni anche Բաղրուկ - pr. *paghrciug*; la var. *tipica* sec. il racc. Rostom. è indicata Մոլոք - pr. *molok*; la var. *mauritianus*, sec. il racc. Surmaghian, Ճնճղու պաշար - pr. *gengeghū bashar*.
381. **M. rotundifolia** L. — Boiss. Fl. or., I, p. 820.
 Arm. transcauc.: Ani nelle rovine dell' antica città (1900, leg. Basmadgian!); Arm. centr.: Warto, (1911, leg. Surmagh.); Arm. cilic.: Elbistan, n. 13 (2 VI 1910, leg. Asdurian!); Arm. pers.: Khoy (1908, leg. Der Minassian!), n. 457.
 Nom. volg. sec. il racc. G. Basmadgian Փաթաթուկ - pr. *pata-tug*; il racc. Surmagh. scrive միծ տեսակ Ճնճղու պաշար, il racc. Asdurian, in turco Եպկմ կուկհի - pr. *ebem geomegi*; il P. Menevician Կոստեակ (բոլորտերևան մոլոշ).
382. **Hibiscus Trionum** L. — Boiss. Fl. or., I, p. 840.
 Arm. centr.: distr. di Warto, n. 458 (1911, leg. Surmagh!).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Բաղրուկ - pr. *pagkrciug*; il P. Kateiuni nel suo diz. adopera alla voce Ketmie, Hibiscus Քեմսի - pr. *kedmi*.
383. **Abutilon Avicennæ Gaertn.** — Boiss. Fl. or., I, p. 836.
 Arm. centr.: distr. di Warto, n. 459 (1911, leg. c. s!).

EUPHORBIACEAE

384. **Euphorbia herniariæfolia** W. — Boiss. Fl. or., IV, p. 1123.
 Cfr. S. et Sm. Fl. Graec. V, p. 47, tab. 460 (*sub E. pumila*); Ky. It. cilic. in Tauri Alpes «Bulgar-Dagh» n. 21. 44. 83; It. cilic.-kurd. 1859, n. 167; It. syr. 1855, n. 190; Orphanides Fl. græc. exsicc. n. 700; Heldr. Fl. græc. exsicc. n. 642! — Cfr. **Tribulus nostra** IV, fig. 7.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 207 (10 VI 1907, leg. Asdurian!).
 Nom. volg. del genere sec. il libr. dell' Artignan, p. 63. Կաթնուկ - pr. *gatnug*, così chiamato nel distr. di Adapasar, in turco Սիլլի - pr. *süllien*, ed ammette sinonimi, Բշկաթնուկ, ափարփի, կանչող, կազանչան. Nei diz. mod. e nel lib. di Menev. si preferisce il nome Կազանչան - pr. *gaghancian*; nello Hai Pss. vedi Ափարփիոն, կաղնչան, la specie si potrà chiamare կ. Փոշտիսերկու - թիւ - pr. *g. poshiderevi*.
385. ? **E. Iberica** Boiss. Cent. Euph. p. 28 et Fl. or., I, p. 1127.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 208 (prim. 1907, leg. Asdurian!). Esempio all'inizio della fioritura e perciò rimasto dubbio.
386. **E. denticulata** Lehm. — Boiss. Fl. or., IV, p. 1135. — Cfr. Boiss. Euphorb. Ic. tab. 119; Ky. It. cilic.-kurd. 1859, n. 97.
 Arm. cilic.: Elbistan (16 VI 1907, leg. Asdurian!); Arm. centr.: distr. di Warto, (1908, leg. Surmagh.), n. 209. L'esemplare di

questa seconda provenienza all'inizio della fioritura differisce dal primo per le foglie caulinari più rotondate, ottuse alla sommità e qui brevemente mucronate, meno cartilaginee.
Nom. volg. sec. il racc. Surmaghian Քընեկան - pr. *kregan*.

337. **Mercurialis annua L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 1142.
Ponto: dintorni di Grobi prov. di Trebisonda, n. 357 (1912, leg. Shabanian!).



Euphorbia denticulata Lehm = Քընեկան (?)

Nom. volg. sec. il diz. di N. Püzent. Կմշտուկ - pr. *gmshdrug*, in turco *օղու օղու*, *եսպան ֆէսիյէնի*; nel lib. del medico Resten è nominata *Վայրի սեհանի*: Il racc. Marinian scrive *Դիմիլ* - pr. *dzimil*; nel lib. di P. Menev. per questa specie si trova *Տարեւոր կմշտուկ*.

338. **Ricinus communis L.** — Boiss. Fl. or., I, p. 1143.
Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse n. 460 (1908, leg. Minassian!): coltivato o sfuggito alla coltura.
Nom. volg. sec. il racc. Minassian *Տիզականէփ* - pr. *disaganep*; sec. Hai Pss. *Տզկանեփայու* - pr. *dsganepaid*; presso altri autori, anche *Տզենի* - pr. *dseni*, *Ղու* - pr. *caghù*, in turco *Կէնէկէզէք* - pr. *ghenegercek*.

ERICACEAE

339. **Vaccinium Myrtillus L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 964.
 Arm. transcauc.: Sarikamish, n. 211 (primav. 1907, leg. Sabund!).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Հաղարասնի - pr. *habalasseni*; nel lib.
 di Menev. Արտենական Հաղարասի - pr. *mardenagan habalassi*.
340. **Vaccinium Arctostaphylos L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 964.
 Arm. transcauc.: nell' antica fortezza armena di Ardanutch (8
 VIII 1910, leg. Diratz!); Ponto: dintorni di Trebizonda (1 X
 1884, leg. Khushb.). n. 215. Vedi fig. a p. 75.
 Nom. volg. sec. il racc. Khushbulian in Trebizonda, Արևիկ պի-
 պի - pr. *arevi bil*; dalle foglie si prepara un thé eccellente.
341. **Erica arborea L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 970.
 Ponto: Trebizonda nel convento di S. Salvatore, (30 VII 1889,
 leg. Marimian!); Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse (7
 V 1907, leg. Minassian!) ed ad Sarikanish (20 V 1907, leg. Sa-
 bundg!); Arm. cilic.: Elbistan (8 VI 1907, leg. Asdurian!) ed Arm.
 pers.: a Khoy. 1908, leg. Der Minassian), n. 212.
 Assai variabile per lo sviluppo della pianta, la lunghezza delle
 foglie, l'infiorescenza più o meno ricca, ecc.
 Nom. volg. sec. il racc. Marimian ed in generale Ցախ - pr.
tzakh, sec. Hai Pss. anche Խալանձ - pr. *khalandje*; nel diz. Kat-
 ciuni (in fr. *bruyère*) Ցարասի - pr. *tzarassi*, in turco սիրկուրկէ
 օթու - pr. *süpurke otu*, nel lib. di Menev. Համարգի - pr. *ha-
 ramrki*.
342. **Rhododendron ponticum L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 971.
 Ponto: Trebizonda nel convento del Salvatore, n. 213 (18 VI
 (1907, leg. Shabanian!) ed a Toz (10 V 1901, leg. Diratzouyan!).
 Nom. volg. per il genere è Կոմար - pr. *gomar* nel diz. Katciuni
Եղբ, մրտավարդի - pr. *ieghri*, *mrdararti*, dal gr. ῥόδος φύρη
 = rosa e δένδρον δέντρο = albero, perciò, secondo certi moderni
 armeni Վարդածառ - pr. *vartadzar*. La sp. ponticum è detto
 da tutti Լաշի - pr. *lashi*.
343. **Rh. Ungerni Trautv.** ex Regel in Gartenfl. (1885), p. 335.
 Arm. transcauc.: Artwin nei boschi di Salalet, alt. 960 m. (24
 VIII 1910, leg. Diratz!) e di Teladibi a 850 m. (id), n. 595.
344. **Rh. flavum Don.** — Boiss. Fl. or., III, p. 972.
 Ponto: Trebizonda dintorni della città (1908, leg. Shaban!), e
 presso il convento del Salvatore (10 V 1910, leg. Marim.!), n. 214.
 Nom. volg. sec. il mittente Marimian Եղբ - pr. *eghri*. Le azalee,
 che abbondano nel Ponto insieme il rododendron, si chia-
 mano Եփին, Ճփին - pr. *dzipin*, *dziphin* e nello Hai Pss. Եփ-
 փի - pr. *dzepik*.

EBENACEAE

345. **Diospyros Lotus L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 33.
 Arm. transcauc.: dintorni di Artwin nei boschi di Salalet all'alt.
 di 850 m., n. 462 (12 VII 1910, leg. Diratz!).

Nom. volg. sec. Hai Pss. Լղենի, լուսենի – pr. *lteni*, *lddeni*. Լուս – pr. *ldid*; P. Katchiuni, nel suo diz. fa derivare *Diospyros* dal Λότος γῆνη, e πορές համ, սկրի, donde crea la parola Փիսուենի, vedi in fr. *Plaqueminier*, ove per D. Lotus è adoperato Փիսուենի լուսասակերպ – pr. *Tiosseni ludassagherb*; mentre nel diz. Lusignan *Plaqueminier* = Ժորի, Ճորի – pr. in fr. *Jori*, *Joreni*.

PLUMBAGINACEAE

346. **Acantholimon Echinus** (L. sub *Statice* p. p.) **Bge.** var. **Tournefortii** (Janb. et Spach Fl. plant. or., tab. 90 sub *Statice*) — Boiss. Fl. or., IV, p. 841.
 Arm. cilie.: Zeitun sul Beryt-Dagh (7 IX 1907, leg. Mergiand.!) e Gümüşkane, Stavross (9 VI 1900, leg. P. Sintenis!); Arm. centr.: dintorni di Erzerum (3 VI 1907, leg. Partamian!), n. 223. Nom. volg. nel diz. Katchiuni e nello Hai Pss. Կոծոծ – pr. *godzodz*, qui avvertendo che la figura stampata nello Hai Pss. non rappresenta Acantholimon, ma un' Acanthus; tanto nel detto libro quanto nel diz. Katchiuni e Lusignan si dice che. «È una pianta spinosa, crescente nei luoghi acquosi», (tratto dalla descrizione del Vanagan Vartabed, vivente nel XII secolo), ma veramente è una pianta di montagna, cresce nei luoghi rocciosi e ben esposti al sole. Per A. Echinus il P. Alishan, nel suo Sissouan, adopera il nome Ա. խոսանածեր. Il racc. Khushbulian scrive Գազ – pr. *cas*, ma veramente Գազ si applica ad è Astragalus; sec. il racc. Mergiandishian, in turco Գազ պէղէղ (?!)
347. **A. acerosum** W. var. **Piccardii** Boiss. Diagn. VII, p. 79 (pr. sp.). == *A. acer.* var. *brachystachyrum* Boiss. Fl. or., IV, p. 838. Cfr. Ky. It. cil. in Tauri Alp. «Bulgar-Dagh», n. 99. 267 [sub *A. Pinardi* Boiss. var.]
 Ponto: Grom sulle pendici delle montagne Pontiche, n. 463a (1910, leg. Parghentanian!); Arm. centr.: Gungum, n. 463b (1908, leg. Surmagh.!).
348. **Plumbago europaea** L. — Boiss. Fl. or., IV, p. 875.
 Arm. transcauc.: nell'antica fortezza di Ardanoutch (8 VIII 1910, leg. Diratz.); Arm. centr.: a Warto (1908, leg. Surmagh.); Arm. cilie.: Zeitun sul Kabak-Tep̄ (1910, leg. Mergian.), n. 574. Nom. volg. adoperato dal P. Katchiuni nel suo diz. è Աղմանիս – pr. *adannakhod*, in turco սիչ օղու – pr. *dish otu*, e non è altro che la traduzione dal fr. *dentelaire* (o *plombago*).

OLEACEAE

349. **Syringa vulgaris** L. — Boiss. Fl. or., IV, p. 38.
 Arm. pers.: Khoy, n. 224 (5 V 1907, leg. Der Minass.!).
 Nom. volg. sec. il racc., Hai Pss. ed altri Եղիլունի – pr. *iegrevani*,



Vaccinium Arctostaphylos L. : *u·bi·b u·p·u·p·h·L.*

- in turco **لچیق** - pr. *leilag*; il racc. Der Minassian aggiunge che nel dialetto di Khoy è chiamata **بیشامان** - pr. *yassaman*.
350. **Fraxinus Ornus L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 39.
Arm. centr.: dintorni di Musch, n. 464 (1908, leg. Gindoian!).
351. **Fr. oxycarpa Willd.** — Boiss. Fl. or., IV p. 40 [*sub F. oxyphylla M. B.*].
Arm. cilic.: Zeitun sul Kabak - Tépé, n. 225 (22 VIII 1907, leg. Mergiand !).
352. **Jasminum fruticans L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 43.
Arm. transcauc.: Artwin nella fortezza genovese sul fiume Tchorok (10 VII 1910, leg. Diratz!); Sir. bor.: Aintab (1906, leg. Khatchiad!), n. 226.
Nom. volg. sec. Hai Pss. **Յասմիկ, յասմին** - pr. *hasmik, hasmin*, in turco **بیشامان** - pr. *yassemi*.
353. **J. officinale L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 48.
Arm. cilic.: Sir. bor.: Aintab (1906, leg. Khatchiad!), n. 227.
Nom. volg. **پیچگاگان կամ հասրագ յասմիկ** - pr. fr. *pjichgagan o hassarag hasmik*.

PRIMULACEAE

354. **Anagallis arvensis L. var. *phœnicea* Scop., All** (pr. sp.). — Boiss. Fl. or., IV, p. 6.
Arm. transcauc.: dintorni di Artwin (VII-VIII 1910, leg. Diratz!); Sir. bor.: Aintab (1906, leg. Khatchiad!), n. 216.
Nom. volg. sec. Hai Pss. **Տղրկախոս** - pr. *dsrgakhab* — erba sanguisuga, **Սամոխ** - pr. *samukh*, **Անձարակ?** - pr. *angeearag*.
355. **Lysimachia vulgaris L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 8.
Ponto: Trebizona presso il villaggio Mala, n. 217 (26 VIII 1889, leg. Khushb.); Arm. centr.: dintorni di Erzerum, n. 218 (30 V 1907, leg. Partamian!).
Nom. volg., sec. il racc. Khushbulian, nel villaggio Mala e nel Ponto **Տիւնաչ (հասրագ)** - pr. *dmndash (hassarag)*.
356. **L. punctata Jacq.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 9.
Ponto: Trebizona presso il villaggio Mala (26 VIII 1910, leg. Khushb.); Arm. transcauc.: dintorni di Artwin, (13 e 30 VII e 2 VIII 1910, leg. Diratz!), n. 219. — Gli esemplari pontici riproducono abbastanza bene la var. *verticillata* (M. B.) Boiss.: quelli transcaucasici hanno in parte foglie brevemente picciolate e oblunghi-ovate, in parte foglie più largamente peduncolate (come nella varietà), ma ovato-lanceolate, subacute. Cfr. le osservazioni critiche di Handel-Mazzetti in op. c. p. 178 (estr.).
Nom. volg. sec. Hai Pss. **Տիւնաչ կիսանիզ** - pr. *dmndash ghi-danish*.
357. **Primula Pallasii Lehm.** Prim. p. 38, tab. 3. — Boiss. Fl. or., IV, p. 26.
Arm. centr.: distr. di Warto, n. 461 (1911, leg. Surmaghian!). — Differisce dalla figura del Lehmann per le foglie anche più al-

lungate e più insensibilmente attenuate lungo il picciolo e leggermente pubescenti nella pagina inferiore. Del resto già Boissier (*op. c.*) aveva fatto rilevare qualche differenza fra la pianta armena e quello altaica descritta dal Lehmann, ma il Pax (*Monogr. Übers. über die Arten d. Gattung Primula in Engler's Bot. Jahrb. X [1839], p. 179*) ritiene erronea la figura di quel monografo e non fa distinzione fra la pianta dell'Armenia, del Caucaso, della Persia settentrionale. *Pr. Pallasii* è inoltre ricondotta come varietà nel ciclo di *Pr. elatior* (L.) Jacq. Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Կովակնակ - pr. *goratzn zug*, Թարմիակ - pr. *tarmciak*; i moderni traducono il nome generico latino in Գարնաճաղիկ - pr. *carnanadzaghibig*; sec. il racc. Surmaghian i *Pr. Pallasii* è detta, Սուխն, շուշան ծաղիկ - pr. *sos sium, shushan dzaghik*.

358. **Pr. macrocalyx Bge** in Led. Fl. alt. I, p. 209. — Boiss. Fl. or., IV, p. 25.

Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 220 (1 V 1907, leg. Minassian!) ed a Sarikamish, n. 221 (prim. 1907, leg. Sabund.). Questi ultimi esemplari differiscono dai precedenti per le foglie lungam. ed insensibilmente attenuate in picciolo, sono cordato-ovate nei primi. Ma le due forme sono comprese nella diagnosi Bungiana «*P. solis cordato-ovatis, oblongisve*», né sono distinte dal Pax (in *op. s. c.*), che ritiene più rara la forma cordata alla base. *Pr. macrocalyx* è da questi ricondotta a varietà del ciclo di *Pr. officinalis* (L.) Jacq.

Nom. volg. sec. il racc. Der Minassian Թուկիս ծաղիկ - pr. *tukia dzaghik*, sec. il racc. Sabundgian Ախլախնչոր - pr. *akhlahhnzor*.

359. **Pr. auriculata Lam.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 28; Curt. Bot. Mag. tub. 322 [*sub Pr. longifolia*].

Arm. transcauc.: Sarikamish (20 V 1907, leg. Sabundg!), Possen inf.: ad Ak-kilisse (7 V 1907, leg. B. Minassian!); Arm. cilic.: Elbistan (8 VI 1907, leg. Asdurian!); Arm. pers.: Khoy (Primavera 1908, leg. H. Minassian!), n. 222. Nom. volg. secondo i moderni Արջականի - pr. *arcigantch*; sec. il racc. Der Minassian Գիներռուկ - pr. *kinerpug*; sec. i racc. Minassian e Sabundgiantz Հօրօս մօրօս - pr. *horod morod*.

ASCLEPIADACEAE

360. **Vincetoxicum medium Decsn.** in DC. ex p. — Boiss. Fl. or., IV, p. 55.

Arm. cilic.: Elbistan, n. 228 (primavera 1907, leg. Asdurian!). Nom. volg. del genere, secondo i moderni Թիւնաթափ - pr. *tunatap*, dal fr. *Dompè-renin*; vedi nel diz. Katciuni *Asclepias vincetoxicum* = Ասկլեպիոս զեղաթափ. Lo stesso Autore adopera Ասկլեպեայք per la farn. *Asclepiadaceæ*; nello Hai Pss. Աբալ(?) - pr. *akal*. Ասկլեպիոս?

361. **V. fuscatum Rohb.** fil. Ic. germ. XVII, p. 17, nec tab. 28. — Boiss. Fl. or., IV, p. 55.

Arm. cilic.: Elbistan, n. 229 (8 VI 1907, leg. Asdurian!).

GENTIANACEAE

362. **Gentiana asclepiadea L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 76.
 Arm. transcauc.: Artwin nei boschi di Salalet all'alt. di 900 m. (24 VII 1910, leg. Diratz.!) e Mamanelis nel Piccolo Caucaso (VIII 1910, leg. Rostom.!); Ponto: Trebizonda presto il villaggio Mala (13 VIII 1889, leg. Khushb.!), n. 230.
 Nom. volg. sec. il racc. Khushbulian (nel villaggio Mala e nel Ponto) Տորոնի խոռո - pr. doron khod; il racc. Rostomian secondo il dialetto di shavshett la chiama Փինջան (փինչան) ծաղկել - pr. pincian dzaghik.
363. **G. septemfida Pall.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 76. Cfr. **Tabula nostra** II, fig. 3.
 Arm. transcauc.: Artwin nei boschi di Salalet all'alt. di 800 m. e lungo la strada carrozzabile tra Artwin ed Ardanoutch (10 VIII 1910, leg. Diratz.!); Arm. centr.: dintorni di Erzerum (1907, leg. Partam.!), n. 465.
364. **G. gelida M. B.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 75. Cfr. **Tabula nostra** II, fig. 4.
 Arm. transcauc.: Passen inf. ad Ak-kilisse (1908, leg. Minassian!), n. 466a; Arm. centr.: Monte Palandöken presso Erzerum (1907, leg. Essayan!) e dintorni di Musch, n. 466b; Ponto: Grom sulle pendici delle montagne pontiche (1910, leg. Parghent.!), n. 466c. — Gli esemplari da noi studiati corrispondono ai saggi distribuiti dal Kotschy nel n. 497 dell' « Iter, cilic. - kurd. 1859, Pl. in prov. Musch, ecc. », ed a quelli di Huet du Pavillon « Fl. or. exsicc. » dei dintorni di Erzerum!
 Nom. volg. del genere è di solito Բող - pr. pok, si nomina anche Օգի գեղ - pr. otzi tegh == medicina di serpente, Օգի սխոր - pr. otzi skhdor == aglio di serpente; il racc. Minassian dice che questa specie nel dialetto di Passen si chiama Խորասանի կամ Ճիճուկի գեղ - pr. khorassani o gigini tegh == medicina contro i vermi.
365. **G. cruciata L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 76.
 Arm. centr.: Monte Palandöken e Kohanamk presso Erzerum (1907, leg. Essayan!), n. 465. Già nota dei dintorni di Erzerum (Huet du Pav. sec. Boissier).

BORRAGINACEAE

366. **Heliotropium europaeum L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 130.
 Arm. cilic.: Elbistan (10 VI 1907, leg. Asdurian!) e Zeitun sul Kabak-Tépé (20 VIII 1907, leg. Mergiand.!); Arm. centr.: distr. di Warto (1911, leg. Surmagh.!), n. 231.
 Nom. volg. generico sec. Hai Pss. e i diz. moderni Արևադեմ - pr. arevadem, (dal gr. ἥλιος ἀρέβαδην sole τρέπω զանամ io giro).
367. **H. Eichwaldi Steud.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 131.
 Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 467 (1908, leg. Minassian!).

368. **Cerinthe minor** L. — Boiss. Fl. or., IV, p. 148.
 Arm. transcauc.: dintorni di Artwin a Mesire Kekedgian (14 VII 1910, leg. Diratz!); Arm. cilic.: Elbistan (VI 1907, leg. Asdurian!), n. 232.
 Nom. volg. generico adoperato dal P. Katciuni Մոմածաղիկ – pr. momadzagik, tradotto dal greco κηρός μέλι cera, ἄνθος δαηήκ fiore, in fr. Mélinet, o Cérinthe.
369. **Anchusa italicica** Retz. — Boiss. Fl. or., IV, p. 154.
 Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse (1907, leg. Minass!); e nei dintorni di Artwin a Mesire Kekedgian (14 VII 1907, leg. Diratz!); Arm. centr.: a Musch (1908, leg. Gindoian!), n. 468.
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Խարի, Շիքար, Շեգ խարի, Շենգիարի; sec. il diz. Katciuni in fr. Anchusa = Թորթ – pr. tort; sec. il racc. Surmagh. Պորթ – pr. torti; sec. il racc. Minassian Ճուծք – pr. dzudzak.
370. **A. orientalis** (L. sub *Lycopside*) Rehb. — Boiss. Fl. or., IV, p. 161; Ky. It. cilic.-kurd., 1859 n. 295.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 233 (6 VI 1907, leg. Asdurian!).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Խարի արևելեան – pr. khari arerelian.
371. **Sympytum aspernum** Sims in Bot. Mag. tab. 929; — Boiss. Fl. or., IV, p. 175.
 Arm. transcauc.: Mamanelis nel Piccolo Caucaso, n. 469 (1910, leg. Rostom!).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Շամպիդագ – pr. shambghidag, Ճործորակ – pr. dzordzorag; Ափնիկ? – pr. apnih; la specie S. officinale sec. Hai Pss. Քարիստ, sec. il lib. P. Menev. anche Զօռուկ – pr. sodug; in fr. Consoude, nel diz. Katciuni in turco զարազքէն.
372. **Onosma sericeum** W. — Boiss. Fl. or., VI, p. 185; Lehm. Ic. Asperifol., tab. 16.
 Arm. cilic.: Elbistan, (30 V e 16 VI 1907, leg. Asdurian!). e Zeitun a Kabak-Tépé (1908, leg. Mergand!); Arm. centr.: Gum-gum (1908, leg. Surmagh!) e dintorni di Erzerum (1908, leg. Partamian!), n. 234.
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Օնոսմա – pr. onosma; sec. P. Alishan (nel Sissouan) Իշհոծոծ – pr. ishhodod; nel diz. Katciuni Onosme (dal gr. ὄνος έλεφινός λουστος). Շիկհարի կամ շեկհարի – pr. shikhari, in tureo չիհար; nel diz. Lusignan anche Հարածոր – pr. haradzor.
373. **O. flavum** (Lehm. Mag. Ges. Vat. Berl., VIII, p. 22, tab. 4 sub *Colsmannia*) Vatke. — Boiss. Fl. or., IV, p. 186.
 Sir. bor.: Aintab (1906, leg. Khateiad!). — Già noto per la Sir. boreale in base alle raccolte di Aucher-Eloy, Haussnecht, ecc.
374. **O. albo-roseum** Fisch. et Meyer. — Boiss. Fl. or., IV, p. 798; Ky. It. cilic. – kurd., 1859, n. 96 [sub *O. congesto* DC.]
 Arm. cilic.: Zeitun presso Kabak-Tépé, n. 470 (1908, leg. Mer giandishian!).
375. **Onosma stellulatum** Walld. et Kit. Pl. rar. Hung. II, p. 189, tab. 173. — Boiss. Fl. or., IV, p. 201.
 Sir. bor.: Aintab, n. 236 (1911, leg. Khateiad!). — Specie poli-

morfa come mostra il quadro redattone dal Boissier. Il saggio incompleto da noi esaminato ricorda per alcuni caratteri la var. *pallidum* e per altri la var. *angustifolium*, quali sono intese e circoscritte dall'Autore della «Flora orientalis». Da studiarsi su materiale più abbondante ed in confronto con gli affini *O. armenum* DC. ed *P. Roussaei* DC.

376. **Echium vulgare L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 206.
Arm. transcauc.: Mamanelis nel Picc. Cauc., n. 471 (17 VIII 1910, leg. Rostomian!).
Nom. volg. adoperato dal P. Katciuni իժախոս հասարակ — pr. fr. *ijkeakhod kassarak* tradotto dal fr. *Viperine commune*; nel lib. di Menev. anche Վայրի եղնակեզու (?) (Ճճմոր ?); nello Hai Pss. Ախոն? վիշապուկ? Պախուռ ականչ (?); il racc. Rostomian lo chiama secondo i turchi Հավախիլայ — pr. *haraciva*.
377. **Lithospermum officinale L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 218.
Arm. transcauc.: Artwin a Mesiré Kekedgian n. 472 (12 VII 1910, leg. Diratz.).
Nom. volg. del genere adoperato nel diz. Katciuni Քարսակրմակ — pr. *harassermnik*, tradotto dal latino; in fr. *grémil officinal* o *herbe aux perles* = Մարզարտախոն; nello Hai Pss. Ղուլապ — pr. *ghulab*, Կաքաւկրկուս — pr. *gakargrgud*.
378. **Moltzia cærulea** (W. sub *Onosmate*) **Lehm.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 221.
Specie abbastanza polimorfa. Oltre la var. *subcristata* Boiss. si possono distinguere le seguenti altre:
— α **typica** — È la forma a foglie oblunghi-lanceolate, a brattee ovali-lanceolate ed a fiori con corolla lungamente superante il calice. È la pianta ritratta nella tav. 43 di Lehman «Ic. Asperifol.».
— β **intermedia** **Diratz.** n. var. — Cfr. **Tabula nostra** VIII, fig. 2-3. È la forma a foglie lanceolate oblunghi-acute, a brattee lanceolate ed a corolla molto sviluppata. È la pianta armena dei dintorni di Elbistan (10 VI 1907, leg. Asdurian!), n. 237.
— γ **punctata** **Lehm.** (op. c.). — Simile alla precedente da cui differisce per le foglie ottuse, le brattee meno allungate e la corolla subeguale al calice. Corrisponde alla tav. 44 dell'opera s. c. del Lehman e fu sinonimizzata col tipo dal Boissier. È probabile si tratti di forme biologiche, ma sono da ulteriormente studiarsi in natura le combinazioni morfologiche cui danno luogo.
379. **M. angustifolia** **DC.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 222.
Sir. bor.: Aintab, n. 238 (1906, leg. Khatciadurian!).
380. **Myosotis alpestris** **Schm.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 238. (excl. syn.).
Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse (1907, leg. Minassian!); Arm. centr.: sui monti Eyerli e Palandöken presso Erzerum (20 VIII 1907, leg. Essayan!); distr. di Warto, Musch ecc.; Arm. pers.: nei monti (1908, leg. Der Minassian!), n. 239.

Nom. volg. generico sec. Hai Pss. ed altri Մկնականջ – pr. *magnaganjch*, dal greco μός *μνήλη* sorcio, ὠτές *ωκυλίξ* orecchio, in fr. *Sourenz-rois de moionto*. Ne m' onbliez pas: per questa specie i racc. Der Minass., Surmaghian ed Essayan scrivono Ամենուկ (Առնային) – pr. *anmornuk (lernain)*; il racc. B. Minassian, nel dialetto di Passen, Ճնճուկի հինայ – pr. *gengeghuki hina*; e Surmaghian sec. il dialetto di Musch Բորթիկ – pr. *tortik*.

381. **Rochelia stellulata Rchb.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 244.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 240 (10 VI 1907, leg. Asdurian!).
Corrisponde a saggi distribuiti dal Kotschy nel n. 152 dell' «It. cilic.-kurd. 1859» raccolti «ad nives in monte Tschosch - Dagh, alt. 6500'» e da Huet du Pavillon «Fl. orient. exsicc.» dei dintorni di Erzerum.
382. **Asperugo procumbens L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 275.
Arm. cilic.: Elbistan (10 VI 1907, leg. Asdurian!).
Nom. volg. adoperato dal P. Katciuni nel suo diz. Քերչախօս – pr. *kerciakhod*, dal fr. *Rapelle (couchée)*.
383. **Cynoglossum nebrodense Guss.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 265.
Arm. transcauc.: dintorni di Artwin, n. 473a (22 VII 1907, leg. Diratz!); Arm. centr.: distr. di Warto, n. 473 (1911, leg. Surmagh!).

CONVOLVULACEAE

384. **Convolvulus Cantabrica L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 25.
Arm. transcauc.: Artwin nei luoghi boscosi, alt. 650 m. n. 583 (24 VII 1910, leg. Diratz!).
385. **C. altæoides L. var. sericeus Choisy.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 106.
Ponto: Grom, sulle pendici dei Ponti armeni (1910, Parghent.!); Arm. cilic.: Elbistan, (primav. 1907, leg. Asdurian!); Sir. bor.: Aintab (1906, leg. Khateiad.!), n. 242.
Nom. volg. del genere Գեղձ. Պատառուկ – pr. *keghtz, badadug* anche Բաղեղն (?) – pr. *pagheghn*; in turco Պոռչ ցիկի, in fr. *liseron*, in arm. sec. il volgo anche Վանածաղիկ, preso dal turco Չափր ցիկի = fiore tenda.
386. **C. arvensis L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 108.
Arm. cilic.: Elbistan (6 VI 1907, leg. Asdurian!); Arm. pers.: Salmasd (3 IV 1907, leg. Der Minassian!), n. 243.
Nom. volg. sec. Hai Pss. Բաղեղ – pr. *paregh*, Պատառուկ խոս ածուց – pr. *badaduk khod adznotz*; il P. Menev. Բուն պատառուկ կամ Պաշտաց գեղձ; sec. il diz. Lusignan Բաղեղ զաշտաց; sec. il diz. Katciuni Պատառուկ զաշտաց; sec. il racc. Der Minassian nel Salmasd Բաղեղ e sec. il dialetto di Divrik Պարքեա – pr. *barkia*; finalmente sec. il racc. Asdurian, in turco è chiamato Սարմաշիկ – pr. *sarmashik*.

SOLANACÉAE

387. **Solanum nigrum L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 284.
 Ponto: Trebizonda (23 VII 1889, leg. Marimian!); Arm. cilic.: Elbistan (26 VII 1907, leg. Asdurian!), n. 244.
 Nom. volg. Աղբաժ սկ. — pr. *morm ser*, secondo il popolo Շան խաշ-
 զող — pr. *shan khaghogh* = uva di cane; il racc. Marimian scrive
 Շան հաւող; in turco anche Քօպէք մեծիսի — pr. *keopek memessi*
 = mammella di cane.
388. **S. Dulcamara L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 285.
 Arm. cilic.; Zeit un a Kabak-Tépè (1906, leg. Mergiand.!); Arm. centr.: a Warto, Musch, ecc., n. 474.
 Nom. volg. nello Hai Pss. *Solanum*, *Morelle* = Կողուկ — pr. *go-
 sug*; sec. diz. Katciuni in fr. *Morelle Douce-amère* = Որթ վայ-
 րի; nel lib. di P. Menev, S. *Dulcamara* = Կողուկ կամ քաղ-
 ցրազան մորմ. Sec. il diz. Lusignan Ար, պատառում — pr. m. ba-
 dadun; sec. il racc. Surmagh. Շան խաղողի մեկ տեսակ:
389. **S. tuberosum L.** — Non esiste nella Fl. or., del Boissier.
 Arm. centr.: coltivato a Gumgum (1911, leg. Surmagh!) ed Arm. cilic.: ad Elbistan, (26 VII 1907, leg. Asdurian!), n. 475.
 Nom. volg. Գետնախնձոր — pr. *kednakhntzor*, anche Գաթաթ —
 pr. *patat*; nel diz. di Katciuni Մորմ պարագան; nel lib. di Me-
 nev. Գնդարմաս մորմ, Ազնիւ գետնախնձոր կամ պատառէս:
390. **Physalis Alkekengi L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 287.
 Arm. transcauc.: lungo la strada carrozzabile tra Artwin ed Ardanoutch, n. 577 (10 VIII 1910, leg. Diratz!).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Յակոբուկ — pr. *hagopug*, բարանաճ — pr.
kakanage, in fr. *Alkekengi* o *Coqueret*, in turco Ֆեկըր յիլքի.
391. **Atropa Belladonna L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 291.
 Arm. transcauc.: Artwin nei boschi, alti 600-850 m., n. 573 (24
 27 VII 1901, leg. Diratz!).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Սնչոյրասակ — pr. *sncniradak*, Շիկասակ —
 pr. *shigadak*, nel diz. Katciuni vedi *Belladone* = Ալբուկ — pr.
adrob, sec. il lib. di P. Menev. Մոլի կամ մահացու մորմ.
392. **Datura Stramonium L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 292.
 Arm. centr.: dintorni di Gumgum distr. di Warto, n. 574 (1910,
 leg. Surmagh!).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Արջնկոյդ — pr. *arcencuis* = noce di
 orso; nel diz. Katciuni Փշախնձորի — pr. *pshakhnzori*; nel diz.
 Lusignan anche Ժանուկոյդ — pr. in fr. *jeandengonis*.
393. **Hyoscyamus niger L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 294.
 Arm. transcauc.: nelle rovine dell'antica capitale armena Ani
 (1900, leg. Basmadgian!); Arm. centr.: dintorni di Erzerum (1908,
 leg. Partam!), n. 245.
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Աղռաշբանդ — pr. *agh rashpanc*; dal gr.
 ὄξις *խոզ* = porco, κύριος *բակլայ* = fara, in fr. *Jusquame*, in turco
 պակլի *օրու*; nel diz. Katciuni Բանգ — pr. *panc*, Խոզի բակլայ — pr.
khosi payla, Բանգ սեաւ — pr. *panc seur*; sec. il racc. Basmad-
 gian Աղքամնք — pr. *agh shpanc*, in turco տէի պատպան — pr. *de-
 li badbad*.

394. **H. reticulatus L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 295; Ky. It. syr. n. 167! Arm. cilic.: Elbistan (primav. 1907, leg. Asdurian!); Siria bor.: Aintab (1906, leg. Khatciad.), n. 246. Nom. volg. in turco, sec. Asdurian, **بَلْقَلْهَر** — pr. *iemlik*; il racc. dice che è commestibile.

SCROPHULARIACEAE

395. **Verbascum Thapsus L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 301. Arm. transcauc.: Ani nelle rovine della città (1900, leg. Basmadjian!); Arm. cilic.: Elbistan (1 VI 1907, leg. Asdurian!), n. 247. Nom. volg. del genere è **խոնդած** — pr. *khvntad*, in turco **սրբար զոյրուղի** — pr. *segher kuirughi* = coda di manzo, vedi nello Hai Pss. anche **եղան ակի** — pr. *iesan aki*, che è la traduzione dal turco, nel diz. Katciuni, in fr. *Molène commune* = V. *Thapsus* = **խոնդած հասարակ**; in turco si dice anche **շկլ սիլի** — pr. *dewe dili* = lingua di camello.
396. **V. Armenum Boiss. et Ky.** in Ky. It. cil.-kurd. 1859, n. 518; Boiss. Fl. or., IV, p. 304. Arm. cilic.: Elbistan, n. 248 (3 VI 1907, leg. Asdurian!). — Esemplare non ancora perfettamente fiorifero, ma tuttavia corrisponde pel complesso dei caratteri a saggi raccolti nel M. Bingöldagh dal Kotschy e distribuiti nell' Essiccata s. c.
397. **V. orientale M. B.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 330; Rchb. Ic. Germ. XX, tab. 30. Arm. transcauc.: Mamanelis nel Piccolo Caucaso n. 476 (18 VIII 1910, leg. Rostomian!). Nom. volg. nel distr. di Shavshett, sec. il racc. Rostomian, **Դեղին ծաղիկ** **կամ Հարսնիք** — pr. *teghin dzaghik, harsonik*.
398. **Anarrhinum orientale Bth.** in DC. — Boiss. Fl. or., IV, p. 362. Arm. cilic.: Elbistan, n. 249 (16 VI 1907, leg. Asdurian!). Nom. volg. sec. il diz. Lusignan in fr. *Anarrhine* = **Արրուկ** (?) — pr. *mrrug*; il mittente Asdurian, in turco, scrive **Կիսիկ սիսիկիրկ** — pr. *gümüşh süpürghe* = scopa argentea.
399. **Linaria spuria** (L. sub *Antirrhino*) Mill. — Boiss. Fl. or., IV, p. 366. Arm. cilic. Elbistan, (3 VI 1907, leg. Asdurian!) e Zeitun a Kabaik — Tepé (23 VIII 1907, leg. Mergiand.), n. 250. Nom. volg. generico adoperato dal P. Alishan nel Sissouan **վշենիկ** — pr. *rshenik*; nel diz. Katciuni vedi *Linaire*, in turco **ակվարուս օռնու** — pr. *nevruş otu*; nel diz. Lusignan *Linaire* = **կտառախոս**, **գլանիկ** — pr. *gdarakkod, e Linaria* = **լինարինի** — pr. *linareni*.
400. **L. pycnophylla** Boiss. et Bal. Diagn. ser. II, 6, p. 129; Boiss. Fl. or., IV, p. 372; Ky. It. cil. — kurd. a. 1859, n. 514 [sub *L. fastigiata*]. Ponto: Grom sulle pendici delle montagne pontico-armene, n. 477 (1911, leg. Parghentanian!).

401. **Antirrhinum majus L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 385.
 Arm. centr.: dintorni di Erzerum (1908, leg. Partamian!) e Warto (1911, leg. Surmagh!). n. 478.
 Nom. volg. adoperato dai moderni Շան բերան — pr. *shan peran* = bocca di cane; nello Hai Pss. Հորդու քիթ — pr. *hortu kit*, Եղնացրուկ — pr. *ieznatzrug* = muso di manzo; il racc. Essayan scrive Մեծ - արևիծ բերան — pr. *medz ariudz peran*, in turco Վազ-վազ չիշկի — pr. *vac-vac cicej*, արսլան աղըր — pr. *arslan aghsi*.
402. **Scrophularia Scopolii Hoppe** var. **olgantha** (Boiss et Heldr. Diagn. I, 12, p. 33) **Boiss.** — Fl. or., IV, p. 395.
 Arm. cilic.: Zeitun sul Kabak-Tepé, n. 479 (1908, leg. Mergian!). È una forma a fusto meno sviluppato, microfillo, ad infiorescenza depauperata e poco glandolosa. Una pianta più robusta sotto il nome di forma *major* fu distribuita dall' Heldreich nell' «Herb. græc. norm., n. 683» da noi esaminato nell' Erb. gen. Padovano.
 Nom. volg. del genere adoperato dal P. Katciuni nel suo diz. Խուլապուս — pr. *khulapuiss*.
403. **S. canina L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 419.
 Sir. bor.: Aintab, n. 251 (1906, leg. Khateciad.).
 Nom. volg. adoperato dal P. Katciuni è Խուլապոյս շանց — pr. *khulapuiss shantz*; il P. Alishan nel Sissouan aveva adoperato Խողելենդի — pr. *khoselenti*.
404. **Digitalis ferruginea L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 429.
 Arm. transcauc.: dintorni di Artwin (14 VII 1910, leg. Diratz!) e Mamanelis nel Piccolo Caucaso (1911, leg. Rostom!), n. 480.
 Nom. volg. del genere, adoperato dal P. Man. Katciuni è Մայս - նեռունկ — pr. *madnednung*, che è la traduzione del nome latino; il racc. Rostomian scrive, in turco, Մայսունդ օրու — pr. *majas-sul otu* = erba emorroidea.
405. **D. orientalis Lam.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 431; Bot. Magaz. tab. 2253; Lindl. Mon. tab. 16.
 Ponto: Grom sulle pendici delle montagne Pontico-armene n. 481 (1910, leg. Porghentanian!).
406. **Veronica Anagallis L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 437.
 Arm. transcauc.: dintorni di Artwin (14 VII 1910, leg. Diratz!);
 Arm. cilic.: Zeitun sul Beryt-Dagh (1908, leg. Merg.), n. 482.
 Nom. volg. del genere, nella prov. di Erzerum, Կաղի ծաղկի — pr. *Gazi daghik*; nello Hai Pss. Վահշիճակ — pr. fr. *vahzhijek*; nel diz. di Katciuni anche Բերինիկ — pr. *perinighe*, in turco Եսալան օրու — pr. *iarshan otu*.
407. **V. macrostachya Vahl.** Enum. p. 71. = *V. polifolia* Bth. in DC. — Boiss. Fl. or., IV, p. 444.
 Specie polimorfa nel cui ciclo comprendiamo le tre seguenti sottospecie:
 1. *subsp. polifolia* Bth. in DC. Prodr. X, p. 473 — È caratterizzata per essere pianta peloso-glandolosa con foglie larghe-

te, piane e manifestamente incise lungo il margine, infiorescenza peloso-glandolosa, corolla rosea e ovario con peli glandulosi. Vedemmo nell' Erb. Padovano saggi distribuiti da Kotschy «It. syriacum 1855, n. 41» e raccolti «Circa Zebdaine prope Damascum etc.».

2. *subsp. GHIUREKIANI* Diratz. *n. subsp.* Cfr. **Tabula nostra** IV, fig. 1-3.

Diffr. a priore planta indumento cano vestita, follis subintegris vel obsolete denticulatis margine revolutis minoribus, canescensibus, inflorescentia non glandulosa, corolla cœrulae non rosea, capsula pilis minutis non glandulosis induita.

Dedicata a sua Ecc. Mgr. Ign. Ghiurekian promotore della pubblicazione del presente Contributo alla Fl. dell' **Armenia**.
Hab. **Arm. cilic.**: **Eibistan**, n. 252 (6 VI 1907, leg. Asdur!).

3. *subsp. cinerea* Boiss. et Bal. Diagn. ser. II, 6, p. 131 (pr. sp.). Pianta simile alla precedente, ne differisce per le foglie più strette quasi linearie, fiori carnei, infiorescenza glandolosa, cinerina, in seguito alla disseccazione diventa nerastra. — Vidi le Essicate del Kotschy «It. cil.-kurd. 1859: Plantæ Argæi montis Cappadociae, n. 194» e «Plantæ in montibus Kassan ecc. n. 149».

408. **V. orientalis** Mill. — Boiss. Fl. or., IV, p. 443.

Arm. centr.: distr. di Warto (1911, leg. Surmagh!); Sir. bor.: Aintab (1906, leg. Khateiad.), n. 253.

Nom. volg. adoperato nel Sissouan del P. Alishan Վահեմակ արևելքան:

409. **V. kurdica** Bth. in DC. — Boiss. Fl. or., IV, p. 443.

Arm. cilic.: Zeitun sul Beryt-Dagh, n. 482 (1908, leg. Mergiand!).

410. **V. acinifolia** L. — Boiss. Fl. or., IV, p. 458.; Ky. It. cilic.-kurd. 1859 n. 59 [*sub V. Gorumsensi* Boiss. et Ky!]

Arm. centr.: distr. di Warto, n. 483 (1911, leg. Surmaghian!).

411. **V. didyma** Ten. — Boiss. Fl. or., IV, p. 466.

Arm. centr.: distr. di Warto, (c. s.!) ed Arm. pers.: Khoy (25 III 1907, leg. Der Minassian!), n. 254.

412. **Melampyrum arvense** L. — Boiss. Fl. or., IV, p. 480.

Arm. transcauc.: dintorni di Artwin, n. 484a (VII-VIII 1910, leg. Diratz!); Ponto: Grom sulle pendici delle montagne, n. 484b (1911, leg. Parghentanian!).

Nom. volg. sec. Hai Pss. Արծի հաստառց - pr. arcî had aznotz; sec. il diz. Katciuni (dal gr. μέλαχς οὐραί nero πόρος γνηθαὶ frumento) Կողմաղուան - pr. goratsorian che è la traduzione dal fr. Blé de rache (o Mélampyre de champs); sec. il lib. di Menev. Լորշուան(?) - pr. lortzorian.

OROBANCACEAE

413. **Phelipaea coccinea** (M. - B. *sub Orobanche*) Poir. — Boiss. Fl. or., IV, p. 494. [*sub Anoplanto*] Cfr. **Tabula nostra** V.

Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse (1908, leg. Minassian!); Arm. centr.: distr. di Warto 1911, leg. Surmagh.!), n. 485. Gli esemplari a noi inviati hanno fusto glabro o glabrescente, laddove la figura della tav. V a fusto manifestamente pubescente e con squame esclusivamente alla base. Essa corrisponde a *Phel. Tournefortii Desf.* e ad *Anopl. coccineus* β *peduncularis* Boiss. che Boissier (op. c.) dice «*vix varietas*» del tipo e sulla quale sono desiderabili ulteriori dati.

Nom. volg. sec. Hai Pss. Աղբերաց արիւն - pr. *aghperatz ariün* = sangue delle fontane. Il racc. Don B. Minassian scrive Եղբօր արիւն - pr. *ieghpor ariun* = sangue del fratello.

LABIATAE

414. ***Mentha longifolia*** (L. sub *M. spicata* var. *longifolia*) **Huds.**
— Boiss. Fl. or., IV, p. 543 [sub *M. silvestri*].
- α ***typica***. (s. lat.). — Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, (1908, leg. Minassian!); Artwin nel Mesire detto Ovaintz alt. m. 550 (24 VII 1910, leg. Diratz.!), n. 486a.
Nom. volg. del genere Անանուխ - pr. *ananukh*, in turco Յանук - pr. *nane*. Il racc. Minassian scrive Անանուխ կամ դաղձ - pr. *ananukh, taghtz*.
- β ***tomentosa*** **Urv.** (pr. sp.) = *M. silv.* β *stenostachya* Boiss. op. c. — Arm. transcauc.: dintorni di Artwin (24 VII-VIII 1910, leg. Diratz.!) e Mamanelis nel Picc. Cauc. (13 VII, 1911, leg. Rostomian!), n. 486b.
Nom. volg. sec. gli indigeni del distr. di Shavshet in giorgiano Վեցոյ - pr. *dzentzo*, (Rostomian).
415. ***M. viridis*** L. = *M. silvestris* η *viridis* Boiss. op. c. p. 541.
Arm. transcauc.: dintorni di Artwin, n. 487 (14 VII 1910, leg. Diratz.!).
Nom. volg. Թաղծն - pr. *taghtzn*, սարի անանուխ - pr. *sari ananukh*; nel diz. Katciuni *menthe verte* = Անանուխ կամազ:
416. ***Lycopus europaeus*** L. — Boiss. Fl. or., IV, p. 545.
Ponto.: Trebisonda presso il villaggio Mala (21 VIII 1889, leg. Khushb.!); Arm. cilic.: Kabak-Tepé di Zeitun (23 VIII 1907, leg. Mergiand!), n. 255.
Nom. volg. sec. il rac. Khushbulian nel villaggio Mala Կռնեփ-խոս (Կանեփխոս) - pr. *gonephkhod*. Il P. L. Alishan nello Hai Pss. (vedi p. 294) fa derivare il nome generico dal *Lycopodium* Գայրուն = piede di lupo: nel diz. Katciuni in fr. *Lycope* = Հոտիսոն ջրային - pr. *hodiso ceraïn*.
417. ***Origanum vulgare*** L. — Boiss. Fl. or., IV, p. 551.
Arm. transcauc.: dintorni di Artwin e nell'antica fortezza di Ardanoutch (VII-VIII 1910, leg. Diratz.!), Sattel, nel Piccolo Caucaso (7 V 1907, leg. Rostom.!), Passen infer. ad Ak-kilisse (1908, leg. Minas.!); Arm. centr.: Warto (1911, leg. Surmagh.!), n. 488.
Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. ed altri Զոհիրակ - pr. *zui-*

rag, alcuni dei sinonimi կատաշան, իշկորնգան, ուրծ, Քարանա-նուխ, Մարիմայ խոռ; in turco կիզկիյ չիկچի (?). Per questa specie il P. Alishan adopera Զ. հասարակ - pr. Z. *hassarak*. Nel dialetto del Picc. Caucaso e di Artwin si chiama Պիսնայ - pr. *bidna*; i contadini raccolgono, disseccano la pianta e polverizzata la mischiano nella minestra come condimento.

418. **O. rotundifolium Boiss.** Diagn. et II, 4, p. 11. Fl. or. IV, p. 550. Arm. transcauc.: Mamanelis nel Piccolo Caucaso, n. 489 (14 IX, 1911, leg. Rostomian!). — Differisce dalla descrizione data dal Boissier per i calici minutam. pubescenti e glandoloso-punteggiati e per le fg. paremente glandoloso-punteggiate. Caratteri per i quali ricorda l'affine O. Haussknechtii Boiss. da cui però si distacca per le brattee bianco-verdastre e non colorate. Specie elegantissima!

Nom. volg. adoperato dal P. Alishan Զուրակ բոլորածերե - pr. *Zuirak polaraderer*. Il racc. D. S. Rostomian e il R. D. Garabed Dirlughian di Artwin scrivono che secondo il volgo si chiama Բոյդ - pr. fr. *proje*; i fiori durano dall'agosto a tutto il settembre; i fornai e le donne (che preparano il pane in casa) li raccolgono, fanno bollire e l'acqua ottenuta serve come eccellente lievito per preparare la pasta del pane.

419. **Thymus Serpyllum L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 554.
— I. *subsp. ovatus* Mill. (pr. sp.) = *Th. serp.* var. *latifolius* Boiss. pr. p. — Arm. centr. a Warto (1911, leg. Surmagh. !); Arm. cilic.: Zeitun sul Beryt-Dagh (1908, leg. Mergiand. !), n. 490a.
— 2 *subsp. Kotschyanus* (Boiss. et Hoh. Diogn. I, 5, p. 16) **Boiss.** op. c. — Arm. transcauc.: Passen inf. ad Ak-kilisse, n. 490b. (1908, leg. Minass. !). — Per le foglie ellittico-lanceolate e non ovato-rotonde appartenne ad una forma stenofilla che Bentham chiamò *Th. lanceolatus* (non Desf.!).
Nom. volg. del genere, sec. Hai Pss. Զամբուռ, Թիւմ - pr. *Zampur*, *tüm*; sec. il diz. Katciuni Եղթոր, ծոթրին, թիւմ, ուրց ecc. — pr. *dzotor*, *dzotrin*, *tüm*, *urtz*, in turco պէրիկ օրնչ - pr. *keglîk otu*; Artignan e Lusignan preferiscono Թիւմ; per la specie nello Hai Pss. Կաքախոն - pr. *gakarkhod*; il racc. Minassian scrive, Եփրոն - pr. *dziltron*.

420. **Th. syriacus Boiss.** Diagn. I, 12, p. 47 et Fl. or., IV, p. 559. Arm. cilic.: Zeitun a Kabak-Tépé, n. 491 (1908, leg. Mergian.!). Confrontato con il n. 59 dell' « It. syriac. ex. Amani » di Kotschy. Nom. volg. in turco sec. il mitt. Asdurian Քրիկ - pr. *kckik*, e dice che, da questa pianta si estrae un' olio, reputato come rimedio contro molti dolori.

421. **Satureia hortensis L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 562.
Arm. transcauc.: nel Passen infr. ad Ak-kilisse, (1908, leg. Minassian!); Arm. cilic.: Zeitun a Kabak-Tépé (1908, leg. Mergiand.!), n. 596.

Nom. volg. del genere precisato dal Dr. Artignan¹ Եղթոր - pr.

1. Il dotto Autore nel suo libro « *Des Plantes et de leurs noms arméniens* » alla pag. 60 domanda, Che nome hanno adoperate i Mechitaristi per il *thymbra* nella traduzione di Virgilio? in *Georg. IV 31*. — Rispondiamo: Il P. A. Bagraduni nomina, thybra կորդին, Serpylla Եղթոր.

- dzatrin*. Nello Hai Pss. e nel diz. Kaciuini Կորդիւն - pr. *gor-tiu-n* in turco կորդօն - pr. *Gheik odu*; in fr. *Sarriette*, in it. *Timbra* dal gr. θύμρων nei vocaboli di Galeno v' è scritto θύμρων - pr. *tumpra*. Sec. il racc. Minassian Եփթռն - pr. *dzitron*. Il P. L. Alishan, la specie *hortensis* nomina կ. ածունց - pr. *G. adzutz*; il P. Menev. semplicemente Կորդիւն.
422. **S. laxiflora** K. Koch in Linnaea XXI (1848), p. 668 = *S. hortensis* β *grandiflora* Boiss. Fl. or. IV (1879), p. 562; Somm. et Lev. Enum. plant. Cauc. Cetr., p. 385.
Ponto: Trebizonda presso il villaggio Gevislik (30 VII 1889, leg. Sintenis!); Arm. transcauc.: Sattel nel Piccolo Caucaso (8 IX 1910, leg. Rostom!), n. 256. — Affine alla precedente, ma ben distinta, come di recente ha fatto notare, anche in base all' area distributiva, Handel-Mazzetti (in op. c. p. 187).
Nom. volg. sec. il racc. Minassian Եփթռն - pr. *dzitron* e sec. il racc. Khushbulian Եփթռն - pr. *dzetrin*.
423. **S. cristata** (Gris. sub *Micromeria*) Nym. — Boiss. Fl. or., IV, p. 570 [*sub Micromeria*].
Arm. cilic.: Zeitun a Kabak-Tépē, n. 492 (1907, leg. Mergiand!). Da ulteriori studiare con opportuno materiale di confronto.
424. **S. Calamintha** (*L. sub Melissa*) Scheele. — Boiss. Fl. or., IV, p. 577 [*sub Calam. officinalis* Mnch].
Arm. transcauc.: Artwin presso il villaggio Scheba (20 VII 1910, leg. Diratz!) e Mamanelis nel Piccolo Caucaso (11 VIII 1911, leg. Rostomian!), n. 493. — Forma a corolla fortemente roseo-violacea anche sul secco!
Nom. volg. sec. il racc. Rostomian, nel distr. di Shavshett Կարպալախ - pr. *gatnapalakh*, ed anche Անձրուկի խոժ - pr. *andari khod* = erba di bosco.
425. **S. vulgaris** (*L. sub Clinopodium*) Bég. — Boiss. Fl. or., IV, p. 529 [*sub Calam. Clinopodium* Bth.].
Arm. transcauc.: Artwin (VII-VIII 1910, leg. Diratz!) ed a Sattel nel Piccolo Caucaso (12 VI 1911, leg. Rostomian!) n. 494.
Nom. volg. sec. il racc. Rostomian, nel distr. Shavshet. Փեթագի ծաղիկ - pr. *petaki dzaghik* = fiore di arnia.
426. **Ziziphora clinopodioides** M. B. — Boiss. Fl. or., IV, p. 585.
— α **serpyllacea**. (M. B.) Boiss. op. c. — Arm. transcauc.: Passen, infer. ad Ak-kilisse, n. 495a (1908, leg. Minassian!). Corrisponde agli esemplari distribuiti dal Kotschy nel n. 339 dell'«It. cilic.-kurd., 1859» *sub Z. serpyllacea* e citati dal Boissier (pr. err. sub n. 359!).
— β **dasyantha** (M. B.) Boiss. op. c. — Ponto: Grom sulle pendici delle montagne n. 495b (1911, leg. Parghentanian!). — Forma strettam. affine alla precedente alla quale, come già l'A. della Flora orientale fece osservare, si ricollega con intermediari.
Nom. volg. del genere sec. il diz. Lusignan in fr. *Ziziphore* Զուսբ - pr. *Zussb*, parola che si trova anche nello Hai Pss. con dubbio. Il racc. Minassian scrive վայրի ծոթիք, ծիթռն - pr. *vayıri dzotrin, dzitron*.

427. **Z. capitata L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 586.
 Arm. cilic.: Elbistan (10 VI 1907, leg. Asdurian!) e Zeitun a Kaba-Tepā, (1908, leg. Mergiand. !); Sir. bor.: Aintab, (1906 leg. Khateiad.!), n. 257. — In nulla differente dalla pianta italiana! Nom. volg. sec. il racc. Asdurian, in turco սաղ բահանլ - pr. dagh rahane.
428. **Z. taurica M. B.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 587.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 258 (10 VI 1907, leg. Asdurian!).
429. **Salvia cæspitosa Montb. et Auch.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 599.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 259 (10 VI 1907, leg. c. s.!).
 Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Եղեսբակ - pr. yeghesbag. Il P. Alishan, (nello Hai. Pss.) fa derivare la voce armena dalla parola gr. Ελειςφαχον, mentre il P. Katciuni nel suo diz. fa derivare la parola latina Salvia da *salvare* = փրկիլ, perchè la pianta ha delle qualità salutari per certe malattie; nella prov. di Musch il volgo chiama Տարակ - pr. dadrag le varie specie di Salvia; nello Hai Pss. anche Ըստու Եղու - pr. eghdu lesù = lingua di cammello. Il racc. Asdurian dice che questa specie è rarissima sulle montagne, gli indigeni di Elbistan la chiamano Չայ - pr. ciaj = thè ed usano come il thè.
430. **S. acetabulosa Vahl** var. **simplicifolia** Boiss. Fl. or., IV, p. 608.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 260 (10 VI 1907, leg. c. s.!). Confrontata con i num. 88 (*sub S. acetabulosa*) e 206 (*sub S. tauricola*, sinonimizzata con la nostra dal Boissier) distribuiti dal Kotschy e con il n. 10 dell'«It. syriac., a. 1855» (*sub S. Moluccella* Bth.) che è appunto la var. *simplicifolia* da noi studiata.
 Nom. volg. sec. il racc. Asdurian, in turco Ճուպա - pr. giolba.
431. **S. glutinosa L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 609.
 Arm. transc.: Satrel nel Piccolo Caucaso (27 V 1910, leg. Rostom. !); Arm. centr.: Warto (1911, leg. Surmagh. !); Ponto: Trebisonda presso il vill. Mala (27 VIII 1889, leg. Khushb. !), n. 261. Nom. volg. sec. il racc. Khushbulian nel villaggio Mala e nel Ponto Մեղրթեր - pr. meghrter; il P. Katciuni adopera la voce Եղեսբակ սաղակերպ - pr. ieghesbak osdghagherb; sec. il racc. Surmaghian nella prov. di Musch si chiama Մեղրի սաղակ - pr. meghri dadrag; il racc. Rostomian dice che nel distr. di Shavshett si chiama Մեղր ծաղիկ - pr. meghr dzaghik = fiore miele.
432. **S. syriaca L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 610.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 262 (6 VI 1907, leg. Asdurian!).
433. **S. Selarea L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 616.
 Arm. transcauc.: Artwin nell'altura detta Ovaintz Mesire a circa 650 m., n. 588 (28 VII 1910, leg. Diratz.!).
434. **S. Aethiopis L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 616.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 263 (10 VI 1907 leg. c. s.!). — Corrisponde ai saggi armeni distribuiti da Huet du Pavillon nelle «Plant. or. exsicc.».

435. **S. ceratophylla** L. — Boiss. Fl. or., IV, p. 617; Un. Itin. ed Hohen. a. 1836.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 264 (10 VI 1907, leg. c. s.!).
 Nom. volg. sec. il racc. Asdurian, in turco Եւրակլը - pr. *yalunci*, e dice che dal fiore si fa decotto contro la tosse.
436. **S. candidissima** Vahl. — Boiss. Fl. or., IV, p. 621 = *S. odorata* W., Jacq. fil. Ecl., I, p. 26, tab. 16! = *S. armena* Koch in Linnaea, XXI, p. 654.
 Arm. cilic.: Zeitun sul Kabak - Tepé, n. 496 (1908, leg. Mergiand.!).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Եղեսպակ ամենասպիտակ - pr. *ieghesbag amenasbidag*.
437. **S. verticillata** L. — Boiss. Fl. or., IV, p. 634.
 Arm. transcauc.: comune nei dintorni di Artwin (1910, leg. Diratz.!); ed a Mamanelis nel Piccolo Caucaso (27 VII 1910, leg. Rostomian!); Arm. centr. a Musch e Warto (leg. c. s.) Ponto: Trebisonda, presso il villaggio Mala, (17 VII 1889, leg. Khushb.).
 Nom. volg. adoperato sec. il racc. Khushbulian, dai contadini di Mala Կմսառ կամ Տմսառ - pr. *Gmnsdash, dmnsdash*; nel distr. di Shavshett, sec. il racc. Rostomian, Կապոյտ ծաղիկ - pr. *gabuyd dzaghik* = fiore azzurro.
438. **Nepeta racemosa** Lam. — Boiss. Fl. or., IV, p. 660; Ky. It. cilic.: - kurd. 1859, n. 686.
 Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse (20 V 1907, leg. Minassian!); Arm. centr.: distr. di Warto (1908, leg. Surmagh!), n. 266. Distribuita di questa seconda provenienza dal Kotschy nell' Essiccata s. c.
 Nom. volg. del genere sec. P. Alishan (nel Sissouan) կատուախուս - pr. *Gaduakhod* = erba di gatto, nello Hai Pss. կատուակիսան - pr. *Gaduag Khod*, nel diz. di Lusignan, Nèpète կատուականջ - pr. *gaduagantch* = orecchio di gatto; nel diz. Katicuni, Nèpète o Cataire կատուի խոս, in turco Քեսի օրու - pr. *Kedi otu*. Il racc. Minassian scrive per questa specie Ծծուկ - pr. *dzdzuk*, nello Hai Pss. esiste Ծծուկ perciò, secondo noi, Ծծուկ (*succhiatile*) è ammissibile per il nome generico.
439. **N. Mussini** Hoek. — Boiss. Fl. or., IV, p. 660.
 Arm. pers.: distr. di Ardaz, n. 497 (1908, leg. Minass.).
 Nom. volg. scritto dal racc. H. Minassian Մարիամայ ծաղիկ - *Mariama dzaghik* = fiore di Maria.
440. **N. cyanea** Stev. — Boiss. Fl. or., IV, p. 656.
 Arm. transcauc.: Artwin sulle mura della fortezza, n. 498 (13 VII 1910, leg. Diratz!). Corrisponde a saggi della Persia bor. distribuiti dallo Szovitz e conservati nell' Erb. Gen. di Padova.
441. **N. leptantha** Boiss. et Haussk. — Boiss. Fl. or., IV, p. 648.
 Arm. cilic.: Zeitun sul Berty-Dagh, n. 499 (1908, leg. Mergiand.). Proviene dallo stesso monte dove fu scoperta dall' Haussknecht ed illustrata nell' opera s. c.
 Nom. volg. sec. P. Alishan, nel suo Sissouan, կատուախոս նրբածաղիկ - pr. *Gaduakhod nrpadzaghik*.

442. **Hyssopus angustifolius M. B.** == *H. orientalis* W. == *H. caucasicus* Spr. == *H. off. β angustifolius* Boiss. Fl. or., IV, p. 584. Cfr. **Tabula nostra** VI, fig. 3.
 Arm. transcauc.: Passen infer ad Ak-kilisse, n. 593 (1908 leg. Minassian!). — Confrontato con la pianta europea (Cfr. tab. s. c. fig. 1-2) differisce a prima vista per i fusti sottili e ad internodi più allungati, per le foglie strettamente lineari, allungate, rivoltate ai margini, per lo spicastro allungato e lasso a verticillastri brevemente peduncolati, per le brattee linearisubulate, per il calice dopo l'antesi manifestamente rigonfio in corrispondenza della fauce e con i denti più strettamente lanceolato-lesiniformi.
 Boissier (*op. c.*) asserisce esistere probabilmente intermediari che noi non conosciamo ma, pel complesso dei caratteri, proponiamo considerarla quale specie a se' con probile significato di vicariante geografica.
 Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Զոբ - pr. Zoba, Աշիկ - pr. mshdik.
443. **Lallemantia peltata** (*L. sub Dracocephalo*) F. et M. — Boiss. Fl. or., IV, p. 674.
 Arm. centr.: distr. di Warto, n. 501 (1911, leg. Surmagh.).
 Il nom. volg. per questo genere adoperato nei diz. è la traduzione della parola (in fr.) *Dracocéphale*, e appunto prima di tutti il P. Kateuni lo nomina Ախաղագլուխ - pr. *risabaklukh*.
444. **L. iberica** (M. B. *sub Dracocephalo*) F. et M. — Boiss. Fl. or., IV, p. 674.
 Arm. centr.: distr. di Warto, n. 502 (a. et teoll. ut s.).
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Կակա՞ - pr. *gashga*.
445. **Scutellaria orientalis** L. var. **pinnatifida** Boiss. Fl. or., IV, p. 682.
 Arm. cilic.: Zeitun sul Kabak-Tépè, n. 503 (1908, leg. Mergian!).
 Nom. volg. adoperato dal P. Alishan, nel suo Sissouan, Սկուլել - pr. *scudghi*, e per questa specie Ո. արևելկան - pr. *S. arevelian*, ma il P. Kateuni adopera la voce Պնակախոս - pr. *bngakhod*, vedi nel suo diz. *Scutellaire* e *Toque*.
446. **S. peregrina** L. var. **Sibthorpii** Boiss. Fl. or., IV, p. 688; S. et Sm. Fl. græc. tab. 582 [*sub S. peregrina*.]
 Arm. cilic.: Zeitun a Kabak-Tépé, n. 504 (1908, leg. Mergiand.).
447. **Brunella vulgaris** L. — Boiss. Fl. or., IV, p. 691.
 Arm. transcauc.: Artwin nell' altura detta Imara Tragara (30 VII 1910, leg. Diratz!) e Passen inf. ad Ak-kilisse (1908, leg. Minassian!), n. 505.
 Nom. volg. generico adoperato dal P. Kateuni Թիմեն - pr. *themi*, che è la traduzione della voce fr. *Brunelle*.
448. **B. laciniata** L. — Boiss. Fl. or., IV, p. 692. [*sub B. alba* Pall.].
 Arm. centr.: dintorni di Gumgum, n. 506 (1910, leg. Surmagh!).
449. **Marrubium heterodon** Boiss. et Bal. Diagn. II, 4, p. 52 et Boiss. Fl. or., IV, p. 699.

- Arm. cilic.: Zeitun sul Beryt-Dagh, n. 506 (1908, leg. Mergiand!). Corrisponde, per quanto gli esemplari da noi studiati manchino di fiori, al n. 3. 3e. 225b. dell' Essiccata di Kotschy «It. cilic. in Tauri Alpes «Bulgar Dagh», distribuito sotto il nome di *Marrubium velutinum* Sibth. var. *heterodon* Benth. Nulla ha da vedere con il vero *M. velutinum* di cui vedemmo saggi autentici della Grecia (Orphan. Fl. gr. exsicc. n. 431, Guicciardi, Spruner ecc.). Nom. volg. del genere sec. le op. Sissouan e Hai Pss. Մեղրածուծ – pr. *megradzudz*, che significa anche *Melilotus*, perciò il P. Katsiuni, nel suo dizionario preferisce la voce Հոտիսոյ – pr. *Hodisso*, lo chiama anche Խորսակ ծոթրին, Հանիսոս. Հանշուելք, ed in turco Եղիսակ – pr. *engidel* e sec. il racc. Asdurian, Ճեղիսակ – pr. *Gennet deoshei*.
450. **M. parviflorum** F. et M. — Boiss. Fl. or., IV, p. 704.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 267 (primavera 1907, leg. Asdurian!).
451. **Stachys silvatica** L. — Boiss. Fl. or., IV, p. 726.
Ponto: Trebisonda presso il villaggio Mala, n. 268 (20 VIII 1889, leg. Khushb.). Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Եղնախոռն, Եղնախոս, Արեգախոռն – pr. *iesnakhorn*, *iesnakhod*, *apeghakhod*. Il P. Katsiuni nel suo dizionario (vedi *Stachide*) adopera Խորիկ – pr. *Khorik*. e rileva che certi autori scambiano Stachys con *Stéchas* = Եղնախոռն. Il diz. Lusignan, mette in fr. *Stachyde* = Հավարոյս dalla voce fr. *épiaire*, e *արեգախոռն*; il racc. Khushbulian indica la specie Կուրի Եղինձ – pr. *guri ieghinge*.
452. **St. lavandulæfolia** Vahl. — Boiss. Fl. or., IV, p. 743; Ky. It. cilic. – kurd. in Tauri Alpes «Bulgar Dagh» n. 446!
Ponto: Grom sulle pendici delle montagne pontiche (1910, leg. Parghent.); Arm. cilic.: Elbistan, (5 VI 1907, leg. Asdurian!) e Kabak-Tepé presso Zeitun (1908, leg. Mergiand.); Arm. centr.: distr. di Warto (1911, leg. Surmagh.); Arm. pers. nel distretto di Ardash (1908, leg. Der Minassian!), n. 269. — Specie insigne quanto all' abito vegetativo abbastanza variabile, ma costante nei caratteri fiorali.
Nom. volg. sec. il P. Alishan, nel Sissouan, Եղնախոս Եղնախոսի մերկուր. Il racc. Asdurian scrive, in turco, Տաղ լայր – pr. *dagh cai*; si usa come il thé.
453. **St. pubescens** Ten. — Boiss. Fl. or., IV, p. 245.
Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse n. 507 (1908, leg. Minassian!).
454. **Galeopsis Ladanum** L. var. **angustifolia** Wallr. (pr. sp.). — Boiss. Fl. or., IV, p. 752.
Arm. transcauc.: dintorni di Artwin, n. 508 (VII-VIII 1910, leg. Diratz.). Nom. volg. del genere adoperato dal P. Katsiuni nel suo diz. Կապուակն, che è la traduz. della voce greca γάλης λασπον = gatto չփէս մեսութիւն = vista, ma per la specie scrive Եղիշ կարմիր – pr. *ieghige garmir*, che corrisponde alla voce fr. *Ortie rouge*.

455. **Leonurus Cardiaca L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 253.
 Arm. transcauc.: dintorni di Artwin, n. 509 (7 VII 1910, leg. c. s.).
 Nom. volg. del genere, sec. il diz. Katicuni, Առիծազի, Առիծազանչ — pr. *ariudzaki*, *ariudzagantch*, dal greco λέων *առիծ* = leone, οὐρά *աղի* = coda, oppure οὔς, ὄτες *ականչ* = orecchio.
456. **Lamium striatum S. et Sm.** Fl. Gr. VI, p. 46, tab. 557; Boiss. Fl. or., IV, p. 757.
 subsp. **reniforme** (Montbr. et Auch.) **Boiss.** op. c.
 — α **glabrum** Bég. et Diratz. Cfr. **Tabula nostra** VII, fig. 6-8 et Kotschy «It. cilic. - kurd. 1859, Plant. in montibus Kassan Oglhu ad pagum Gorumse lectæ, n. 166 [sub *L. reniformi*]!» — Arm. cilic.: Beryt-dagh (1908 VIII, Mergiand!). Coll. n. 270a.
 β **pubescens** Bég. et Diratz. Cfr. **Tabula nostra** VII, fig. 5 et Kotschy «It. Syr. 1855. Circa Zebdaine prope Damascus, n. 55 [sub *L. reniformi*]» — Arm. cilic.: Kabak-Tepè (1912 IX Mergiand!) e Beryth-Dagh (IX 1908, leg. Mergiand!); Elbistan (6 VI 1907, leg. Asdurian!). Coll. n. 270 b.
 Sono due variazioni strettamente affini e collegate da intermediari. Sta il fatto che esse crescono promiscue sul Beryt-Dagh e che la seconda si ricollega con il genuino *L. striatum* della Flora Greca.
 Nom. volg. del genere è լողիսմայր — pr. *ieghingemair*; nel diz. Lusignan alla voce *Lamier* corrisponde լոնեղիճ — pr. *lsneghidge*.
457. **L. microphyllum** Boiss. Diagn. ser. I, 5, p. 25 et Fl. or., IV, p. 759. — Cfr. **Tabula nostra** VII, fig. 1-4.
 Arm. cilic.: Zeitun sul Beryt - Dagh, n. 510 (Agosto 1908, leg. Mergiand!). — Corrisponde agli autotipi Boissieriani raccolti in Caria nel 1843 (leg. C. Pinard in Hb. Centr. Flor.). A prima vista potrebbe confondersi con la forma glabra di *L. reniforme* (cfr. n. 210a.), ma se ne distacca per le foglie cuneate alla base ed a denti più superficiali, non che per i denti calicini più brevi e più larghi alla base, bruscamente acuminati. Per quest'ultimo carattere ricorda *L. veronicæfolium* Benth. (— Cfr. **Tabula nostra** VII, fig. 9) ma se ne distingue per il labbro superiore che è troncato-retuso e non profondamente bifido come in quello.
458. **L. tenuiflorum** F. et M. — Boiss. Fl. or., IV, p. 759.
 Arm. transcauc.: dintorni della fortezza di Artwin, n. 511 (13 VII 1910, leg. Diratz!) — Saggi mancanti di corolla e quindi da sottoporre ad ulteriori esame su materiale più completo.
 Nom. volg. լողիսմայր, նրբածաղիկ — pr. *ieghingemair*, *nrpadzaghik*.
459. **L. amplexicaule** L. — Boiss. Fl. or., IV, p. 760.
 Arm. pers.: Khoy, n. 271 (14 IV 1907, leg. Der Minass!).
 Nom. volg. լողիսմայր յօղնապատ — pr. *ieghingemair tzognabad*.
460. **L. eriocephalum** Bth. in DC. — Boiss. Fl. or., IV, p. 762.
 Arm. cilic.: Zeitun sul Kabak-Tepè, n. 272 (22 VII 1907, leg. Mergiand!). — Corrisponde agli esemplari distribuiti dal Kotschy sotto il num. 114, 157a, 210 dell'«It. cilic. in Tauri Alpes Bulgar - Dagh».

- Nom. volg. sec. il P. Alishan (nel Sissouan), **կունճայր սարսագուղի** – pr. *i. assraclugh*.
461. **L. album L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 763.
 Arm. pers.: dintorni di Khoy, n. 512 (1908, leg. Der Minass.). — Corrisponde alla pianta distribuita dal Kotschy nel n. 92 dell' «It. cilic. - kurd.» ed ambedue si distaccano dalla pianta italiana per il minore sviluppo, sia degli organi vegetativi, che di quelli fiorali.
 Nom. volg. **լ. սպիտակ** – pr. *i. sbidag*.
462. **L. tomentosum W.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 364.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 273 (10 VI 1907, leg. Asdurian!).
463. **Ballota nigra L.** var. **meridionalis Bégl.** in Fi. Paol. e Bégl. Fl. An. d' lt. III, p. 39 = *B. nigra* Boiss. Fl. or., IV, p. 775 pr. p. Arm. transcauc.: Artwin a Balgiuntz Aghpiur (14 VII 1910, leg. Diratz!); Arm. centr.: distr. di Warto (1911, leg. Surmagh.), n. 513.
 Nom. volg. del genere, sec. Hai Pss. ed altri **Պոսոխ** – pr. *brashk*.
464. **Phlomis armeniaca W.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 783.
 — α **typica** — Arm. cilic.: Elbistan, n. 274a (6 VI 1907, leg. Asdurian!). — È la forma caratterizzata da foglie ellittiche bruscamente ristrette in picciolo, cordiformi o cuneiformi alla base e vi riferiamo i seguenti saggi conservati nell' Erb. gen. di Padova: *ad pagum Gungum frequens alt. 4600': Ky. It. cilic. - kurd. 1859, n. 415; subalpina Amani versus Akma Dagh incolit frequens alt. 5000': Ky. Pl. Syr. bor. ex Amano pr. Beilun 1862, n. 78; Persia borealis: Szocits!; in prolicibus aridis saxosis prope Tarbum. Georgiae Cauc. Un. Itin. 1836, ed Hohnacker.*
 — β **lanceolata Boiss.** et **Hoh.** Diagn. I, 5, p. 36 (pr. sp.). — Arm. cilic.: Zeitun sul Beryt - Dagh, n. 274b (1908, leg. Mergiand.). — È la forma a foglie lanceolate attenuate insensibilmente in lungo picciolo ed alla quale riferiamo gli esemplari raccolti dal Kotschy nella prov. Musch nel gruppo del Bingöl «*in valle Merga Sank alt. 7000'*» e distribuiti nel n. 401 dell' «It. cilic. - kurd., 1859» [sub *P. lanceolata* var.!]
 Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. **Բաղեղ** – pr. *paregh*; nel diz. P. Katicuni adopera **Փողիս** – pr. *plomis*; nel diz. Lusignan anche **Խոնդուկ** – pr. *khrnduk*; per questa specie nello Hai Pss. troviamo **Բ. Հայկական** – pr. *p. haigagan*. Il mittente Asdurian scrive, in turco, **Չարփա յիշիյ?** – pr. *cialba cicci*.
465. **Ajuga orientalis L.** var. **condensata Boiss.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 800.
 Arm. pers.: Khoy, n. 514 (1908, leg. Der Minass.). Corrisponde agli esemplari distribuiti da Kotschy nel n. 108 dell' «It. cilic. - kurd., 1859» e raccolti nella Cilicia sul Tschosch Dagh.
 Nom. volg. del genere adoperato dal P. Alishan nel suo Sissouan **Ճնուկ** – pr. *dznug*; nel lib. di Menev. e nel diz. Lusignan, **Ճանկիսառ, Ճճուկ** – pr. *gianghkhod, dzdzug*.

466. **A. Chia** (Poir. *sub Teucrio*) **Schreb.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 802.
 Arm. cilic.: Zeitun sul Beryt-Dagh, n. 515 (1908, leg. Mergiand!).
 Nom. volg. adoperato, dal P. Alishan, nel Sissouan Թնող Քիւ-
 ցի – pr. *dznug chiatzi*; il mittente Asdurian scrive in turco,
 Մայասէլ օթու (?) – pr. *maiasel otu*, e dice adoperarsi come me-
 dicina insieme al tabacco.
467. **A. Chamæpitys** (L. *sub Teucrio*) **Schreb.** — Boiss. Fl. or.,
 IV, p. 802.
 Specie polimorfa nel cui ciclo comprendiamo le seguenti varie-
 tà e forme:
 — α **typica**. — È la pianta più largamente distribuita in Italia ed
 è caratterizzata per essere coperta da lunghi e fitti peli pa-
 tenti e come tali non la rinvenimmo nel materiale armeno sin
 qui a noi comunicato.
- β **glabra Presl** (pr. sp.). — È la forma glabra o glabrescente
 che ci fu inviata da Ak-kilisse (Passen Inferiore) dal R^o. Basilio
 Minassian (20 V 1907), n. 275a.
- γ **levigata** (Russ. *sub Teucrio* non Vahl) **Boiss.** op. c. (pr.
 sp.). — Ci furono comunicati saggi dalla Sir. bor. e precisam.
 da Aintab (1906, leg. Khatciad!) corrispondenti agli esemplari
 distribuiti dal Kotschy nel n. 277 dell' «It. cilic. - kurd. TanriAl-
 pes Bulgar-Dagh» [*sub A. glabra Presl.*] e conservati nell' Erb.
 di Padova. Differisce dalle precedenti per essere pianta del tutto
 glabra, per i denti del calice più stretti e la corolla un pò più
 grande. Non crediamo tuttavia debba considerarsi quale spe-
 cie a sè. Coll. n. 275b.
 Nom. volg. sec. il racc. Minassian Խորասանի – pr. *khorassani*.
468. **Teucrium multicaule** **Mont.** et **Auch.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 807.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 276 (3-10 VI 1907, leg. Asdurian!).
 Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Լեռախօծ – pr. *lertakhod*,
 Զարօշ – pr. *sarosh*, Ղենարար – pr. *ghenarar*, Գենի կաղնի, –
 pr. *kedni gakhni*, ecc. in fr. *Germandrée*, in turco պհլկանքի –
 pr. *kemendris*, բամբակ – *bumbamk*:
469. **T. orientale** **L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 808.
 Arm. transcauc.: tra Artwin ed Ardanoutch e nell' antica fortezza di Ardanoutch (8 e 10 VIII 1910, leg. Diratz!); Arm.-centr.: distr. di Warto, (1911, leg. Surmaghian!), n. 515 e Musch, (1908, leg. Gindoian!), n. 515 bis. I saggi delle tre prime loca-
 lità corrispondono a quelli distribuiti nelle «Pl. Or. exsicc.» di Ispir (Armenia) da Huet du Pavillon e sono da riferire alla var. *brachyodon* Freyn in Bull. Herb. Boiss. 2a ser. I (1901), p. 283; quelli della quarta appartengono ad una forma a fusto glabrescente quale fu distribuita da Kotschy nell' «It. cilic.-kurd. 1859 (prov. Musch), n. 375» qui avvertendo che in questa es-
 siccata l'A. ha pure distribuito esemplari a fusto peloso, tutti però con denti calicini lineari, lesiniformi, molto allungati!
 Nom. volg. sec. Hai Pss. Լ. արելիան – pr. *l. arevelian*.
470. **T. procerum** **Boiss.** et **Bal.** Diagn. II, 4, p. 56 et Boiss. Fl.
 or., IV, p. 809.

Arm. transcauc.: distr. di Shavshett nel Piccolo Caucaso, n. 516 (1910, leg. Rostomian!).

Nom. volg. sec. il P. Alishan, nel Sissouan, Գառօշ բարձրածայր - pr. Sarosh partzradzajr; sec. il racc. Rostomian, in turco, ԵՐ-ՄԱՆ օթու - pr. ielan otu.

471. **T. parviflorum Schreb.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 810.
Sir. bor.: Aintab, n. 277 (1906, leg. Khatciad.). Noto già dai tempi boissieriani per questa località, Aleppo ecc.: cfr. Auch. n. 1597, Hausskn., Ky. n. 225!).
472. **T. Chamædrys L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 816.
— α **typicum** — Arm. transcauc.: dintorni di Artwin (VII-VIII 1910, leg. Diratz.!) e nella fortezza di Ardanutch (8 VIII 1910, leg. Diratz.!); Arm. cilic.: a Kabak - Tépè, e Beryt-Dagh ecc., n. 278a.
— β **canum** (Fisch. et Mey.) **Boiss.** — Arm. cilic.: Zeitun a Kabak-Tépè, n. 278b (1908, leg. Mergiandish.).
Nom. volg. sec. il diz. Katciuni, Լեռդախոս բժշկական, Գետնի կաղնի - pr. fr. lertakhod pjichgagan, kedni gaghni; sec. il P. Menev. Բուն լեռդախոս - pr. pun lertakhod.
473. **T. Polium L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 821.
— α **angustifolium** (Mill. sub *Polio*) = *T. Polium* α *vulgare* Boiss. p. p. — Arm. transcauc.: Pkhikur nel Piccolo Caucaso (25 IX leg. Rostamian!) e Passen inf. ad Ak-kilisse (1908, leg. Minassian!), n. 279a. I secondi esemplari mostrano i fusti floriferi latifogliari, gli sterili con fg. più strette e convolute!
— β **latifolium** (Mill. sub *Polio*) = *T. Polium* α *vulgare* Boiss. p. p.
— Arm. transeauc.: Artwin nell' antica fortezza armena di Ardanoutch (8 VIII 1910, leg. Diratz.!); Arm. centr.: dintorni di Musch (1908, leg. Gindoian!) e di Warto (1908, leg. Surmagh.!); Arm. cilic.: Zeitun sul Beryt-Dagh (1908, leg. Mergiand!). n. 279b.
Nom. volg. sec. il racc. Surmaghian Խորասանի - pr. khorassani. il racc. Asdurian scrive in turco, սաղ բայր - pr. dagh ciai == thè di montagna, e dagli indigeni si usa come il thè.
— γ **hirsutum Benth.** (= *T. aegyptiacum* Pers.?) Rchb. Ic. XVIII, tab. 37 fig. 5. — Arm. cilic: Zeitun a Kabak-Tepè, n. 279c (1908, leg. Mergiand.).)

ACANTHACEAE

474. **Acanthus Diocoridis L.** var. **grandiflorus** Borm. in Mitt. d. Thüring. Bot. Ver N. F. Heft VI (1894), p. 67, Heft X (1897), p. 65 = *A. Diocoridis* subsp. *Diocoridis* v. *Boissieri* Freyn in Bull. Herb. Boiss., IV (1896), p. 140 non Hausskn. in Sitz.-ber. d. bot. Ver. f. Gesamt-Thür. (in Mitt. d. Geogr. Ges. Thür., VI [1886], p. 62) = *A. Diocoridis* Boiss. Fl. or., IV, p. 521 (p. p.). Arm. centr.: distr. di Warto, n. 517 (1908, leg. Surmagh.!). — Sul polimorfismo della specie nei paesi orientali si confronti specialmente il Freyn op. c..

Nom. volg. sec. il diz. Kaciuini Ականթ - pr. *agant*, vedi ivi *Acanthe* e la fig. 7, in francese *Branc-mrsine* = Արջամազի; vedi anche *berce* = Ականթ վայրի; sec. Hai Pss. Կաղնակ (?) - pr. *gaghshnag*, Աղեկասիկ (?) - pr. *aghegadig*. Il racc. Surmaghian lo chiama (sec. il dialetto di Musch) Մաքու թուշ - pr. *makù tush*.

LOBULARIACEAE

475. **Globularia trichosantha Fisch. et Meyer.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 529; Jaub. et Spach Illustr. tab. 259B.
Arm. cilic.: Beryt-Dagli, n. 519 (1908, leg. Mergian.!). Individui senza fiori e quindi determinazione rimasta dubbiosa.
Nom. volg. del genere adoperato dal P. Kaciuini nel suo diz. Գնդակաբոյս - pr. *kntagapnis*; nello Hai Pss. Հանդապուղ (?) - pr. *hantaghvugh*.

PLANTAGINACEAE

476. **Plantago major L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 878.
Arm. transcauc.: dintorni di Artwin (14 VII 1910, leg. Diratz.!) ed a Shavshett nel Piccolo Caucaso, 1911, leg. Rostom.!); Arm. centr.: distr. di Warto (1911, leg. Surmag.!) e Musch (1908, leg. Gindo!); Arm. cilic.: Zeitun sul Kabak - Tepé (30 VIII 1907, leg. Mergiand.!), n. 280 e n. 281. — Questi ultimi saggi volgono a *P. asiatica L.* ricondotta dai moderni a varietà di *Pl. major* e compresa certo nella var. *minor* Boiss. op. c. cui riferiamo i saggi raccolti da uno di noi (Diratzonyan) nei boschi montuosi a tre ore da Artwin.
Nom. volg. del genere, sec. Hai Pss. ed altri, Ջախոս - pr. *cenghakhod*, Ջախոս - pr. *celakhod*, in turco սինիր օրու - pr. *sinir otu*; nel diz. Lusignan anche ջախոսիկ, ջախոսփ, կաթնկոռնի, ազգ գառնախեզուի. Il P. Alishan nel Sissouan e il P. Kaciuini nel suo diz. avevano usato Գառնախեզու - pr. *karnalesù*; nello Hai Pss. si trovano come sinonimi Գաղտիկ, Գաղտիկուս, Գաղտնակոր, i quali valgono pel nome generico di Borrago. Per la specie *major* il P. Menev. scrive Մեծ ջախոս; il P. Kaciuini Գառնախեզու մեծատերև, Եզնալեզու; (il Dr. Artignan Եզան լեզու - pr. *iesan lesù*, սրդը սիլի nomina la sp. *plantain moyen*); il racc. Surmaghian scrive Ջախթիկ - pr. *ceghatpik* e che è adoperata come medicina contro le piaghe; e finalmente il racc. Asdurian nomina Ջախոս, in turco զրու սինիր, պաղ եպրազը ecc.
477. **P. montana Huds.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 881.
Pont.: dintorni di Trebisonda (1908, leg. Shaban.!), n. 519.
Nom. volg. sec. il lib. di Menev. Երբասիկ ջախոս - pr. *nrparerer eighakhod*, e sec. il racc. Shabanian Բողկուկ - pr. *poghgug*.
478. **P. lanceolata L.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 881.
Comune in tutta l'Armenia. Ne studiammo saggi dei dintorni di Artwin (Diratz.!), distr. Shavshett nel Piccolo Caucaso, del

Passen infer. ad Ak-kilisse, di Gumgum, di Elbistan e di Khoy. Col tipo e più frequente di questo (istruttivi esemplari di Artwin) vi è la var. *sphaerostachya* M. et K. in Röhl. (= *P. lanc. & capitata* Presl sec. Boiss.) ora a fg. glabre ed ora a fg. più o meno lanuginose facente passaggio alla var. *dubia* (L.) ed a *Pl. lanc.* λ *eriophylla* Decs. sec. Boiss. -- Coll. n. 282. Nom. volg. sec. il racc. H. Minassian, nel dialetto di Salmasd e di Khoy Գիղախոս, եղան լեզու - pr. *cighakhod, iesan lesu*, in turco ئەلەگە ئەپسۇ - pr. *Ghelige otu* == erba spada.

RUBIACEAE

479. ***Rubia tinctorum* L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 17.
Arm. centr.: dintorni di Musch, (1908, leg. Gindoian!) e di Varto (1911, leg. Surmagh!), n. 520.
Nom. volg. del genere sec. gli autori ed il racc. Surmaghian Տորոն - pr. *doron*, in turco Քէօր պօյար, Գըզը պօյա - pr. *keok bojası, kesel boja*; per la specie il P. Menev. scrive Վայրի տո-ռոն - pr. *vairi doron*.
480. ***Galium erectum* Huds.** — Boiss. Fl. or., III, p. 54.
Arm. transcauc.: rovine di Ani (1900, leg. Basmadgian!), n. 282. Confrontato con i n. 95 (*sub G. Beilanense*) e 126a. (*sub G. Amani*) degli Exsiccate di Kotschy e col n. 558 della Fl. græc. exsicc. di Orphanides, crediamo debba ricondursi nel ciclo di *G. Mollugo*.
Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Կողան, կողուս - pr. *Gbcian, gbeind* - che si attacca; nel Sissouan Կորածի-խոս - pr. *gdradzi khod*, nel lib. di P. Menev. si trova Մածնի - madzni; nel diz. Lusignan in fr. *Gaillet* o *Caille-lait* Քրմեղ - pr. *krkmegh*; nel diz. Katciuni Կոթնխոս, կորածի խոս.
481. ***G. orientale* Boiss.** Diagn. ser. I, 3, p. 38 et Fl. or., III, p. 56.
— α ***elatius* Boiss.** — Arm. cilic.: ad Elbistan (4 VI 1907, leg. Asdurian!); Arm. transcauc.: fortezza di Artwin (20 VII 1910, leg. Diratz.), 285.
— β ***latifolium* Boiss.** — Arm. cilic.: ad Elbistan (6 VI 1902, leg. Asdurian!), n. 286.
Nom. volg. sec. P. Alishan (nel Siss.) Կորածի-խոս արեւելեան.
482. ***G. verum* L. var. *consanguineum* Boiss.** Fl. or., III, p. 62.
= *G. consanguineum* Boiss. Diagn. ser. I, 6, p. 69.
Ponto: Groni sulle pendici delle montagne pontiche (1911, leg. Pargent.!) n. 521. Corrisponde per la forma e la glabrizie delle foglie, ma i frutti sono, come nel tipo, minutamente pubescenti!
Nom. volg. sec. il lib. di Menev. Բուճի մածիկ կամ կարևիսոս (Աս-կարգախոս):
483. ***G. tricorne* With.** — Boiss. Fl. or., III, p. 67.
Arm. cilic.: Elbistan (10 VI 1907, leg. Asdurian!), n. 287.
484. ***G. aparine* L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 68.

- Ponto: dint. di Trebizonda (16 VII 1889, leg. Marimian!), n. 288.
 Nom. volg. sec. il racc. Marimian ed Hai Pss. Կպշող - pr. *gbeıug*, in turco Եափըզան? - pr. *iapeshcan*; sec. il lib. di Menev. Մագլող մածնի կամ կպշող.
485. **G. cruciatum** (L. *sub Valantia*) Scop. — Boiss. Fl. or., III, p. 79.
 Arm. pers.: dintorni di Ardaz (1908, leg. Der Minass.), n. 522.
486. **G. humifusum** (Willd. Sp. pl. IV [1805] p. 949, *sub Valantia*)
Bég. et Diratz. n. comb. == *Cruciata orientalis glabra humifusa* Tourn. Coroll. p. 4, fide Willd. non Buxb. Cent. pl. V, p. 47, tab. 39. == *G. coronatum* S. et Sm. var. *glaberrimum* DC. == *G. coronatum* Boiss. saltem ex p. — Cfr. **Tabula nostra** VII, fig. 1.
 Arm. cilie.: Elbistan, n. 289 (4 VI 1907, leg. Asdurian!). — Boissier (Fl. or., III, p. 79) intese *G. coronatum* in senso molto largo comprendendovi la specie degli alti monti della Grecia (= *G. coronatum* S. et Sm. Prodr. p. 90 et Fl. græc. II, p. 19, tab. 125!), che per noi è una entità a sè; *G. tauricum* (Pall.) R. et S. che è forma a foglie distintamente nervose e peloso-ispide ed a frutto ispido e forse anche la nostra (?) sotto il nome di *G. coronatum* β *stenophyllum*, che si lascia distinguere per essere pianta glabrescente, per le foglie con nervi poco apparscenti e quasi glabre, rotondato - ellittiche, ottuse anche nei fusti fertili (e quindi non eterofilliche!) e per i frutti globosi glabri o quasi. Si impone, quindi, la reintegrazione al suo giusto valore della specie Tournefortiana - Willdenowiana, non constandoci che sia stata sin qui trasportata sotto il gen. *Gaulium*.
487. **Asperula arvensis** L. — Boiss. Fl. or., III, p. 30.
 Arm. cent.: distretto di Warto (1911, leg. Surmagh!), n. 283.
 Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Գետնի ասեղ. Գետնի ասեղ-զուղ - pr. *Kedni asdgh*, *kedni asdghuk*; nel diz. di Katschuni facendolo derivare dalla parola *asper* == խառուղ - pr. *khsdug*; nel diz. Lusignan ասպրիկ - pr. *asbrik*; nel lib. di Menev. Մարդա-մարու ? ecc.
488. **A. orientalis** Boiss. et Hoh. in Ky pl. exsicc. Jun. 1843; Boiss. Diagn. ser. I, 3, p. 30 et Fl. or., III, p. 31.
 Arm. centr.: distr. di Varto (1911, leg. Surmagh!); Arm. cilic.: Elbistan (6 VI 1907, leg. Asdurian!) e Sir. bor. ad Aintab (1906, leg. Khatiad.), n. 523.

CAPRIFOLIACEAE

489. **Sambucus Ebulus** L. — Boiss. Fl. or., III, p. 2.
 Arm. transcauc.: Mamanebis nel Piccolo Caucaso (27 VIII 1911, leg. Rostom.) e Ponto: dintorni di Trebizonda (1889, leg. Marimian et 1908 leg. Shabanian!), n. 290.
 Nom. volg. del genere (vedi Hai Pss.) è Թանթրուենի - pr. *tantrueni*, in turco Սիրովիր աղածը - pr. *mırıver aghadıgi*, in fr. *sue-*

- reau*; per la specie *Ebulus* nello Hai Pss. Ռնջուրա, — pr. *conciura* come scrive il racc. Marimian, mentre il racc. Shahanian scrive Ռնճուռա; nel lib. di P. Menev. troviamo Ակսոն կամ կարծարերձ թանթրուենի. Il racc. Rostomian, sec. il dialetto di Shavshett, scrive Անժիլ — pr. *andzil*.
490. **S. nigra L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 2.
Sir. bor.: Aintab (1906, leg. Khatciad.), n. 291.
Nom. volg. sec. il libro di Menev. Շամպուկ կամ Հասարակ թանթրուենի — pr. *shampug, hassarag tantrueni*.
491. **Viburnum Lantana L.** — Boss. Fl. or. III, p. 3.
Arm. transcauc. Mamanelis nel Piccolo Caucaso, n. 524 (27 IX, 1911, leg. Roston.).
Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Գետնասօս — pr. *kednassos*, nel Sissouan, Գերմաստի — pr. *kermasdi*; nel libro di Menev. Բոնչի — pr. *prnci*; nel diz. Lusignan in fr. *Viorne* = Ֆլիդ, Փոշի — pr. *mncegh, prshni*, in fr. anche *obier* o *Aubier*, nel diz. Katciuni Մթիղի — pr. *mnceghi*, nel diz. Lusignan = սփի — pr. *ropi*, finalmente P. Katciuni per *Viburnum* adopera la parola Վիբուռնի — pr. *ripurni*, e certi moderni nominano Զիմծաղիկ — pr. *tziundzagik*. Per la specie V. Lantana il P. Menev. scrive Գերմաստի — pr. *kermasdi*; il racc. Rostomian dice, in turco Գերմաշա — pr. *kermasha*.
492. **V. orientale Poll.** — Boiss. Fl. or., III, p. 4.
Arm. cilic.: Zeitun sul Beryt-Dagh, n. 526 (1890, leg. Mergiand.). Esemplare con sole foglie e quindi determinazione rimasta dubbia: non è certo V. Opulus L.!
493. **V. Opulus L.** - Boiss. Fl. or., III, p. 3.
Arm. transcauc.: presso Artwin nel luogo detto Shighenokhov infer. a circa 300 m., (30 VII 1910, leg. Diratz.); Ponto: dintorni di Trebisonda (1908, leg. Shaban.), n. 527.
Nom. volg. sec. il Sissouan di Alishan = Գերմաստի խեշակ; sec. il lib. di Menev. Հասարակ Բոնչի, osservando che non bisogna confondere con Փոշի, in turco դաղղըղակ աղաձր,
494. **Lonicera biflora Desf.** —
Sir. bor.: Aintab, n. 292 (1906, leg. Khatciad.). Non compare nella «Fl. or.» di Boissier e trattasi forse di pianta coltivata.
Nom. volg. del genere è Ճանկիկ — pr. *giankik*; il P. Katciuni adopera la parola Այծիսոս — pr. *aidzkhod*, in fr. *cherrefeille*, in turco Հանըմ էլի, հանըմ փերչէկի — pr. *hanem eli, hanem percisi* = mano di signora. Nel Sissouan il P. Alishan adopera Քօշագեղձ — pr. *Koshakeghtz*.

VALERIANACEAE

495. **Valeriana alliarifolia Vahl.** — Boiss. Fl. or., III, p. 85.
Arm. transcauc.: altipiano di Salalet sopra Artwin (alt. 950 m.), n. 527 (24 VII 1910, leg. Diratz.). — Corrisponde al n. 798 di Heldreich «Herb. græc. norm.»

Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Կատուի խոս կամ կ. գեղ և կամ կատուակծկունծ – pr. *gadui khod*, *g. tegh*, *gaduagzgundz* = erba di gatto, anche Ա. Գէորգի խոսիկ – pr. s. *Keorki khodik*; per la specie nel Sissouan è Մրուանսակ խսորասերեւի – pr. *mruandag khsdoradereri*; sec. il diz. Katciuni Մրու, Մրուան – pr. *mru*, *mruan*.

496. **V. leucophæa DC.** — Boiss. Fl. or., III, p. 91.
Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 293 (8 V 1907, leg. Minass.!).
497. **Valerianella Kotschyi Boiss.** Diagn. ser. I, 3, p. 60 et Fl. or., III, p. 110.
Sir. bor.: Aintab, n. 294 (1906, leg. Khatciad.!).
Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Աղպաղպուկ (Մրուանիկ) – pr. *aghpaghpuq* (mruanik), sec il P. Katciuni Հաւաղցան – pr. *havraghtzan*.
498. **V. vesicaria Mnch.** — Boiss. Fl. or., III, p. 112.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 295 (2 VI 1907, leg. Asdurian!).

DIPSACACEAE

499. **Morina persica L.** — Boiss. Fl. or. III, p. 114.
Ponto: Grom sulle pendici delle montagne, pontico armene, n. 529 (1910, leg. Parghent!).
Nom. volg. del genere adoperato dal P. Katciuni Մորին – pr. *morin*, nel diz. Lusignan in fr. *Morine* = մորինարոյս – pr. *morenapusis*.
500. **Cephalaria procera L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 121.
Arm. transcauc.: nelle alteure sopra Artwin, n. 530 (VII 1910, leg. Diratz!).
Nom. volg. del genere adoperato dal P. Alishan (nel Sissouan) Գլխունի – pr. *qlkhuni*, mentre il P. Katciuni nel suo diz. adopera Գլխենի – pr. *qlkheni*, facendo derivare dalla parola gr. χεφαλή = զլուի = testa.
501. **Knautia arvensis** (L. sub *Scabiosa*) Coul. — Boiss. Fl. or., III, p. 128.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 296 (I VI 1907, leg. Asdurian!). Da ulteriori studiare su materiale più abbondante ed istruttivo. Il nom. volg. del genere non abbiamo trovato nei libri e diz. che abbiano sotto mano. Nel diz. Lusignan *K. arvensis* = *Oreille d'âne* è tradotto in arm. իշագանչ – pr. *ishagantch*.
502. **Succisa pratensis Moench.** — Boiss. Fl. or., III, p. 130.
Ponto: Trebizonda presso il villaggio Mala, n. 297 (21 VII 1889, leg. Khushb.).
Nom. volg. sec. il racc. Khusbulian Երժըւուկ – pr. *dzrdzrug*, nello Hai Pss. Ճըժըւուկ è ritenuto corrisp. a Silene.
503. **Scabiosa Columbaria L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 131.

Arm. transcauc.: dintorni di Artwin, n. 531 (VII-VIII 1910, leg. Diratz!).

Nom. volg. del genere nel Sissouan e nello Hai Pss. è adoperato Քոսպուկ - pr. *Kosksug*. Nel diz. di Katchiuni anche Քոսպուս - pr. *kossapuis*, che deriva dalla parola lat. *scabies* = քոս; in turco ոչուզ օթու, զում օթու.

504. **SCABIOSA BALIANI** Diratz. n. sp. — Cfr. **Tabula nostra** IX, fig. 1-3.

Perennis, pilis longis adpressis canescens, caule simplici, unifloro, foliis surculturum sterilium oblongo-lanceolatis integris in petiolum longe attenuatis, radicalium caulinum fertilium integris vel lirato-pinnatisectis lobo terminali ovato maximo, caulinis basi subconnatis semper pinnatopartitis laciniis linearibus æqualibus omnibus tomento adpresso sericeo canis, capitulo magno, involuci phyllis lanceolatis hirsutis floribus radiantibus brevioribus, corollis cæruleis valde radiantibus, involucellis linearibus parte superiore villosissimis, corona subquindecim radiata erecta foveolis subæquilonga, calycis aristis nigris scabridis corona subduplo longioribus.

Ponto: Grom sulle pendici delle montagne pontico-armene, n. 532 (1911, leg. A. Parghent!).

Della sez. *Astrocephalus* ricorda *S. caucasica* M.-B. e *S. sulphurea* Boiss. et Huet differendo dalla prima per il tomento sericeo, per l'incisione delle foglie radicali dei fusti fertili, per le foglie caulinne sempre pinnatopartite ed a lacinie eguali, per le foglioline dell'involucro più brevi dei fiori del raggio, per la corona composta di un minor numero di raggi ecc. e dalla seconda per le foglie radicali spesso e sempre le caulinari incise, per i fiori azzurri non sulfurei, per le reste del calice non molto più lunghe della corona composta di un numero minore di raggi (circa 15, non 20-22) ecc.

La specie è dedicata al Sr. Hovhannes Balian che volle generosamente contribuire al lavoro sulla Flora armena.

505. **S. argentea** L. — Boiss. Fl. or., III, p. 139 [*sub Sc. ucranica* L.].
Arm. cilie.: Elbistan, n. 299 (10 VI 1907, leg. Asdurian!) — Specie, come scrive il Boissier «indumento et laciniarum forma valde variabilis»: la pianta cilicica corrisponde alla tav. 108 della «Flora græca» di Sibthorp e Smith e differisce un po' dalla forma crescente al Lido di Venezia riferita alla var. *alba* di Scopoli: su di che cfr. il n. 669 della «Fl. It. exsicc.». Sulle interpretazioni molte controverse date a *S. ucranica* L. e *S. eburnea* S. et Sm. rimandiamo a quanto ne ha scritto il Bertoloni nella «Fl. Ital., II, p. 60-61».

506. **Pterocephalus plumosus** (L. sub *Knautia*) Coul. — Boiss. Fl. or., III, p. 147.

Sir. bor.: Aintab, n. 300 (1906, leg. Khatciad.).

Nom. volg. adoperato dal P. Alishan, nel suo Sissouan, è Վարսպ - pr. *varsgadar*; nel diz. Lusignan anche Թերակլուխ - pr. *teraklukh*.

507. **Pt. Pinardi Boiss.** Diagn. ser. I, 5, p. 88 et Fl. or., p. 149.
 Arm. cilic.: Zeitun sul Kabak-Tepé, n. 298 (22 VIII 1908, leg. Mergiand.).
 Nom. volg. adoperato nel Sissouan, Ապրկատար Պինարտեայ:

CAMPANULACEAE

508. **Campanula crispa Lam.** — Boiss. Fl. or., III, p. 895.
 Arm. transcauc.: rara sulle rovine di Ani presso Kars e qui e cioè presso Kars scoperta dal Tournefort (= *C. orientalis foliorum crenis amplioribus et crispis flore patulo subcurrens*: Voyag. 2, p. 378 cum ic!). Inviatoci dal corrisp. G. Basmadgian (1900), n. 301.
 Nom. volg. del genere adoperato dal P. Alishan nel Sissouan a p. 182 կանթեղիս — pr. *gantegnidje*, mentre nell' elenco delle piante a p. 564 usa զանգակաղիկ — pr. *zancag dzaghik*, quest' ultimo vedi nello Hai Pss.; ivi vedi anche կաքռու — pr. *gakod*, parola usata nel Ponto e nel Khodurciur. Il P. Katciuni nel suo diz. adopera զանգիկ — pr. *zankik*, in turco չուն յիշկի — pr. *cian cicei*; per la *Famiglia* il P. Katciuni adopera զանցիկեայք, Զանգակածաղիկներ.
509. **C. alliarifolia W.** — Boiss. Fl. or., III, p. 902.
 Arm. transcauc.: dintorni di Artwin e di Gordzul sul fiume Tchorok, n. 533 (12 e 24 VII 1910, leg. Diratz.). Corrisponde alla tav. 912 del Botanical Magazine (*sub C. macrophylla!*).
510. **C. saxifraga M. B.** — Boiss. Fl. or., III, p. 904.
 Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 534 (1908, leg. Minass.). Corrisponde alla tav. 10 della Monogr. delle Campan. di A. De Candolle!
511. **C. rapunculoides L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 922.
 Arm. transcauc.: Artwin sulla fortezza genovese, nel piccolo villaggio Scheba e nell' altura detta Imara Tagara distante da Artwin circa 3 ore ed all' altezza di 650 m. (VII 1910, leg. Diratz.) e distr. di Shavshett nel Piccolo Caucaso (1911, leg. Rostomian!), n. 535.
 Nom. volg. sec. il lib. di Menev. կաքռու — pr. *gakod*; sec. il racc. Rostomian Փինջան ծաղիկ — pr. *pincian dzaghik*.
512. **C. involucrata Auch.** in DC. — Boiss. Fl. or., III, p. 926.
 Arm. centr.: distr. di Warto, n. 536 (1910, leg. Surmaghian!). Corrisponde a saggi distribuiti dal Kotschy nell' «It. cil.-kurd. 1859: Plant. in mont. Kassan Oghlu lec., n. 145» e nell' «It. cil. in Tauri alpes Bulgar Dagh, n. 15, 25».
513. **C. glomerata L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 927.
 Arm. centr.: distr. di Warto, n. 537 (1910, leg. Surmagh.).
 Nom. volg. sec. il racc. Surmaghian Թոռի (?) — pr. *toki*.
514. **C. lactiflora M. B.** — Boiss. Fl. or., III, p. 935.

Arm. transcauc.: Artwin nei boschi del monte Salalet (24 e 26 VII 1910, leg. Diratz!); Mamanelis nel Piccolo Caucaso (27 VIII 1911, leg. Rostomian!), n. 538. — Tutti gli esemplari della nostra collezione hanno corolla intensamente violacea e confrontati con la tav. 7 della Monografia delle Campanulacee di A. De Candolle ne differiscono per le lacinie del calice più strette ed allungate (l'A. descrisse i lobi «latissimi et foliacei»: ma è da tenere presente che diagnosi e figura furono redatte su pianta coltivata).


Nom. volg. sec. il racc. Rostomian, nel dialetto di Shavshett, Գողովակ ծաղիկ – pr. *topopal dzaghik* = fiore di sposa.

515. **Specularia pentagonia** (*L. sub Campanula*) DC. — Boiss. Fl. or., III, p. 959.
Sir. bor: Aintab, n. 302 (1906, leg. Khateiad!).
Nom. volg. sec. il diz. Katciuni ed altri in fr. *Speculaire* սղ. Miroir de Vénus = Հայելի Աստղկան; nel diz. Lusignan Հայելածաղիկ; nel lib. di Menev. anche Աստղկան ծաղիկ:

COMPOSITAE

516. **Solidago Virgo-aurea** L. — Boiss. Fl. or., III, p. 156.
Arm. transcauc.: Mamanelis nel Piccolo Caucaso, n. 539 (26 VIII, 1911, leg. Rostom!).
Nom. volg. del genere adoperato dal P. Alishan nel Sissouan e dal P. Katciuni nel suo diz. Ամրենի – pr. *amreni*, che è la traduzione della parola latina: la specie dal P. Alishan fu nominata Ամրենի սոկէստեղն; il racc. Rostomian scrive che nel dialetto di Shavshett è detta Փոնջ ծաղիկ – pr. *pontch dzaghik*.
517. **Erigeron acre** L. — Boiss. Fl. or., III, p. 166.
Arm. transcauc.: dintorni di Artwin (VII-VIII 1910, leg. Diratz!); Arm. centr.: dintorni di Erzerum (1908, leg. Partamian!), n. 540.
Nom. volg. del genere nel Sissouan del P. Leone Alishan è Պառզու-չար – pr. *barzu-tzar* = capelli di vecchia; nello Hai Pss. esiste Պառու ձար, Ձար պառլո come sinonimo del Ջարխոս (vedi a p. 382), il quale alla sua volta ha una dozzina di sinonimi, applicabili a *Capillus Veneris*. Il Padre Katciuni adopera Գարնանթառամ – pr. *karnanataram*, e fa derivare la parola Érigéron dal gr. ἔαρ գարնմ – primavera e γέρον ժեր = vecchio. Nel diz. Lusignian vedi Érigère = տրիս – pr. *dipa*, la quale esiste anche nello Hai Pss. con dubbio per Telephium.
518. **Bellis perennis** L. — Boiss. Fl. or., III, p. 173
Arm. transcauc.: villaggio Scheba presso Artwin (20 VII 1910, leg. Diratz!); Arm. centr.: Musch (1908, leg. Gindo!), n. 541.
Nom. volg. sec. Roshkian Եախածաղիկ – pr. *nakhadzaghič*; nel diz. Katciuni Յարութեան ծաղիկ – pr. *harutian dzaghik* = fior di Risurrezione, in turco փափալիս յիշկի; il P. Menev. nel suo libr. preferisce Անթառամ ծաղիկ (?) (զատկածաղիկ); il racc. Surmaghian di Musch scrive Ճընծաղիկ – pr. *tzendzaghič* = fior di neve; di solito il volgo lo chiama օչոչ, սպրիմ մեռնիմ, ed in turco փափարկա – pr. *papatia*

519. **Telekia speciosa** (Schreb. *sub Buphthalmo*) **Baumg.** — Boiss. Fl. or., III, p. 178.
 Arm. transcauc.: Artwin nei boschi umidi del Salalet (24 VII 1910, leg. Diratz!); Ponto: Trebizonda a Zumera (15 VIII 1889, leg. Sintenis!), n. 303.
 Nom. volg. sec. il corrispondente Marimian e Hai Pss. Անոնու - pr. *undus*; nello Hai Pss. anche Եղնակն - pr. *ieznagn*.



Telekia speciosa Baumg. = Անոնու.

520. **Inula Helenium** L. — Boiss. Fl. or., III, p. 186.
 Arm. transcauc.: Mamanelis nel Piccolo Caucaso (11 VIII 1911, leg. Rostomian!); Arm. centr.: distr. di Warto (1910, leg. Surmagh!), n. 542.
 Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. e P. Katicuni Կղմուխ - pr. *kghmukh*; nel Sissouan, Hai Pss. e Katicuni anche Ունոնզ (*uññ*) - pr. *andus*, in turco Ինոնզ *opniz* - pr. *indus otu*, nel diz. Lusignan, in fr. Aunée Կղմուխ, ափրիճան, ecc. Per la specie, sec. Hai Pss. p. 318, Հոռմիկ կղմուխ e sec. P. Katicuni (vedi diz. v. I. p. 198) Կղմուխ Հելինեայ; sec. il racc. Surmaghian Բողի - pr. *poqi* e sec. il racc. Rostomian Արտի ծաղիկ - pr. *ardi dzaghik*.
 521. **I. salicina** L. — Boiss. Fl. or., III, p. 187.

- Arm. centr.: distr. di Warto (1910, leg. Surmagh.); Arm. cilic. Zeitun sul Beryt-Dagh (1908, leg. Mergiand.), n. 543.
 Nom. volg. sec. il racc. Surmaghian, Աղի խոս - pr. *nzli khod*.
522. **I. Oculus-Christi L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 192.
 Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 544 (1908, leg. Minassian!).
 Nom. volg. sec. il racc. Minassian Գեղին կոկոն ծաղիկ - pr. *teghin gogon dzaghik*.
523. **Pulicaria dysenterica** (L. sub *Inula*) **Fl. Wett.** — Boiss. Fl. or., III, p. 201.
 Arm. centr.: dintorni di Gumgum n. 545 (1910, leg. Surmagh.).
 Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Լուղեղ, Խուախոս - pr. *luategh, luakhod*; sec. P. Kateiuni in fr. *Pulicaire*, è fatta derivare dalla parola *pulex* լու, in turco փիրկ օրու, զարկը հարբզ; il racc. Surmaghian scrive, Բողի մկե տեսակ:
524. **Gnaphalium sylvaticum** L. — Boiss. Fl. or., III, p. 226.
 Arm. transcauc.: Artwin nei boschi di Salalet, alt. 700 m., n. 546 (24 VII 1910, leg. Diratz.).
 Nom. volg. del genere, sec. Sissouan ed Hai Pss. di Alishan Ճաղճուկ - pr. *giaghgighuk*, nel diz. Kateiuni anche Ականջուկ - pr. *aganciug*, vedi in fr. *gnaphale*.
525. **Helichrysum Pallasii** (Spr. sub *Gnaphalio*). Boiss. Fl. or., III, p. 230 = *H. callichrysum* DC. (fide Boiss.) = *H. chrysosphaerum* Boiss.
 — α **typicum**. — Cfr. **Tabula nostra** X, fig. 1-2. Ponto: Grom sulle pendici delle montagne pontiche (1911, leg. Parghent.); Arm. centr.: distr. di Warto (1911, leg. Surmagh.), n. 547a.
 — β **chionophilum** (Boiss. et Bal.) **Boiss.** op. c. — Cfr. **Tabula nostra** X, fig. 3-4. — Arm. cilic.: Zeitun sul Bery-Dagh (1908, leg. Mergiand.), n. 547 b. — Raccolto in questo stesso monte dall' Haussknecht sec. Boissier!
 Nom. volg. del genere Անթառամ (ծաղիկ) - pr. *antaram* = impossibile: Hélichrysum deriva dal gr. ἥλιος ἄρκωμα = sole, χρυσός νύχι = oro, in fr. si chiama *Immortelle* o *Hélichryse*. Il P. Menev., non giustamente, nel suo lib. scrive Անթառամ per *Bellis*, անթեռամ per *Gnaphalium* ed *Helichrysum*. Per la specie *H. Pallacii* nel Sissouan troviamo Ա. Պալասայ; sec. il racc. Minassian Անթառամ ծաղիկ. sec. Surmaghian դեղիճ ծաղիկ; sotto la pianta del racc. Mergiandishian, il R. Asdurian ha scritto, in turco, միռոն յիշչի - pr. *murron cicei* = fiore di crisma.
526. **H. plicatum** DC. Boiss. Fl. or., III, p. 231 (s. lat.).
 Ponto: Gümüsckhane, Zighana-Dagh (10 VII 1889, leg. P. Sintenis!); Grom, sulle pendici delle mont. pontico-armene (1910, leg. Parghent.); Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, (1908, leg. Minassian!); Arm. centr.: Erzerum sul monte Palan - Döken (1907, leg. Essayan!) e distr. di Warto (1910, leg. Surmagh.); Arm. cilic.: Zeitun sul Kabak-Tepé (1917, leg. Mergiand.). Coll. n. 304.

Specie, come già ebbe ad osservare il Boissier (op. c.), grandemente polimorfa. Gli esemplari pontici fortemente lanoso - tomentosi ed a corimbo assai denso fanno passaggio ad *H. graeolens* (M. B.) Boiss.: quelli del distretto di Warto pubescenti-glandulosi e latifogliari hanno abito proprio e corrispondono al n. 60 di Kotschy «It. cilic. - kurd. 1859: Pl. in monte Kassan Oghlu ad pagum Gorumse lectæ». Andrebbero riferiti ad *H. anatolicum* Boiss. Diagn. ser. I, 4, p. 11, che lo stesso A. finì per sinonimizzare nella «Fl. or.» con *H. plicatum*. Invece secondo Freyn (in «Bull Herb. Boiss., 2a. ser. I, p. 270») si tratterebbe di due specie distinte ed *H. anatolicum* si dovrebbe distinguere da *H. plicatum* per i capolini il doppio più grandi: carattere di convergenza con la seguente specie.

Nom. volg. sec. il mittente Marimian, in Ponto Խնկածաղիկ ան-քառամ - pr. *Khngadzaghik antaram*; ed il racc. Surmaghian Ալբասամ ծաղիկ:

527. ***H. Armenium* DC.** — Boiss. Fl. or., III, p. 235. — Cfr. **Tabula nostra** X, fig. 5.
Ponto.: Grom sulle pendici delle montagne pontico-armene (1910 leg. Parghent!); Arm. cilic.: Zeitun nel Kabak-Tépé (1908 leg. Surmagh.). Coll. n. 548. — Gli esemplari della prima località corrispondono al n. 342 di Kotschy «It. cilic. - kurd. 1859: Pl. in Prov. Musch ecc.»: i secondi ad una forma depauperata e microcefala che fu distinta con i nomi di *H. glandulosum* Ledeb. e di *H. Tardentii* Boiss. riportati fra i sinonimi dall' A. della «Flora orientalis».
528. ***Helianthus tuberosus* L.** — Non riportato nella Fl. or. di Boiss. Arm. transcauc.: avventizio nel distr. di Shiavshett, del Piccolo Caucaso, n. 576 (1910, leg. Rostomian!).
Nom. volg. del genere secondo i moderni Արևածաղիկ, in turco կիսլ յիշկի - pr. *gün cicci*; per la specie vedi diz. di Katciuni *Topinambour* = Գետնառանձի, in turco կըրտզ քօրի; nel diz. Lusignan Ասոլ, Կանսող, գնդարմատ, ecc. - pr. *adol, gandogh, kntarmad*; nel lib. di Menev. Գնդարմատ արևադէմ (աստղատակ, in turco եկր կրմար); il racc. Rostomian scrive Գետնախնձորի ծաղիկ - pr. *kednakhndzori dzaghik*.
529. ***Micropus bombycinus* Lag.** — Boiss. Fl. or., III, p. 241.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 305 (26 VIII 1907, leg. Asdurian!).
Nom. volg. del genere adoperato dal P. Alishan nel Sissouan e dal P. Katciuni nel suo diz. Կարճոսն - pr. *gardeodn*; nel diz. Lusignan si legge փոքրոսն - pr. *pokrodn*.
530. ***Filago germanica* L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 245.
Ponto: dintorni di Trebisonda, n. 549 (1907, leg. Shabanian!). Un saggio all'inizio della fioritura sembra doversi riferire al tipo: altri in fioritura avanzata riproducono la var. *spathulata* (Presl) che Boissier considera come specie a sé.
Nom. volg. del genere sec. il diz. Lusignan, Ճուղ - pr. *giul*; il racc. Shabanian, per la specie, scrive Խնկածաղիկ քարքառ - pr. *khngadzaghik carcar*.

531. **F. arvensis L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 247.
 — α **typica**. — Arm. transcauc.: dintorni di Artwin, n. 306a (VII-VIII 1910, leg. Diratz.!).
 — β **lagopus** Parl. (pr. sp.). — Arm. cilic.: Elbistan, n. 306 b (VI 1907, leg. Asdurian!).
532. **Siegsbeckia orientalis L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 250.
 Ponto: Trebisonda presso il villaggio Mala, n. 307 (26 VIII 1889, leg. Khushbulian!).
 Per il nom. volg. del genere è adoperabile Կողոսուր - pr. *golodur*, che il mittente della pianta Khushbulian, secondo il dialetto del villaggio Mala, ha scritto sotto la pianta.
533. **Bidens tripartita L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 251.
 Arm. cilic.: Elbistan (26 VII 1907, leg. Asdurian!); Ponto: Trebisonda, presso Mala (18 VII 1889, leg. Khushbulian!), n. 308.
 Per il nom. volg. del genere crediamo adoperabile Երկաստիլ - pr. *icergadann*, che si trova indicato nel diz. di P. Katciuni, vedi in fr. *Bident*; il P. Alishan nello Hai Pss., per il Կողոսուր, scrive Bidens, che non è il caso.
534. **Achillea Millefolium L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 255.
 Arm. transcauc.: dintorni di Artwin (VII-VIII 1910, leg. Diratz!): (una forma ridotta da riferirsi alla var. *collina*); Passen infer. ad Ak-kilisse (1908, leg. Minassian!) e Mamanelis nel Piccolo Caucaso (27 VII 1911, leg. Rostom!). Coll. n. 550.
 Nom. volg. del genere nel Sissonian Հազարտերեսուկ - pr. *hasardereng*; nello Hai Pss. anche Հազարտերեսան, Գործորեսուկ - pr. *hasardererian, ciormoriat*; nel diz. Lusignan vedi Achilée = չորմորեսուկ, սող, սեսակ հազարտերեսուկի. Per la specie il racc. Rostomian, secondo il dialetto di Shavshett, indica Հովանոց ծաղկ - pr. *horanotz dzaghik*.
535. **A. setacea W. et K.** Pl. rar. Hung. I, p. 82, tab. 80. — Boiss. Fl. or., III, p. 250.
 — α **typica**. — Arm. centr.: dintorni di Gumgum (1910, leg. Surmagh!) ed Arm. cilic.: Elbistan (10 VI 1907, leg. Asdurian!), n. 309a.
 — β **ochroleuca** Bég. et Diratz. — *Differ a typo ligulis pallide ochroleuis vel flavidis.* — Arm. cilic. a Zeitun sul Kabak-Tépé (1910, leg. Mergiand!) e sul Beryt-Dagh. (id!); Arm. centr. nei dintorni di Gumgum (1910, leg. Surmagh!); Arm. pers. distr. di Ardaz (1908, leg. Minassian!).
 Nom. volg. sec. il corrispondente Surmaghian Առամ թառ, յոշոշիկ - pr. *aram tarm, hoshoshik*; sec. il mittente Asdurian, in turco, Գովան յիշիկ? - pr. *covan cicci*.
536. **A. odorata Koch**, in Boiss. Fl. or., IV, p. 256.
 Arm. cilic.: Zeitun sul Kabak-Tépé e sul Beryt-Dagh (1908 leg. Mergian!); Pont: Grom sulle pendici delle montagne pontico-armene (1911, leg. Parghent!), n. 551.
537. **A. grandifolia Friv.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 258.

- Arm. transeauc.: Artwin nei boschi di Salalet a circa 750 m. (24 VII 1910, leg. Diratz!). e Mamanelis, nel Piccolo Caucaso (30 VI 1910, Rostom.), n. 552.
538. **A. vermicularis Trin.** — Boiss. Fl. or., IV, p. 266.
Arm. centr.: dint. di Gumgum [prov. Musch] 1908, leg. Surmagh!. [con provenienza di Musch fu descritta una *A. Muschensis* Koch ricondotta da Boissier a varietà di questa specie]; Arm. cilic. ad Elbistan (10 VI 1907, leg. Asdurian!), n. 310.
539. **A. armenorum Boiss. et Haussk.** in Boiss. Fl. or., III, p. 269.
Arm. cilic. Zeitun sul Beryt-Dagh, n. 553 (1908, leg. Mergiand!). — Proveniente dallo stesso monte donde fu scoperta dall' Haussknecht e cioè sec. Boissier (op. c.): «Hab. in fissuris rupium regionis alpinæ montis Berydagh Cataoniae Armeniæ alt. 9000-10000». Bellissima specie!
Nom. volg. secondo il corrispondente Asdurian, in turco? Պայտարան - pr. *baitaran*. È pianta rara e di grato odore, ricercata dai contadini ad uso medicinale.
540. **Anthemis tinctoria L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 280.
Arm. transeauc.: comune nei dintorni di Artwin, Golordo, Mesire Kekedgian, Salalet ecc. (VII-VIII 1910, leg. Diratz!); Passen infer. ad Ak-kilisse (1908, leg. Minass.!); Arm. centr. nei dintorni di Musch (1908, leg. Gindoian!). Coll. n. 554.
Nom. volg. sec. Hai Pss. Անթեմ - pr. *anthem*, che deriva dalla parola greca ἄνθεμον ἀνηκή = fiore; Երիցուկ - pr. *iceritzug*; nel diz. Katciuni vedi Anthémis anche հափի, խնձորխոս, in turco փափական. Per la specie il race. Minassian scrive Պիզին օշօշ - pr. *teghin oshosh* ed il race. Surmaghian աստղածաղիկ - pr. *asdghazaghik*.
541. **A. pauciloba Boiss.** Diagn. ser. I, 6, p. 83 et Fl. or. III, p. 294.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 311 (3 VI 1907, leg. Asdurian!). Corrisponde ad esemplari distribuiti da Kotschy «It. syriac. 1855 n. 119 (*sub A. incana* Boiss.)».
542. **A. hyalina DC.** — Boiss. Fl. or., III, p. 307.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 312 (4 VI 1907, leg. Asdurian!). Corrisponde a saggi distribuiti dal Kotschy «It. syriac. 1855, n. 465 (*sub A. crassipes* Boiss. sinonimo di questa specie)».
543. **Chamæmelum decipiens** (F. et Mey. *sub Pyrethrum*) Boiss.
Fl. or., III, p. 828.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 313 (4 VI 1907, leg. Asdurian!). Sotto questo nome nell'Erb. Padovano si trovano saggi di Kotschy «It. cilic.-kurd., 1859, n. 286» che già il Boissier riferisce all'affine *Ch. microcephalum* Boiss. e saggi coltivati simili, ma più sviluppati della pianta armena e con traccia di rari e minimi fiori ligulati: caratteri certamente indotti dalla coltura.
Nom. volg. del genere, nel Sissouan del P. Alishan, Կոկորճիկ կոմ Երիցուկ - pr. *gogorgig, iceritzug*, nello Hai Pss. a p. 116 Կոկոռճիկ, Կուժուկ, Օչոլ, Հողիկ, Խեձոր խոռ, Կարիսապոր, Շնիճածաղիկ, Գարիսի ծաղիկ; nel diz. di Katciuni anche Ճիճի, պապուշիկ, in turco փափաղես.

544. **Ch. callosum Boiss.** Diagn. ser. I, 11, p. 22 et Fl. or., III, p. 329.
 Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 555 (1908, leg. Minassian!).
 Nom. volg. sec. il racc. Minassian Օշոշ – pr. oshosh.
545. **Pyrethrum Balsamita** (*L. sub Chrysanthemo*) W. — Boiss. Fl. or., III, p. 345.
 Arm. pers.: Salmasd, n. 314 (7 IV 1907, leg. Der Minassian!).
 Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Բողոք տակ – pr. pogho dag, թաղանդաստ – pr. taghantasd, ecc. nel diz. di Katciuni Ողկարհայ թաղանդաստ. Իգարող, in turco Եղզայ օրու, կուրբահը, in arabo աղրարհամ. Vedi diz. Katciuni, v. II. Pyréthre e la fig. 233. Per la specie nel Sissouan di Alishan = թաղանդաստ Բալսամիկ:
546. **Artemisia vulgaris L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 371.
 Arm. centr.: dintorni di Gumgum, n. 556 (1908, leg. Surmag.).
 Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Գնածաղիկ, Բարձուենիկ, բացուենիկ, ecc. – pr. qndadzaghiq, partzuenik, patzuenik; nel lib. di Menev. Եղածաղիկ – pr. ncadzaghiq, che esiste nello Hai Pss. come sinonimo; per la specie lo stesso A. adopera, Եղածաղիկ:
547. **A. Absinthium L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 373.
 Arm. centr.: dintorni di Musch e di Warto (1911, leg. Surmag.);
 Arm. cilic.: Zeitun sul Beryt-Dagh (1906, leg. Mergiand.), n. 557.
 Nom. volg. sec. il racc. Surmaghian Սարու ռէհան – pr. saru rehan, sec. il mittente Asdurian, in turco տաղ սիսիլիկսիկ? – pr. dagh süpürgessi; sec. il lib. di Menev. Բարձմենեակ կամ Եղկին խոս:
548. **Tussilago Farfara L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 377.
 Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse (6 IV 1807, leg. Minass.); Arm. centr.: nei dintorni di Musch e Warto (1911, leg. Surmag.); Arm. cilic. a Zeitun sul Kabak-Tepé (1908, leg. Mergiand.); Pont. Trebisonda presso il villaggio Mala (24 VIII 1889, leg. Khusbul.). Coll. n. 315.
 Nom. volg. nel Sissouan di P. Alishan Տատրակ կամ Խոճկորիք – pr. dadrag, khodgegorig; nello Hai Pss. Խոճիկ, Խոճկորակ, իշտրոռուկ, խամարոն, ecc. in turco տէկ տապանիք, Բամպոզ օրի. Nel diz. Katciuni (facendo derivare dal lat. *tussis* հազ, *ago* հարժած) Հազի գեղ – pr. hasi tegh, sec. Roshkian Խոճկորակ, in turco աղանձ փեղչէսիք. Il racc. Khushbulian (sec. il dialetto di Mala) scrive Վայրի Փուղր – pr. rairi phughr; il racc. Surmaghian di Musch la nomina գլուխած – pr. ll'madje, e dice տօրմայ կրփարին.
549. **Senecio vernalis W. et K.** — Boiss. Fl. or. III, p. 391.
 Arm. transcauc.: rovine di Ani (1900, leg. Basmadgian.); Arm. cilic.: Elbistan (4 VI 1907, leg. Asdurian.), n. 316.
 Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. e Sissouan Գարնան Հարուրիկ – pr. carnan halvorik; vedi diz. Katciuni in fr. *senecion* = Գարնան արևոր, ecc.; nel diz. Lusignan anche պառուտածոր, առորուկ.

550. **S. macrophyllus M.-B.** — Boiss. Fl. or., III, p. 406.
Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 558 (1908, leg. Minassian!).
551. **Echinops spherocephalus L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 439.
Arm. transcauc.: Mamanelis nel Piccolo Caucaso, n. 559 (8 IX 1810, leg. Rostomian!).
Nom. volg. del genere adoperato dal P. Alishan (nel Sissouan) è Աղնենի - pr. *rosneni*; il P. Katicuni nel suo diz. adopera Փշակն - pr. in fr. *pshagen*, dal gr. ἔχτνος φίνη = *spina* (= *riccio*), ώφ աչք = *occhio*: sarebbe preferibile la parola պնդնի, perchè l'infiorescenza globosa ricorda il riccio.
552. **Xeranthemum inapertum W.** — Boiss. Fl. or., III, p. 445.
Arm. transcauc.: comune nei dintorni di Artwin (VII 1910, leg. Diratz!), distr. Shavsh. in Soporo-nagab, nel Piccolo Caucaso comunissimo (14 IX 1910, leg. Rostom!), Passen infer. ad Ak-kilisse (1908, leg. Minass!); Arm. centr. a Warto e Musch (1908-1910, leg. Gindo! e Surmagh!) e nei dint. di Erzerum (1908, leg. Partamian!); Arm. cilic. ad Elbistan (6 VI 1907, leg. Asdurian!); Ponto: Grom sulle pendici delle montagne (1911, leg. Parghent!). Coll. n. 319.
Nom. volg. del genere sec. il diz. Lusignan չործաղիկ - pr. *cior-dzaghik*; il P. Katicuni nel suo diz. fa derivare dal gr. ξηρός չռ - *secco*, ανθός ծաղիկ - *fiore* e scrive che il nome corrispondente alla voce fr. *Immortelle* è Ամսեր խոն - pr. *anmer khod*.
553. **Chardinia macrocarpa C. Koch** in Linnaea XXIV (1851), p. 381 = *Ch. xeranthemoïdes* Boiss. Fl. or., III, p. 446 ex p. — Cfr. **Tabula nostra XI**, fig. 1-3.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 318 (10 VI 1907, leg. Asdurian!). — Il gen. *Chardinia* è, dalla maggior parte dei botanici, ritenuto monotipico e tale lo considerò Boissier (op. c.) e più di recente il Kuntze (Fl. or. - ross. in «Acta Hort. Petrop., X [1887], p. 135») che, ripristinando una combinazione linneana (*Xeranthemum annuum* var. *orientale* L.) lo designò col nome di *Ch. orientalis* (L.) O. Ktze. Sta il fatto però che il Koch fino dal 1851 aveva egregiamente distinto un'altra specie, pare a noi, a torto sinonimizzata dal Boiss. e di cui il carattere princip. consiste nell'achenio dei fiori ermafroditi coperto in tutta la sua lunghezza di peli applicati e ridotti in alto (e non limitati nel 1/3, inferiore). Avendo uno di noi (Bég.) avuto occasione di confrontare nell'Erb. centr. di Firenze ed in quello Webb la pianta di Elbistan con le Essicate di Kotschy «Pl. Pers. bor., ed. R. F. Henenacker 1846, n. 131» et «Pl. Pers. austr. ed. ut s. 1845, n. 217», di Balansa «Pl. d' Or., 1855, n. 636», di Aucher - Eloy «Hb. d' Or., n. 4778», di Bourgeau «Pl. Lyciae, n. 1860» et «Pl. Armen. 1862, n. 140» ed altro materiale collà conservato, ha potuto persuadersi della validità della specie di Koch, che viene quindi restituita al suo pristino valore, qui osservando che negli acheni di alcuni esemplari di tipica *Ch. orientalis*, oltre al fascetto di peli basilari, non mancano peli sparsi e radi nel resto. *Chardinia* non è dunque un genere monotipico!

554. **Cirsium lanceolatum** (*L. sub Carduo*) **Scop.** — Boiss. Fl. or., III, p. 538.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 320 (6 VI 1907, leg. Asdurian!).
 Nom. volg. del genere adoperato dal P. Leone nel Sissouan e dal P. Katiuni nel suo diz. è Փշականկար — pr. *pshagangar*; in fr. *Cirse*.
555. **C. rhizocephalum** **C. A. Meyer.** — Boiss. Fl. or., III, p. 542.
 Arm. centr.: Zeitun sul Beryt-Dagh, n. 321 (2 IX 1907, leg. Mergiand.). Già noto per il Tauri cilicio, corrisponde ai saggi del Bulgar-Dagh distribuiti dal Kotschy nel n. 293-322 del suo: «Iter cilicum in Tauri Alpes Bulgar-Dagh». Nom. volg. adoperato dal P. Alishan, nel Sissouan, Փշականգառ
արմատազլուխ:
556. **C. arvense** (*L. sub Serratula*) **Scop.** — Boiss. Fl. or., III, p. 552.
 Arm. centr.: dintorni di Gumgum (1908, leg. Surmagh!). Nom. volg. sec. il race. Surmaghian Գեղարիչ — pr. *kegharritch*; questi scrive che il fondo è edule, (սալի կ'ուսուի).
557. **Jurinea depressa** (Stev. *sub Serratula*) **C. A. Meyer.** — Boiss. Fl. or., III, p. 583.
 — α **typica** — Cfr. **Tabula nostra** XII, fig. I-3. — Arm. cilic.: Elbistan, n. 323 (20 VI 1907, leg. Asdurian!). — Corrisp. ai saggi 11b. 57 - 128a. - 150c. distribuiti dal Kotschy nell' «Iter. cilic. in Tauri Alpes «Bulgar-Dagh». Specie insigne propria delle alte montagne dell' Armenia usitata in medicina e ben nota per grato lodoore di vaniglia dei fiori e di muschio delle radici. Il nostro corrispondente ci comunica che essa è nota nella regione col nome di *Gheik Göbei*, che vuol dire ombelico di gazella (moscata) e Boissier riporta quello di Muskgul (*Rosa moschata*).
 — β **pinnatisecta** **Boiss.** op. c. — Cfr. **Tabula nostra** XII, fig. 4-5. — Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse, n. 324 (Agosto 1907, leg. Minassian!). Nom. volg. del genere nel Sissouan, nel diz. Katiuni ecc. Յուրինեակ. — pr. *Huriniag*; la specie figurata alla p. 22 (in armeno) fu chiamata Յուրինեակ յածուն, nella descrizione alla p. 121. Վարդաղոյն Յուրինեակ, il race. Asdurian, in turco, sottoscrive Կէյիք կօսկչի — pr. *gheik göbei*.
558. **Phæopappus drabifolius** (S. et Sm. Fl. græc. X, p. 7, tab. 910! *sub Centaurea*) Boiss. Fl. or., III, p. 594.
 Arm. cilic.: Zeitun sul Beryt-Dagh, n. 560 (1908, leg. Mergiand.). Corrisponde ai saggi distribuiti dal Kotschy nel n. 113b. - 295 dell' «It. cilic. in Tauri Alpes «Bulgar Dagh».
559. **Centaurea serotina** **Bor.** — Boiss. Fl. or., III, p. 629.
 Arm. transcauc.: distr. di Shavshett nel Piccolo Caucaso, n. 561 (1910, leg. Rostomian!). Nom. volg. del genere, nello Hai Pss. è Տերփուկ — pr. *dere-pug*, Նաշդ — pr. *nashd*; in turco ԿՐԴՐՂՔ ՔԱՆԹԱՐԻՒՆ — pr. *ermesi cantarion*; per le varie specie vedi i diz. Katiuni e Lusignan, in fr. *Centauree*.

560. **C. salicifolia M. B.** — Boiss. Fl. or., III, p. 630.
 Arm. transcauc.: Artwin a Mesire Kakedgian, n. 562 (12 VII 1910, leg. Diratz!). Cfr. sulle variazioni di questa specie Koch in Linnæa XVII (1843), p. 39 ed Handel-Mazzetti in XXIII Bd. d. Ann. d. K. K. Naturhist. Hofmuseums. Wien, 1909.
561. **C. depressa M.-B.** — Boiss. Fl. or., III, p. 635.
 Arm. transcauc.: Passen infer. ad Ak-kilisse (1908, leg. Minassian!); Arm. centr.: nei dintorni di Erzerum (1908, leg. Partam!); Arm. pers.: Urmia (1908, leg. Minassian!); Arm. cilic.: Elbistan, (4 VI 1907, leg. Asdurian!) ed a Zeitun sul Beryt-Dagh (1908, leg. Mergiand!). Coll. n. 325.
562. **C. Marschalliana Spr.** — Boiss. Fl. or., III, p. 634.
 Arm. transcauc.: sui muri dell' antica fortezza genovese di Artwin, n. 563 (VII 1910, leg. Diratz!).
563. **C. aggregate Fisch. et Meyer** in DC. — Boiss. Fl. or., III, p. 652.
 Arm. cilic.: Zeitun sul Beryt-Dagh, n. 564 (1911, leg. Surmagh!). Specie già nota per il Tauro cilicico. La confrontammo col n. 317 di Kotschy «It. cil. - kurd.: Plant. in prov. Musch. ecc.», da cui la nostra pianta differisce appena per l' infiorescenza meno compatta.
564. **C. Urvillei DC.** — Boiss. Fl. or., III, p. 665.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 326 (6 VI 1907, leg. Asdurian!).
565. **C. solstitialis L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 685.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 327 (1 e 10 VI 1907, leg. Asdurian!).
566. **Crupina vulgaris Cass.** — Boiss. Fl. or., III, p. 699.
 Arm. cilic.: Elbistan, n. 328 (10 VI 1907, leg. Asdurian!).
 Nom. volg. del genere, sec. il diz. Lusignan, սերեփան – pr. *derepan*.
567. **Cnicus benedictus L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 705.
 Arm. cilic.: Zeitun sul Kabak-Tépé (1908, leg. Surmagh!) ed Elbistan (2 VI 1907, leg. Asdurian!), n. 329.
 Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Գովազակ? – pr. *coraghag*; sec. il diz. di P. Katciuni in fr. *Cnique* = Քրքում վայրի – pr. *circum vairi*; nel diz. Lusignan vedi Cnicus = Լայն տերեւուկ, in fr. *Chardon béni*.
568. **Cichorium Intybus L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 715.
 Arm. transcauc.: dintorni di Artwin (VII-VIII 1910, leg. Diratz!) e di Shavshett (28 VI 1911, leg. Rostom!); Arm. centr.: dintorni di Musch (1908, leg. Gindoian!); Arm. cilic.: Elbistan (primav. 1907, leg. Asdurian!). Coll. n. 330.
 Nom. volg. del genere è լղերդ – pr. *ieghert*, anche լղերդակ ecc. vedi nello Hai Pss. p. 154; nel diz. Katciuni, anche Վայրի հազար – pr. *vairi hazar*, Հինգը – pr. *hinct*; per la specie, in fr. *Chicorée sauvage* = լղերդակ, Վայրի հազար; in turco Թասիրիս – pr. *radikia*; sec. il racc. Rostomian (nel dialetto di Shavshett), իշու ինս – pr. *ishu khod* = erba di asino; sec. il racc.

- Surmaghian (nel dialetto di Musch) իշգարցըռուկ - pr. *ishgiar-*
gerug.
569. **Lapsana communis L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 720.
Ponto: dintorni di Trebisonda, n. 565 (1908, leg. Shaban!).
Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. խաբեռուկ, խարուկ, խարշուկ.
— pr. *khapepug*, *kapug*, *kharshug*; nel diz. Katciuni խորու, խոս-
ստեանց, vedi *Lampsane*.
570. **Tragopogon coloratum C. A. Mey.** — Boiss. Fl. or., III, p. 746.
Arm. cilic.: Elbistan, n. 331 (31 V 1907, leg. Asdurian!). Da ul-
teriormente studiare su materiale in frutto.
Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. ed altri Քօշմօրուք - pr.
koshmoruk, dal gr. Τράγος ἄνθης, πος = *capra*, πῶγον μῆρης =
barba. sec. il racc. Rostomian, nella prov. di Erzerum ecc., è
detto Ոփնձ; nella prov. di Van, sec. il lib. di Artignan, si chiama
խինչ - pr. *khintz*. La pianta si mangia cruda.
571. **T. orientale L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 747.
Arm. transcauc.: distr. di Shavshett nel Piccolo Caucaso (1911
leg. Rostom.). Ponto: Grom sulle pendici delle montagne pon-
tico-armene (1910, leg. Parghent.), n. 566.
Nom. volg. sec. il lib. di Menev. Արեւելեան Ոփնձ - pr. *areve-*
lian sintz.
572. **T. bupthalmoides α latifolium Boiss.** — Boiss. Fl. or., III,
p. 751.
Arm. cilic.: Zeitun zul Beryt-Dagh, n. 567 (1908 leg. Mergiand.).
già indicato dal Boissier per questa località.
573. **Taraxacum officinale Wigg.** — Boiss. Fl. or., III, p. 787.
Arm. centr.: a Musch (1908, leg. Gindo.) ed Arm. pers. a Khoy
(15 V 1907, leg. Minass.), n. 332.
Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. կոտրանջար, Գաղտիկուր, խպա-
պի, ecc. — pr. *grapanciar*, *caghdigur*, *khbab*; nella prov. di
Musch, sec. il mittente Gindoian, կաթնուկ - pr. *gatnug*. Arti-
anian preferisce la denominazione Բուրու - pr. *puru*, che si usa
nella prov. di Van.
574. **Chondrylla juncea L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 792.
Arm. transcauc.: nell'antica fortezza armena di Ardanoutch
(8 VIII 1910, leg. Diratz.); Arm. centr.: dintorni di Gumgum
(1910, leg. Surmagh.), n. 568.
Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Ճարճասոսուկ - pr. *giargia-*
dug.
575. **Mulgedium cacaliæfolium (M. B. sub Soncho) Boiss.** Fl.
or., III, p. 801.
Ponto: Trebisonda, nel villaggio Mala, n. 333 (26 VII 1889, leg.
Khushbul.).
Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. basato sulla denominazione
di Khushbulian, raccoglitore della pianta nostra nel villaggio
di Mala, կաթնփուզի - pr. *gatnpughri*.
576. **Prenanthes purpurea L.** — Boiss. Fl. or., III, p. 803.

Arm. transcauc.: Artwin nei boschi, all' alt. di c. 780 m., n. 569 (28 VII 1910, leg. Diratz!).

Nom. volg. del genere adoperato dal P. Katciuni nel suo diz. è Ծաղկահակ - pr. *dzaghgahag*, dal gr. πρηγνής ἀπέκειται γιαππαλ = chinato verso avanti, չնֆօս ծաղիկ = fiore.

577. **Lactuca saligna** L. — Boiss. Fl. or., III, p. 810.

Arm. cilic.: Zeitun sul Kabak-Tépé, n. 570 (1908, leg. Mergandishian!).

Nom. volg. del genere è Հաղար - pr. *hasar*, in turco Մարու - pr. *marul*.


578. **L. viminea** (L. sub *Prenanthe*) Lk. — Boiss. Fl. or., III, 818.

Arm. cilic.: Zeitun sul Kabak-Tépé, n. 571 (1908, leg. Mergand!).

579. **Hieracium pannosum** Boiss. Diagn. ser. I, 3, p. 32 et Fl. or., III, p. 869; Rchb Ic. XIX, tab. 194!

Ponto: Grom sulle pendici delle montagne pontico-armene, n. 572 (1911, leg. Parghent!).

Nom. volg. del genere sec. Hai Pss. Եղին ականք - pr. *ieghin agantch*; per la specie, nel Sissouan, il P. Alishan aveva adoperato Բաղեխոս թաւ - pr. *pasekhod tav*, ed il P. Katciuni (vedi in fr. éperrière) Բաղեկեր - pr. *pasegher*.



FOT. P. N. DIRATZ.

P. Leone Alishan (n. 1820 m. 1901)

INDICE DELLE MATERIE

	pag.		pag.
Prefazione.	5	Resedaceæ.	46
Generalità.	7	Cruciferæ.	46
Cenni storico-bibliografici	8	Fumariaceæ.	48
Notizie sulle località, ecc.	11	Papaveraceæ.	49
a) Armenia russa o transcaucasica		Ranunculaceæ	49
b) " centrale turca.		Capparidaceæ	52
c) " persiana.		Berberidaceæ.	53
d) " cilicica.		Saxifragaceæ.	53
e) Ponto.		Crassulaceæ.	53
Bibliografia	20	Rosaceæ.	54
a) Periodo Preboissieriano.		Leguminosæ.	56
b) " Boissieriano.		Myrtaceæ.	62
c) " Postboissieriano		Lythraceæ.	62
Enumerazione sistematica delle specie		Onagrariaceæ	62
<i>I Embryophyta Asiphonogama</i>		Umbellifereæ	63
Filices.	28	Rhamnaceæ	65
Equisetaceæ	29	Ampelidaceæ	66
<i>II Embryophyta Siphonogama</i>		Celastraceæ	66
a) Gymnospermæ		Sapindaceæ	66
Coniferae.	30	Anacardiaceæ	67
Gnetaceæ.	30	Polygalaceæ	67
b) Angiospermæ		Geraniaceæ	67
a) Monocotyledones.		Oxalidaceæ	68
Graminaceæ	30	Linaceæ	69
Cyperaceæ.	32	Zygophyllaceæ	69
Juncaceæ	33	Rutaceæ	70
Alismaceæ	33	Meliaceæ	70
Liliaceæ	33	Malvaceæ	60
Amaryllidaceæ	34	Euphorbiaceæ	71
Dioscoreæaceæ	34	Ericaceæ	73
Iridaceæ	35	Ebenaceæ	73
Orchidaceæ	35	Plumbaginaceæ	74
b) Dicotyledones.		Oleaceæ	74
Juglandaceæ	36	Primulaceæ	76
Salicaceæ	36	Asclepiadaceæ	77
Cupulifereæ	36	Gentianaceæ	78
Betulaceæ	37	Borraginaceæ	78
Platanaceæ	37	Convolvulaceæ	81
Urticaceæ	37	Solanaceæ	82
Elaeagnaceæ	38	Scrophulariaceæ	83
Thymelæcaceæ	38	Orobanchaceæ	85
Loranthaceæ	38	Labiæ	86
Polygonaceæ	38	Acanthaceæ	96
Chenopodiaceæ	40	Globulariaceæ	97
Phytolaccaceæ	40	Plantaginaceæ	97
Molluginaceæ	40	Rubiaceæ	98
Paronychiaceæ	41	Caprifoliaceæ	99
Caryophyllaceæ	41	Valerianaceæ	100
Hypericaceæ	44	Dipsacaceæ	101
Cistaceæ	45	Campanulaceæ	108
Violaceæ	45	Compositæ.	104

ERRATA-CORRIGE PIÙ IMPORTANTI

Pag. **lin.**

11	14	storico - geografiche	<i>in luogo di</i>	storico - gografiche.
23	13	Medwedew	»	Medwjedew
25	39	Terracciano	»	Terraciano
33	20	Haussknecht	»	Hussknecht
33	24	Allium	»	Alium
35	17	C. Koch	»	C. (Koch)
38	9	var. brevipetiolata	»	var. brevipetala
42	28	granulatis	»	granulotis
45	11	Schrank	»	Schrunk
46	12	Cruciferæ	»	Crucifere
58	10	Trifolium	»	Trifoglium
63	10	del gen. adoperato dal P. P. Katciuni	»	della genere dal P. Katciuni è adoperato
67	36	Fl. It. V. p. 138 di Parlatore che ebbe occasione	»	Fl. It. II, p. 238 che abbiamo avuto occasione
73	39	al Rhododendron	»	il rodondendron
80	26	forma a foglie	»	forma e foglie
81	3	Souvenez-vous de moi	»	Souvenz-vous de moionto
84	10	oligantha	»	olgantha
85	10	cærulea	»	cærulæ
85	18	vedemmo	»	vidi
86	4	ha	»	a
89	42	Sclarea	»	Seralea
96	38	Bornm.	»	Bhrm.



Spiegazione delle Tavole

- Tav. I, fig. 1 — *Cerastium dichotomum* L. di Elbistan (leg. Asdurian).
 » » 2 — *C. inflatum* Lk. d. s. (leg. c. s.).
 » » 3-5 — *C. Saccardoanum* Diratz. d. s. (leg. c. s.).
- Tav. II, fig. 1-2 — *Anemone armena* Boiss. di Erzerum (leg. Minassian).
 » » 3 — *Gentiana septempida* Pall. di Artwin (leg. Diratzouyan).
 » » 4 — *G. gelida* M.-B. di Ak-kilisse (leg. Minassian).
- Tav. III, fig. 1 — *Trigonella Kotschyi* Fenzl. in Ky. di Elbistan (leg. Asdurian).
 » » 2-3 — *Bupleurum brachyatum* C. Koch di Artwin (leg. Diratzouyan).
- Tav. IV, fig. 1-3 — *Veronica macrostachya* Vahl subsp. *Ghiurekiani* Diratz. di Elbistan (leg. Asdurian).
 » » 4 — *Alsine sclerantha* F. et M. di Elbistan (leg. Asdurian).
 » » 5-6 — *Geranium cinereum* Cav. var. *subacutum* (Boiss.) Bég. et Diratz. del Beryt-Dagh (leg. Mergiandishian).
 » » 7 — *Euphorbia herniariaefolia* W. di Elbistan (leg. Asdurian).
- Tav. V, *Phelipaea coccinea* Poir. (Da Desfontaines, «Coroll. de Tournefort, Tab. X» e da Alishan «Haipussag, p. 23»).
- Tav. VI, fig. 1-2 — *Hyssopus officinalis* L. del M. Malbe sopra Perugia (leg. Cicioni in Hb. Béguinot).
 » » 3 — *H. angustifolius* M. - B. di Ak-kilisse (leg. Minassian).
- Tav. VII, fig. 1-4 — *Lamium microphyllum* Boiss. di Beryt-Dagh (leg. Mergiandishian).
 » » 5 — *L. striatum* S. et Sm. subsp. *reniforme* (Montb. et Auch.) var. *pubescens* Bég. et Diratz. di Beryt-Dagh (leg. Mergiandishian).
 » » 6-8 — id. var. *glabrum* Bég. et Diratz. di Beryt-Dagh (leg. Mergiandishian).
 » » 9 — *L. veronicæfolium* Bth. del M. Olimpo (leg. Clementi in Hb. Patavino).
- Tav. VIII, fig. 1 — *Galium humifusum* (W.) Bég. et Diratz. di Elbistan (leg. Asdurian).
 » » 2-3 — *Moltkia cerulea* Lehm. var. *intermedia* Diratz. di Elbistan (leg. Asdurian).
- Tav. IX, fig. 1-3 — *Scabiosa Baliani* Diratz. di Grom nel Ponto (leg. Parghentanian).
- Tav. X, fig. 1-2 — *Helichrysum Pallasii* (Spreng.) Boiss. di Grom nel Ponto (leg. Parghentanian).
 » » 3-4 — Id. var. *chionophyllum* (Boiss. et Bal.) Boiss. di Beryt-Dagh (leg. Mergiandishian).
 » » 5 — *H. armenium* DC. dell'Armenia (leg. Szovitz in Hb. Patavino).

- Tav. XI, fig. 1-3 — *Chardinia macrocarpa* C. Koch di Elbistan (leg. Asdurian).
 » » 4 — Achenii della stessa.
 » » 5 — » di *Chard. xeranthemoides* Desf.
- Tav. XII, fig. 1-3 — *Jurinea deppressa* (Stev.) C. A. Meyer & di Elbistan (leg. Asdurian).
 » » 4-5 — *J. depr. var. pinnatisecta* Boiss. di Ak-killsse (leg. Minassian).

NB. — Tutte le figure sono ridotte a circa una metà del vero: quella della tav. V è quasi di grandezza naturale.

Figure nel Testo

- Pag. 9 — Teodoro Kotschy.
 » 12 — Veduta parziale di Artwin: il quartiere Golordo.
 » 14 — Veduta di Ardanutsch.
 » 18 — Paesaggio della Cilicia: Monte Anascia e le sue cascate
 » 55 — *Cotoneaster pyracantha* (L.) Spach.
 » 72 — *Euphorbia denticulata* Lehm.
 » 75 — *Vaccinium Arctostaphylos* L.
 » 105 — *Telekia speciosa* Baumg.
 » 115 — P. L. Alishan (fot. P. N. D.).



Tavola I

Flora Armena



1: *Cerastium dichotomum* L.


3-5: *Cerastium Saccardoanum* Diratz, n. sp.

2: *Cerastium inflatum* Lk.

JOHN CRERAR
LIBRARY

Tavola II

Flora Armena



1-2: *Anemone armena* Boiss. — 3: *Gentiana septemfida* Pall.

4: *Gentiana gelida* M. B.

CHERAK
LIBRARY

Tavola III

Flora Armena



1: *Trigonella Kotschyi* Fenzl in Ky.; Boiss.

2-3: *Bupleurum brachyatum* C. Koch.

Tavola IV

Flora Armena




1-3: *Veronica macrostachya* Vahl. subsp. **Ghiurekiani** Diratz. n. subsp.

4: *Alsine sclerantha* F. et M.

5-6: *Geranium cinereum* Cav. var. *subacutum* (Boiss.) Bég. et Diratz. n. comb.

7: *Euphorbia herniariæfolia* W.

THE
JOHN CRERAR
LIBRARY




***Phelipaea coccinea* Poir. = *Anoplantus* Endl.**

Աղբելաց արիւթ.

UNIVERSITY LIBRARY

Tavola VI

Flora Armena



1-2: *Hyssopus officinalis* L.

3: *Hyssopus angustifolius* M. B.

LIBRARY
LITERARY

Tavola VII

Flora Armena



1-4: *Lamium microphyllum* Boiss.

5: *L. striatum* S. et Sm. subsp. *reniforme* Montb. et Auch. (pr. sp.) var. *pubescens* Bég. et Diratz.

6-8: Id. var. *glabrum* Bég. et Diratz.

9: *L. veronicæfolium* Bth.

JOHN C. CRERAR
LIBRARY

Tavola VIII

Flora Armena



1: *Galium humifusum* (W.) Bég. et Diratz. n. comb.

2-3: *Moltkia cærulea* Lehmann, var. *intermedia* Diratz. n. var.

AMERICAN LITERARY

Tavola IX

Flora Armena



1-3: **Scabiosa Baliani** Diratz. *n. sp.*

Tavola X

Flora Armena



1-2: *Helichrysum Pallasii* (*Spreng.*) *Boiss.*

3-4: *Helichrysum Pallasii* *Boiss.* var. *chionophilum* (*Boiss et Bal.*) *Boiss.*

5: *Helichrysum armenium* *D C.*

NAR
NARV

Tavola XI

Flora Armena




1-3: *Chardinia macrocarpa* C. Koch.

4: *Acheni della stessa.*

5: *Acheni di Chard. xeranthemoides* Desf.

Tavola XII

Flora Armena



1-3: *Jurinea depressa* (Stev) C. A. Mey. α *typica*.

4-5: *Id. Mey. var. pinnatisecta* Boiss.

N
A. m

UNIVERSITY OF CHICAGO



65 464 704